



DE PACKUNGSBEILAGE

EN PACKAGING INSERT

FR NOTICE D'UTILISATION

ES PROSPECTO

PT FOLLETO EXPLICATIVO

IT MODALITÀ D'USO

ADODERM GmbH
Haslacher Weg 12b • 51063 Köln • Germany

contact address
Elisabeth-Selbert-Str. 5 • 40764 Langenfeld • Germany
Phone +49 2173 10191-80 • Fax +49 2173 10191-82
info@adoderm.com • www.adoderm.com

PIKTOGRAMME UND IHRE BEDEUTUNG
PICTOGRAMS AND THEIR MEANING
PICTOGRAMMES ET LEURS SIGNIFICATIONS
PICTOGRAMAS Y SU SIGNIFICADO
SIGNIFICADO DOS PICTOGRAMAS
PICTOGRAMMI E LORO SIGNIFICATI

Zum Einmalgebrauch
Do not reuse; product for single use only
Ne pas réutiliser; produit à usage unique
No vuela a usar; producto para un solo uso
Utilize apenas una vez, producto desechable
Non riutilizzare, prodotto monouso

Gebrauchsanweisung beachten
See the packaging insert
Se reporter à la notice intérieure
Lea el folleto de instrucciones
Leia o folheto de instruções
Fare riferimento alla nota interna

Lotnummer
Batch number
Número de lote
Número de lote
Número do lote
Nº de lote

Steril, bei feuchter Hitze sterilisiert
Sterile; has been sterilized with moisture heat
Sterile; stérilisé à la chaleur humide
Esterilizado; ha sido esterilizado con calor húmedo
Sterile; sterilizzazione a calore umido

Lagertemperatur
Storage temperature
Température de stockage
Temperatura de almacenamiento
Temperatura de armazenamento
Temperatura di conservazione

Verfallsdatum
Expiration date
Date de péremption
Fecha de vencimiento
Prazo de validade
Data di scadenza

25 °C
25 °C
CE-Kennzeichnung gemäß MDD 93/42/EWG
CE 0297 Nummer der Benannten Stelle
CE-marked according to MDD 93/42/ECC
CE 0297 Notified Body number
Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE
relative aux dispositifs médicaux
CE 0297 est le numéro de l'organisme notifié
Marcado CE de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE
relativa a productos sanitarios
CE 0297 es el número del organismo notificado
Identificação CE conforme MDD 93/42/CEE
CE 0297 número da entidade mencionada
Marchio CE ai sensi della Direttiva sui dispositivi
medici (MDD) 93/42/CEE
CE 0297 numero dell'ente notificato

Empfehlen Sie der Patientin/dem Patienten für 2-4 Wochen nach der Injektion keine sportlichen oder die Wundheilung beeinflussenden Aktivitäten auszuüben und längere Sonneneinstrahlung, UV, kalte Temperaturen sowie Sauna oder Dampfbäder 2 Wochen nach der Injektion zu vermeiden.

Recommender à la patiente ou au patient de ne pas pratiquer du sport ou d'activité freinant la cicatrisation pendant les 2 à 4 semaines suivant l'injection. Dans les 2 semaines suivant l'injection, ne pas s'exposer de façon prolongée au soleil, aux UV, aux températures froides et éviter la pratique du sauna ou hammam.

Recomendar a la paciente o al paciente de no practicar deportes o actividades que puedan influir en la cicatrización durante las 2-4 semanas siguientes a la inyección. Durante las 2 semanas siguientes a la inyección, no exponerse de manera prolongada al sol, a los UV, a temperaturas frías y evitar la práctica del sauna o hammam.

Aconselhar a paciente ou ao paciente de não praticar esportes ou atividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, não exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Consigliare alla paziente o all'utente di non praticare sport o attività che influenzino la guarigione della ferita per 2-4 settimane dopo l'iniezione. Durante le 2 settimane dopo l'iniezione, evitare di esporre la pelle per un periodo prolungato al sole, ai raggi UV, a temperature fredde e evitare il sauna o il hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar esportes ou actividades que possam influir na cicatrização durante as 2-4 semanas seguintes à injeção. Durante as 2 semanas seguintes à injeção, non exponer-se de maneira prolongada ao sol, aos UV, a temperaturas frias e evitar a prática do sauna ou hammam.

Indicar a paciente ou ao paciente de non praticar

ES PROSPECTO**INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE**

Antes de llevar a cabo el tratamiento usted deberá asegurar que el/la paciente es apto/a para el tratamiento y que el/la mismo/a ha recibido las informaciones necesarias referentes a la forma de administración, composición, características, instrucciones para el uso, advertencias, indicaciones y contraindicaciones, incompatibilidades y posibles efectos secundarios. Antes de la aplicación de VARIOFILL® for Gluteal Augmentation deberá efectuarse una anamnesis alérgica e inmunológica al paciente.

1. CARACTERÍSTICAS

VARIOFILL® for Gluteal Augmentation es un gel estéril de ácido hialurónico, reabsorbible, reticulado, libre de pirógeno y de origen no animal. Cada caja de VARIOFILL® for Gluteal Augmentation contiene:

- una jeringa estéril de 10,0 ml
- una serie de etiquetas informando el número de lote.
- Una etiqueta debe acompañar el historial clínico del (de) la paciente y otra etiqueta debe ser entregada al paciente para garantizar la trazabilidad
- Un prospecto conforme a la reglamentación Europea reproduciendo los conocimientos al momento de su publicación.

2. COMPOSICIÓN

Ácido hialurónico reticulado 33 mg/ml;
Producto esterilizado con calor húmedo.

3. INDICACIÓN

VARIOFILL® for Gluteal Augmentation es un relleno a base de ácido hialurónico indicado para la restauración de volumen y contorno de los glúteos.

4. CONTRAINDICACIONES

VARIOFILL® for Gluteal Augmentation no debe inyectarse en los vasos sanguíneos.

VARIOFILL® for Gluteal Augmentation no deberá ser inyectado en pacientes:

- con tendencia a cicatrices hipertróficas y queloides.

8. APLICACIÓN – DOSIFICACIÓN

VARIOFILL® for Gluteal Augmentation es un dispositivo médico de clase III concebido para ser inyectado por médicos con un amplio y profundo conocimiento de la anatomía humana y que poseen experiencia en técnicas de llenado, aumento y contorno de los tejidos corporales, por ejemplo inyecciones de grasa o lipofilling. Para un buen resultado estético se aconseja de poseer un buen sentido convencional y de soporte. La cantidad a usar debe ser moderada y suficiente conforme a la expectativa del paciente y a las limitaciones fisiológicas. No hay experiencia inyectando más de 250ml de VARIOFILL® for Gluteal Augmentation. La experiencia reportada soporta resultados por 24 meses. No hay experiencia reportada de más de una sesión durante 24 meses. Al igual que cualquier procedimiento médico, las precauciones habituales antes de realizar la inyección deben ser respetadas. Dado que la inyección de VARIOFILL® for Gluteal Augmentation tiene un riesgo asociado con posible infeción, se recomienda el uso de antibiótico y/o tratamiento pre-inflamatorio.

• La zona a tratar debe ser limpida y desinfectada cuidadosamente con una solución desinfectante antes de la inyección.

• Siguiendo lo acordado entre el médico y el/la paciente, una anestesia local o general antes de inyectar VARIOFILL® for Gluteal Augmentation puede ser considerada.

• La administración del producto requiere hacer una pequeña incisión o una perforación con una aguja (1-2 mm) en la piel.

• Mediante el uso de agujas o cánulas con punta redonda entre 16G y 22G x 40mm VARIOFILL® for Gluteal Augmentation será inyectado lentamente en nivel subcutáneo por técnica de retrogrado, tunel, técnica cruzada, por técnica de multipuntos o combinación de estas.

• La cantidad a inyectar y la profundidad de inyección depende de la depresión cutánea de la zona a tratar y el efecto deseado. La cantidad es decisión y responsabilidad del médico tratante.

• La zona tratada debe ser masajeada después de la inyección de manera que el implante sea bien distribuido.

• Evite la sobrecrección.

La aplicación de VARIOFILL® for Gluteal Augmentation está contraindicada en el caso de que haya presencia en la zona de los glúteos de otro implante, sin importar la composición.

5. INSTRUCCIÓN DE USO Y ADVERTENCIAS

VARIOFILL® for Gluteal Augmentation es un dispositivo médico de clase III el cual debe ser utilizado por médicos que han sido propiamente entrenados, con experiencia y conocimiento de la anatomía de la zona glútea y en las técnicas de relleno corporal en tejidos blandos.

El médico tratante debe prevenir el/la paciente de los posibles riesgos ligados a las inyecciones de ácido hialurónico en los glúteos y asegurarse que el/la paciente entiende los signos y síntomas de las posibles complicaciones.

• No inyectar VARIOFILL® for Gluteal Augmentation para inyecciones distanciadas a inyecciones subcutáneas.

• No inyectar VARIOFILL® for Gluteal Augmentation en los vasos sanguíneos (intravasculares).

La introducción de productos a base de ácido hialurónico en los vasos sanguíneos puede causar una embolia (embolia pulmonar, embolia cerebral), una oclusión de los vasos sanguíneos que puede causar una necrosis cutánea, lesiones en los tejidos subyacentes, isquemia o infarto. Para inmediatamente la inyección si uno de los siguientes síntomas aparece, signos de un ataque cerebral, descoloración/blanqueamiento de la piel, infarto, dolor raro. El/la paciente debe recibir auxilio médico inmediato y ser remitida(a) a un especialista apropiado en caso de un evento adverso mayor.

• Pacientes bajo tratamiento anticoagulante deben suspender dicho tratamiento con un mínimo de 14 días antes de la inyección de VARIOFILL® for Gluteal Augmentation.

• La zona a tratar debe cumplir las condiciones mínimas. A saber un espesor mínimo de 2 centímetros de tejido subcutáneo es recomendado para cubrir el implante. Con el fin de asegurarse una cobertura y soporte suficiente de los tejidos, un examen adecuado como el estiramiento y pelízco ("stretch and pinch test") debe ser realizado.

Recomendar al paciente de no practicar durante las primeras 2 a 4 semanas después de la inyección cualquier actividad deportiva o actividad que pueda frenar la cicatrización. Recomendar al paciente en las 2 semanas después de la inyección la no exposición prolongada al sol, a los rayos UV, a las temperaturas frías y evitar toda práctica de sauna o hammam.

10. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

• VARIOFILL® for Gluteal Augmentation puede utilizarse en un lapso de 3 años después de su producción.

• Fechas de producción/caducidad están indicadas tanto en la caja como en la jeringa.

• La temperatura de almacenamiento está entre 2°C y 25°C

• Evitar luz excesiva

• Evitar congelación y calor

• Dejar fuera del alcance de menores de edad.

Recomendar al paciente que no exerza quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomenda-se ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injeção.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injeção e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injección.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injección e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injección.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injección e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injección.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injección e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injección.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injección e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injección.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injección e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injección.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injección e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injección.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injección e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injección.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injección e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injección.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injección e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injección.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injección e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injección.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injección e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injección.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injección e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injección.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injección e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injección.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a injección e evitar a exposição prolongada ao sol, UV, temperaturas baixas, bem como sauna ou banho de vapor durante 2 semanas após a injección.

Recomendamos ao paciente que não exerça quiescer actividades deportivas e actividades que possam afetar a cicatrização durante 2 a 4 semanas após a inje