

Empfohlene Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen

1 Monat

Keine Impfung

2 Monate

- **6fach-Kombinationsimpfung** (Diphtherie/Starrkrampf/Keuchhusten/Hirnhaut- und Kehlkopfdeckelentzündung/Kinderlähmung/Hepatitis B)
- **Pneumokokken-Impfung** (Lungenentzündung und Blutvergiftung)
- Ergänzend **Rotaviren-Schluckimpfung** (schwere Magendarmgrippe)

3 Monate

- **Meningokokken B-Impfung**
- Ergänzend **Rotaviren-Schluckimpfung**

4 Monate

- **6fach-Kombinationsimpfung**
- **Pneumokokken-Impfung**

6 Monate

- **Meningokokken B-Impfung** (Hirnhautentzündung)

9 Monate

- **Masern-Mumps-Röteln-Varizellen-Impfung**

12 Monate

- **6fach-Kombinationsimpfung**
- **Pneumokokken-Impfung**

13 Monate

- **Masern-Mumps-Röteln-Varizellen-Impfung**
- **Meningokokken ACWY- Impfung** (Hirnhautentzündung)

18 Monate

- **Meningokokken B-Impfung**

2 Jahre

Keine Impfung

3 Jahre

Keine Impfung

4 ½ Jahre

Keine Impfung

6 Jahre

- **4fach-Kombinationsimpfung** (Diphtherie/Starrkrampf/Keuchhusten/Kinderlähmung)

11-12 Jahre

- **3fach-Kombinationsimpfung** (Diphtherie/Starrkrampf/Keuchhusten)
- **Meningokokken B und ACWY-Impfungen** (Hirnhautentzündung)

14-15 Jahren

- **Hepatitis B-Impfung** (falls im Säuglingsalter nicht erfolgt)
(2 Impfungen im Abstand von 6 Monaten, ab 16 Jahren 3 Impfungen)
- **Impfung gegen humane Papillomaviren** (gegen Gebärmutterhalskrebs und Genitalwarzen)
(2 Impfungen im Abstand von 6 Monaten, ab 15 Jahren 3 Impfungen)

Die **FSME-Impfung** (durch Zecken übertragene Hirnhautentzündung) ist ab 3 Jahren empfohlen (Zulassung bereits ab dem 1. Geburtstag)

Wir empfehlen die oben aufgeführten Impfungen. Auf Wunsch können individuelle Impfschemata durchgeführt werden

Im 2. Kindergarten, sowie in der 4. und 8. Klasse finden **obligatorische schulärztliche Untersuchungen** statt, diese werden durch den zuständigen Schularzt oder auf Wunsch beim betreuenden Kinder-/Hausarzt durchgeführt.

