

# Заява про надання згоди на прийом таблеток калію йодиду

## Заява про надання згоди на прийом таблеток калію йодиду

Шановні батьки! Шановні опікуни!

Уже понад 30 років Міністерство охорони здоров'я Австрії безкоштовно забезпечує населення, зокрема школи та дитячі садки, таблетками калію йодиду.

### Чому та коли важливо приймати таблетки калію йодиду?

У випадку викиду радіоактивного йоду внаслідок аварії на атомній електростанції таблетки калію йодиду забезпечують організм стабільним йодом, що запобігає високому радіаційному опроміненню щитовидної залози.

### Чому важливо вчасно прийняти таблетки калію йодиду в разі ядерної аварії?

Йодиду забезпечують захист тільки в тому випадку, якщо вони прийняті ДО прибуття

радіоактивних

повітряних мас. Це дає організму час, щоб «вибудувати» захист. Щоб Ваша дитина вчасно отримала калію йодид, ці таблетки вже зберігаються в навчальному закладі.

### Коли та за чиїм розпорядженням у школі видають таблетки калію йодиду?

Таблетки видаються лише за спеціальним запитом відомства з радіаційного захисту. Адміністрації школи потрібен Ваш дозвіл, щоб дати Вашій дитині захисний калію йодид зі школи додому на вимогу відомства з радіаційного захисту лише в разі безпосередньої ядерної небезпеки.

Уважно прочитайте інструкцію із застосування таблеток калію йодиду, що додається, і дайте Вашій дитині із собою до школи підписану заяву про згоду. Дякуємо!

(Ви також можете знайти заяву про надання згоди німецькою та 12 іншими мовами онлайн: Формуляр: [www.schularzt.at](http://www.schularzt.at) )

Керівництво

\*\*\*\*\*

## ЗАВА ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ

Ім'я дитини:

Дата народження:

Ім'я опікуна:

- ТАК, я дозволяю (на час відвідування моєю дитиною навчального закладу) давати моїй дитині таблетки калію йодиду, якщо цього вимагатимуть органи радіаційного захисту. Я підтверджую, що мені невідомо про будь-які непереносимості або протипоказання до прийому таблеток для моєї дитини, і що я негайно повідомлю школу, якщо дізнаюсь про будь-які непереносимості або протипоказання.
- НІ, я не даю своєї згоди

Дата:

Підпис:

## Інформація про калій-йодид (таблетки) (відповідає інструкції до лікарського засобу)

### Протипоказання до застосування калію-йодиду (таблетки):

- при **гіпертиреозі щитоподібної залози**
- при **доброякісних вузлах у щитоподібній залозі**, які не лікуються. При так званих нелікованих «гарячих вузлах щитоподібної залози» існує небезпека масового надлишкового виробітку гормонів щитоподібної залози, які в найгіршому випадку можуть призвести до небезпечних для життя реакцій серцево-судинної системи.
- при **алергії** (підвищеній індивідуальній чутливості) на йод. Така алергія являє собою рідкісний випадок і її не слід плутати з частими випадками алергії на контрастні речовини (які використовуються для покращення відображення різних органів під час процедур візуалізації, наприклад, рентген-діагностики).
- при **алергії** на інші компоненти препарату (кукурудзяний крохмаль, лактозу моногідрат, мікрокристалічну целюлозу, основний сополімер бутілметакрилату, стеарат магнію).
- при **герпетиформному дерматиті Дюрінга** (захворювання, основними проявами якого є: пухирі, почервоніння шкіри, шкірний висип та сильний пекучий свербіж, переважно на ліктях або колінах).
- при алергічному **запаленні стінок кровоносних судин** (гіпокомплементемічний васкуліт).

### Слід бути особливо обережним при застосуванні калію-йодиду (таблетки):

- при підозрі на **злоякісну пухлину щитоподібної залози**. Пухлини щитоподібної залози лікуються радіоактивним йодом. Прийом калію-йодиду у великих кількостях може унеможливити лікування пухлини.
- при захворюваннях, що вражають **трахею**. Прийом великих доз йоду може призвести до росту щитоподібної залози, що безпосередньо призведе до ще більшого погіршення стану вже наявного звуження трахеї.
- якщо ваша дитина проходить лікування з використанням **інгібіторів щитоподібної залози (антитиреоїдних препаратів)**. Проконсультуйтеся з Вашим лікарем щодо можливості застосування Вашою дитиною калію-йодиду (таблетки).

### Взаємодія калію-йодиду (таблетки) з іншими лікарськими засобами

- **На дію калію-йодиду (таблетки) впливають:** лікарські засоби, які впливають на метаболізм щитоподібної залози (напр., перхлорат, тиоціанати у концентрації вище 5 мг/дл). Вони пригнічують поглинання йоду щитоподібною залозою.
- **Калій-йодид (таблетки) впливає на дію:** Інгібіторів щитоподібної залози (антитиреоїдних препаратів)

**Препарат Kaliumjodid G.L. містить лактозу.** Проконсультуйтеся з Вашим лікарем щодо можливості застосування Вашою дитиною калію-йодиду (таблетки), якщо Вам відомо, що у Вашої дитини непереносимість цукру.

### Можливі побічні дії

Як і всі лікарські засоби, калій-йодид (таблетки) має побічні дії, які можуть проявлятися не у всіх.

Спостерігалися наступні побічні дії:

**Рідко** (можуть зустрічатися у однієї з 1000 осіб, які лікуються):

- Може вперше з'явитися невідома алергія на йод. При цьому така алергічна реакція може мати наступні прояви: почервоніння шкіри, свербіж та печіння в очах, нежить, рефлекторний кашель, діарея, головний біль та інші симптоми. Можливі небезпечні для життя реакції, особливо у випадку наявного герпетиформного дерматиту Дюрінга (захворювання, проявами якого в тому числі є: пухирі та почервоніння шкіри, переважно на ліктях або колінах) (див. вище: «Протипоказання до застосування калію-йодиду (таблетки)»).
- Васкуліт (запалення судин) (наприклад, вузликовий періартеріїт).

**Дуже рідко** (можуть зустрічатися у однієї з 10000 осіб, які лікуються):

- гіпертиреоз або гіпотиреоз щитоподібної залози. Ознаками гіпертиреозу можуть бути: підвищений пульс, підвищена пітливість, безсоння, тремор, діарея та втрата ваги, не дивлячись на підвищений апетит. При таких симптомах слід звернутися до лікаря.

**Частота невідома** (оцінка частоти неможлива через відсутність доступних даних):

- прийом калію-йодиду (таблетки) на порожній шлунок може спричинити подразнення слизової оболонки шлунку.
- запалення слинних залоз
- дискомфорт у шлунково-кишковому тракті
- незначний шкірний висип

### У загальному випадку:

Зверніться до вашого лікаря або фармацевта для отримання додаткової інформації або поради.