

Hozzájáruló nyilatkozat a kálium-jodid tablettákra vonatkozóan

Hozzájáruló nyilatkozat a kálium-jodid tabletták szedéséhez

Kedves Szülők! Kedves Gondviselők!

Az osztrák egészségügyi minisztérium több mint 30 éve ingyenesen biztosítja a lakosság számára a kálium-jodid tablettákat – beleértve az iskolák és óvodák számára is.

Miért és mikor fontos a kálium-jodid tabletták szedése?

Egy atomerőmű-baleset következtében felszabaduló radioaktív jód esetén a kálium-jodid tabletták stabil jóddal látja el a szervezetet, és így megakadályozza a pajzsmirigy nagyfokú sugárterhelését.

Miért fontos, hogy reaktorbaleset esetén időben bevegjük a kálium-jodid tablettát? A kálium-

jodid tabletták csak akkor nyújtanak védelmet, ha a radioaktív légtömegek érkezése ELŐTT veszik be őket.

Így a szervezet időt nyer, hogy „felépítse” a védelmet. A tablettákat már az oktatási intézményekben tárolják annak érdekében, hogy gyermeke időben megkaphassa azokat.

Mikor és kinek az utasítására osztanak kálium-jodid tablettát az iskolában?

A tabletták csak a sugárvédelmi hatóságok kifejezett kérésére adhatók be. Az iskolának szüksége van az Ön engedélyére ahhoz, hogy gyermekének csak közvetlen nukleáris veszély esetén – a sugárvédelmi hatóságok kérésére – adhasson hazavihető kálium-jodidot.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót a kálium-jodid tablettához tartozó használati utasításból, és adja át gyermekének az aláírt hozzájáruló nyilatkozatot, hogy magával vigye az iskolába. Köszönjük!

(A hozzájáruló nyilatkozatokat németül és 12 másik nyelven is megtalálhatja az interneten:

Nyomtatványok: www.schularzt.at)

Igazgatóság

Hozzájáruló nyilatkozat

Gyermek neve:

születési ideje:

A törvényes gondviselő neve:

- IGEN, hozzájárulok (az intézmény látogatásának időtartamára), hogy a sugárvédelmi hatóságok kérésére kálium-jodid tablettát adjanak gyermekemnek. Megerősítem, hogy nincs tudomásom arról, hogy gyermekemnek bármilyen intoleranciája vagy ellenjavallata lenne a tabletták szedésére, és hogy azonnal tájékoztatom az iskolát, ha bármilyen intoleranciáról vagy ellenjavallatról tudomást szerzek.
- NEM, nem járulok hozzá

Dátum:

Aláírás:

Felvilágosítás a káliumjodid-tablettákról (értelemszerűen kivontuk a használati utasításból)

Káliumjodid-tablettákat tilos bevenni, amennyiben:

- **pajzsmirigy-túltengés** áll fenn,
- **a pajzsmirigyben képződött, jóindulatú csomók esetében**, amiket nem kezelnek. Az ú.n. kezeletlen „forró pajzsmirigy-csomóknál” fennáll az a veszély, hogy pajzsmirigy-hormon masszív túltermelésére kerül sor, ami legrosszabb esetben a szív és a vérkeringés életveszélyes reakcióját válthatja ki.
- **Jóddal szembeni allergia (túlérzékenység) esetében**. Ez felettébb ritka és nem összetévesztendő a gyakori, kontrasztanyagok elleni allergiával (amelyek pl. a röntgendiagnosztikánál egyes szervek jobb láthatósága érdekében használatosak).
- **Tabletták** egyéb egyik összetevőjével szemben (kukorica-keményítő, laktóz-monohidrát, mikrokristályos cellulóz, alkalikus Butilmethacrilat-kopolimer, magnéziumsztearát) fellépő **allergia** esetében
- **Dermatitis herpetiformis Duhring** (hólyagocskák, bőrpirosodás, kiütés, csalánkiütés és első sorban a könyökön és térden fellépő, fokozott viszketegség) fennállásánál.
- A **véredényfalak** allergiára visszavezethető **gyulladás**a esetében (Hypokomplementaemiás érgyulladás).

Különös óvatosságot igényel a káliumjodid-tabletta bevétele következő esetekben:

- A **pajzsmirigy rosszindulatú daganatára** utaló gyanúnál. A pajzsmirigy daganatot radioaktív jóddal kezelik. Ha radioaktív jódot nagy mennyiségben szedünk, akkor ez a daganatkezelést lehetetlenné teheti.
- Olyan megbetegedéseknél, amik a **légcsövet** érintik. Nagy mennyiségű jódadagok megnövelhetik a pajzsmirigyvet, ami által a légcső már fennálló beszűkülése még rosszabb lehet.
- Amennyiben az Ön gyermekét **pajzsmirigyhormont gátló szerrel** (Thyreosztatika) kezelik. Kérjük, forduljon orvosához és kérdezze meg, hogy gyermeke szedhet-e káliumjód tablettákat.

Káliumjód tabletták egyidejű szedése más gyógyszerrel

- **A káliumjód tabletták hatását merőben befolyásolják:** olyan gyógyszerek, amelyek a pajzsmirigy anyagcseréjét befolyásolják (pl. Perchlorat, Thiocyanat 5 mg/dl-t meghaladó koncentrációban). Ezek megakadályozzák a jódot a pajzsmirigyben keresztüli felvételét.
- **A káliumjód tabletták befolyásolják a hatást:** pajzsmirigyhormont gátló szereknél (Thyreosztatika)

Káliumjodid G.L. laktózt tartalmaz. Ezért kérdezze meg az orvosát, hogy gyermeke szedhet-e káliumjodid tablettát, ha Ön tudja, hogy gyermeke cukornál fellépő összeférhetlenségben szenved.

Milyen mellékhatásokra kell számítani?

Mint minden gyógyszer, a káliumjodid tablettának is lehetnek mellékhatásai, amelyek azonban nem kell, hogy mindenkinél fellépjenek.

Következő mellékhatásokat figyeltek meg:

Ritkán fellépő esetekben (1000 kezelt beteg közül 1-nél):

- ismeretlen jódot-allergia első ízben felléphet. Ezek allergikus tünetek képében mutatkozhatnak, pl. bőrpirosodásban, a szem viszketésében és égésében, nátha formájában, száraz köhögés, hasmenés, fejfájás és hasonló panaszok formájában.

Dermatitis herpetiformis Duhring (hólyagocskák, bőrpirosodás, kiütés, csalánkiütés és első sorban a könyökön és térden fellépő, fokozott viszketegség) esetében életveszélyes reakciók léphetnek fel (lásd fent: „Káliumjodid-tablettákat tilos bevenni”).

- Véredények gyulladása esetében (pl. Periarteriitis nodosa).

Nagyon ritkán (10.000 kezelt beteg közül 1-nél):

- a pajzsmirigy jódot okozta túltengése vagy hipofunkciója. A pajzsmirigy túltengése

a pulzus fokozott működésével, verejték kitöréssel, álmatlansággal, remegéssel, hasmenéssel és fokozott étvágy ellenére fellépő testsúly-vesztéssel jelentkezhet. Ilyen panaszok jelentkezésénél forduljanak orvoshoz.

Ismeretlen (a rendelkezésre álló adatok alapján a gyakoriság ismeretlen):

- A gyomornyálka ingerlése különösen a káliumjodid tablettának éhgyomorra való bevétele miatt léphet fel.
- A nyálkamirigy gyulladása.
- A gyomor-bél-traktus panaszai
- A bőr enyhe kiütése.

Általánosságban következő a teendő:

Amennyiben további felvilágosításra vagy tanácsra lenne szüksége, forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.