



# Enalatab 5 mg

## Tabletten für Hunde

### Enalapril

#### Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile

1 Tablette enthält:

Wirkstoff(e):

Enalaprilmaleat 5,0 mg

#### Darreichungsform und Inhalt

Packung mit 100 Tabletten. Viertelbare Tabletten zum Eingeben.

#### Anwendungsgebiet(e)

Für Hunde:

Zur Behandlung von Herzleistungsschwäche beim Hund infolge angeborener oder erworbener Herzklappeninsuffizienz oder dilatativer Kardiomyopathie, als Zusatztherapie zum Diuretikum Furosemid.

**Enalatab 5 mg** verbessert die Belastbarkeit und erhöht die Überlebensrate bei mittelgradiger bis schwerwiegender Herzleistungsschwäche.

#### Gegenanzeigen

Nicht bei Überempfindlichkeit gegen Enalaprilmaleat anwenden oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht bei Tieren mit Anzeichen einer verminderten Herzauswurfleistung (bei Aortenstenose, Mitralklappenstenose, obstruktiver Kardiomyopathie) anwenden. Nicht bei trächtigen oder laktierenden Hündinnen anwenden. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

#### Nebenwirkungen

Zu Beginn der Behandlung kann Hypotonie mit ihren Folgen (z.B. Azotämie) vorkommen (bei weniger als 2% der behandelten Hunde). Diarrhöe, Erbrechen, Lethargie, Schwindelgefühl, Desorientiertheit und Koordinationsprobleme können ebenfalls auftreten.

#### Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Zum Eingeben.

0,5 mg Enalaprilmaleat pro kg Körpergewicht (KGW), einmal täglich oral. Durch die bei den **Enalatab 5 mg** Tabletten verwendete *Snaptab-Technologie* ist eine genaue Viertelung der Tabletten möglich. Enalatab 5 mg Tabletten sollten individuell nach Körpergewicht dosiert werden, was durch die Viertelung und einer Kombination von Tabletten mit verschiedenem Wirkstoffgehalt möglich ist.

#### Dosierungsbeispiele:


<b>2,5 kg KGW</b>	<b>¼ Tablette, 1 x täglich</b>
<b>5 kg KGW</b>	<b>½ Tablette, 1 x täglich</b>
<b>10 kg KGW</b>	<b>1 Tablette, 1 x täglich</b>

Je nach Schwere der Herzleistungsschwäche sollte der körperliche Zustand des Tieres regelmäßig überprüft werden. Die Dosis kann nach der klinischen Antwort des behandelten Tieres angepasst werden. Erfolgt innerhalb von 2 Wochen die erwartete klinische Antwort nicht, kann die Dosis von einmal täglich 0,5 mg Enalaprilmaleat pro kg Körpergewicht auf zweimal täglich 0,5 mg Enalaprilmaleat pro kg Körpergewicht erhöht werden. Die Erhöhung der Dosis kann vorzeitig erfolgen, wenn die Symptome der Herzinsuffizienz dies erfordern. Die Hunde sollten nach Behandlungsbeginn oder nach einer Dosiserhöhung 48 Stunden lang sorgfältig beobachtet und kardiologisch überwacht werden. Die Nierenfunktion sollte anhand von blutchemischen Parametern und Serumelektrolytkonzentrationen kontrolliert werden. Siehe auch unter Punkt „Besondere Warnhinweise“ und „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“.



### **Hinweise für die richtige Anwendung:**

Zur Sicherstellung einer korrekten Dosierung können die Tabletten in gleiche Hälften oder Viertel geteilt werden. Legen Sie die Tablette mit der Bruchrille nach oben und der konvexen (abgerundeten) Seite nach unten auf eine ebene Fläche.



*Halbieren:* Drücken Sie die Daumen auf beiden Seiten der Tablette nach unten.

*Viertel:* Drücken Sie den Daumen in der Mitte der Tablette nach unten.

### **Wartezeit**

Nicht zutreffend.

### **Besondere Lagerungshinweise**

Nicht über 25°C lagern. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

### **Besondere Warnhinweise**

#### *Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender*

Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden. Schwangere Frauen sollten das Tierarzneimittel mit besonderer Sorgfalt handhaben, um eine versehentliche Einnahme zu verhindern. Bei versehentlicher Einnahme ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage vorzuzeigen. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Nach der Anwendung Hände waschen.

#### *Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:*

Der Plasma-Kalium-Gehalt sollte vor und periodisch während der Behandlung kontrolliert werden. Beim Auftreten einer Hypokaliämie kann begleitend zur Enalatab 5 mg – Gabe eine Kaliumsubstitution erfolgen. Die Therapie mit Diuretika sollte mindestens einen Tag vor der Initialbehandlung mit Enalapril begonnen werden. Die Nierenfunktion sollte vor und 2 – 7 Tage nach Beginn der Behandlung kontrolliert werden. Im weiteren Verlauf sollte eine periodische Kontrolle der Nierenfunktion erfolgen.

#### *Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode*

Nicht bei trächtigen oder laktierenden Tieren anwenden. Nicht bei Zuchttieren anwenden.

#### *Wechselwirkungen mit anderen Mitteln*

Natriumchlorid kann die blutdrucksenkende Wirkung von Enalaprilmaleat abschwächen. Allerdings kann Natriumchlorid auch die Anzeichen der Herzleistungsschwäche verstärken.

Hyperkaliämie wird durch kaliumsparende Diuretika (Amilorid, Triamteren, Spironolacton) verstärkt. Verstärkter Blutdruckabfall bei gleichzeitiger Gabe von anderen Vasodilatoren und Diuretika macht eine Dosisanpassung erforderlich. Die gleichzeitige Gabe von nicht-steroidalen Antiphlogistika kann durch weitere Einschränkung der Nierendurchblutung zu einem Nierenversagen führen. Siehe auch unter Punkt „Besondere Warnhinweise“ und „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“.

#### *Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen und Gegenmittel), falls erforderlich*

Nach Überdosierungen können sowohl Azotämie als auch Blutdruckabfall auftreten. Die Dosis ist dann zu reduzieren.

#### *Inkompatibilitäten*

Keine bekannt.