



Anser Anser
Anser cygnoide
Famille Anatidae



Oie Domestique




Incubation :
30 jours
Poids d'un œuf :
120g à 200g



Origine :
Extrême
Orient
(oie cygnoide)



5 à
10 Kg



Envergure :
80 à 95 cm



20 à
25 ans

L'oie est principalement herbivore. Elle est ovipare (pond des œufs). L'oie ne commence à couvrir qu'au dernier œuf pondu, de manière que les oisons se développent et éclosent en même temps. Un œuf fécondé par le jars (mâle oie domestique uniquement) peut donc se conserver une quinzaine de jours avant d'être couvé et donner naissance à un oison.

Les oies domestiques descendent pour la plupart des oies cendrées et oies cygnoïdes.

L'oie avale des petits cailloux qui, une fois dans son gésier, faciliteront le broyage des aliments.

L'oie est un palmipède, oiseau aux pattes palmées.

Ses plumes sont imperméables grâce à une glande située au niveau de la queue. Cette glande produit un mélange de corps gras et de cires utilisé lors des séances de toilettage. Pour cela, l'oie va chercher les sécrétions de la glande et les étale sur son plumage, ce qui le rend imperméable.



Herbe, plantes,
Céréales en grains,
Insectes, vers



Prés herbeux
Etangs