

# Catálogo del herbario de los botánicos cordobeses

## Rafael de León y Gálvez, Fr. José de Jesús Muñoz Capilla, Rafael Entrenas y Antonio Cabrera

Por **DIEGO JORDANO** y **MANUEL OCAÑA** \*

### Introducción

Este herbario se conserva en la cátedra de Biología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Los familiares del P. Muñoz Capilla debieron donarlo a mediados del siglo XIX, años después de la creación de este centro de enseñanza. En 1947, el Profesor A. Cabañero, Director del Jardín Botánico de Madrid, encomendó a Diego Jordano la revisión del herbario y la publicación de un catálogo, porque suponía que, dadas las relaciones que hubo entre Muñoz Capilla y Mariano Lagasca, sería probable encontrar datos y ejemplares de valor, y acaso tipos, del más ilustre de los botánicos españoles.

G. Bellido rompió la ordenación linneana y reagrupó los pliegos según la clasificación de De Candolle, hace unos veinticinco o treinta años. Por eso y por el mal estado de conservación en que se encontraba hubimos de acometer la tarea de restaurarlo y darle el orden primitivo

En las primeras páginas de este catálogo se encontrarán datos de los botánicos cordobeses que intervinieron con aportaciones de muy diversa importancia, y se hace declaración expresa del auxilio recibido de don Mariano Lagasca, de puño y letra de Muñoz Capilla.

Los números marginales corresponden a la numeración de los pliegos. Marcamos la terminación de cada renglón con /. Todo cuanto no figura en el herbario y se debe a nuestra pluma va incluido entre corchetes. p. ej.: [tachado].

Varios discípulos del Laboratorio de Biología nos han ayudado considerablemente a restaurar, reordenar y fichar; entre otros: A. Ca-

(\*) Laboratorio de Biología. Facultad de Veterinaria, Córdoba (España).

sado (†), J. Carranza, J. Pérez Aragón, G. Díaz Acedo, D. Dueñas, F. Crespo Hidalgo, L. Ramírez Martínez y A. de Cáceres. A todos ellos expresamos aquí nuestro agradecimiento.

### **Especies críticas o nuevas**

Veinte y tres ejemplares están clasificados como especies nuevas o posiblemente nuevas, con más o menos dudas. Son:

248. <i>Primula veris</i>	1000. <i>Hesperis cheirantus</i>
287. <i>Campanula</i>	1005. <i>Turritis</i>
434. <i>Alsine mucronata</i>	1082. <i>Fumaria</i>
581. <i>Silene gallica</i>	1094. <i>Polygala extraaxilaris</i>
589. <i>Silene viscosa</i>	1168. <i>Vicia</i>
623. <i>Oxalis</i>	1286. <i>Lotus</i>
637. <i>Euphorbia spatulata</i>	1355. <i>Onopordum</i>
642. <i>Mespilus Chamaemespilus</i>	1356. <i>Onopordum</i>
692. <i>Cistus Thimifolius</i>	1382. <i>Gnaphalium sthechas</i>
844. <i>Antirrinum</i>	1531. <i>Micropus</i>
866. <i>Antirrinum</i>	1536. <i>Viola heterofila</i>
	1589. <i>Croton tinctorium</i>

### **Notas autógrafas**

Como Muñoz Capilla utilizaba, para hacer las papeletas, fragmentos de cartas y documentos, hay muchas notas y trozos de correspondencia no botánica, de cierto interés para la historiografía cordobesa. No se incluyen en este catálogo, pero esperamos publicarlas algún día.

La escritura de Muñoz Capilla (figura 1.<sup>a</sup>) es armónica, elevada, delicada, clara y ordenada. Los autógrafos de Cabrera (figura 2.<sup>a</sup>) son rápidos, de grandes rasgos desproporcionados y enérgicos. Sus mayúsculas son grandes y adornadas. La escritura de Entrena (figura 3.<sup>a</sup>) es sencilla y ensiforme. De cuando en cuando se ven notas de Lagasca. Generalmente corresponden a rectificaciones hechas en la clasificación realizada por el sabio agustino.

### **Portada (fig. 4.<sup>a</sup>)**

HERBARIUM / amplissimum, ac his/toricum:/ in quo no tantum/  
plurimae indigenae, / sed etiam multae exo-/ ticae plantae continen-  
tur, et praecipue, quae/ prope Cordubam sponte/ crescunt:/ colectum  
exsicatum, atque justa/ Linnaei doctrinam dispositum á/ Raphaele  
de Leon et Galvez philo-botanico / cordubensi.

Clasis/prima/Monandria./Ordo/primus/Monogynia./MDCCXCIII.

Guarda.

Dn. Rafael Leon y Galvez natural de Cordoba/nacio en 26 de Junio de 1772 dedicado al estudio/de la Farmacia en la Botica de mi padre D. Roque/Muñoz Capilla se aplico con tésón a la Botanica/bajo la direccion de D Bruno Fernandez: cultivo/un Jardin Botanico en la botica de D. Roque: pa-/so á Cataluña de practicante de Farmacia en el / Exercicio el año 1790, y de buelta á Madrid, se es-/tablecio en la Corte de Mancebo, y alli se entrego/ con una aplicacion incesante al estudio de los tres/Reinos de la Naturaleza, de la Química, y de las/ demas Ciencias Naturales: obtuvo una Catedra en el/ Colegio de Farmacia: fue secretario del mismo y / habiendose separado de estos destinos á la entrada/ de los Franceses puso botica propia y murio en el / año 1811. Escribio una Memoria sobre el uso de/ la pita para el cordaje que merecio el premio de/ la Sociedad economica de Sevilla: y dexo M. S. varios tratados elementares de las ciencias que / enseñaba en el Colegio. Vivio sin proteccion y/ murio de 39 años quando iban madurando/ los frutos de sus tareas y de su talento./ A las plantas que dexó colectadas Leon de las quales/ se han perdido las más he añadido las cogidas por mí/ en Cordoba, Sierras de Segura y cercanias de Regla/ Fr. Jose de Jesus Muñoz [rubricado] /Cordoba Año de 1830-/

Herbarium collectum á F. Josefo á Jesu Muñoz/ tum (propiis) [tachado propriis] suis rusticationibus ac itineribus/ tum suorum amicorum auxiliis Raphaelis Leon/ Raphaelis Entrenas, Antonii Cabrera et Mariani/ Lagasca Primi apud Hispanos Botanici ab anno/ 1793 ad annum/

Clasis 1.<sup>a</sup>/ L Canna Indica se cultiva en Cordoba/ L Salicornia Herbacea Costas de Andalucia/ Clasis 2 / L. Nictantes Sambac C.C / L. Iasminun officinale morisco/ L grandiflorum - real/SS [tachadas] Lingustrum vulgare S. S./ Phylirea latifolia S. S./ angustifolia. S. S./ media S. S./ rorismarinifolia V. S. S. L. Syringa persica C. C./ Veronica baccabinga. S. S./ arvensis. C./ anagalis. S. S./ agrestis. C./ acinifolia C/ longifolia V. b Guadazuheros/ Spicata S. S./ Pinguicula vulgaris. Navalasna/ E Verbena Supina C/ E officinalis C/ L Caroliniana C. C./ L. Noviflora c. Sevilla/L Citriodora C. C./Viedma Salvia officinalis C.C./ etiopis. S. S./ coccinea. C. C./ L amplexicaulis./ officinalis Elchecico/ Iclarea. C. C./ L Verbenaca / L tiliafolio/ L. verticilata/ L. indeterminada/L. ceratophiloides./L. glutinosa Web./ Iustitia Coccinea. st. R. Ul./

1. *Canna indica* W/ se cultiva en Cordoba./

*Monandria Monogynia./G. Salicornia /*

2. *Salicornia* (Herbacea) herbacea/ patula, articulis apice compresis/ emarginato-bifidis. Pract Botan./ de Lin. pr. Palau tom. 1.º pag 22./ *Salicornia* geniculata annua./ Tourn. Cor. 51. Flora C.ª t.º 6º 234 / *Salicornia*. Dod. pempt. 82./ *Kali*. C. B. com Mat. 364./ Esta planta se cria en las/ riveras del Mar y en terrenos/ salitrosos. Me dio este esqueleto/ en Sevilla Dn. Anastasio Guzm.n/ año de 1793./

*Clasis./ Diandria./ Ordo./ Monogy-/nia.*

3. *Nyctanthes* (Sambac) foli-*is* inferioribus cordatis, obtusis:/ superioribus ovatis acutis. Pract./ Bot. de Lin.pr. Palau. t.º 2.º p.ª 37./ *Syringa Arabica*, foliis Ma-/liaurantii. C. B P. 398. Flora/ Española tomo 5.º p.ª 261./ Esta preciosa planta se culti-/ba con mucho esmero en los Jardí-/nes y muchas casas particulares/ de Cordoba, por (su) [tachado] el esquisito y / suvido olor de sus flores. La dan/ el nombre de *Diamela*. Es Ar-/busto: florece en todo el verano:/Habita en la India Lin.

4. *Jasminum* (Officinale) foliis oppositis, pinnatis:/foliolis distinctis. Pract. Bot. de Lin.pr. Pal. t.º 1.º 40 / *Jasminum* vulgare. flore albo. T. Ins. R. H. 597 Quer Flora Española t.º 5.º pag. 259./ Se cultiva en Cordoba en muchisimas ps / con la denominacion de *Jasmin morisco*. es pe./crece de 7 a 8,ps mui ramosa y debil, fe. en Mayo. [Reverso]: *Gelsiminun*. C.B.com Math in Diosc. 86.

5. *Jasminum* (grandiflorum) foliis opositis,/pinnatis: foliolis extimis confluentibus./Lin. Sp. Plant. pr. pu. t.º 1.º p.ª 41./ *Jasminum Hispanicum*, flore majore,/ externe rubente. T.Inst.R H. 597. Flora Española t.º 5.º f.º 260./ vulgo *Jasmin Real* / No se dice que se crie espontaneamente/ en España; pero sí se cultiva en toda ella, par-/ticularmente en Cataluña, por lo que es conoci-/do en la Europa toda con el nombre de *Jas-/min Barcelonés* Quer. Es Arbusto que/ crece mui ramoso á la altura de doze ó ca-/torze pies, mui debil por lo que es menester te-/nerlo enjardinado: florece desde fines de la/ Primavera hasta el Invierno./ En Cordoba se cultiva en todos los Jar-/dines: y son pocas las casas donde no hai *Jas-/min*: donde se hacen Ramos mui artificiosos/de sus flores. [Reverso]: *Jasminum/Jasminum Hispanicum*, gran-/deflorum. C. B. com. Mat. 87.

6. *Ligustrum vulgare*/W./ stilo bifido

7. *Philirea*/ media.

8. *Phyllyrea* / *angustifolia* W.
- 9 *Phyllirea* *latifolia*/ W./ Siles
10. *Phillyrea* *rorismarini*/ folio W. Es variedad/ de la *angustifolia*.
11. *Syringa* (*Persica*) Vs. a *laciniata*. P./ Bot de Lin.pr Palau t.º 1º p.ª 50./ *Syringa* *foliis lanceolatis, integris, dissectisque*. Lin. Hort. Clifort. 6./ *Lilac laciniato folio*. Tourn Inst./ R Her 602. Flora Española t.º 5.º 343./ Don Josef Quer en su Flora España dice haberla visto en los cerros del termino del lugar de Miraflores de la Sierra; y tambien en los de Bustarvi/ejo. Se cultiba en Cordoba en el Jar/din del Obispo, y en los del Marques/ de Villaseca, y en otros de curiosos / Es un Arbustico endeble que crece/ de quatro á cinco pies, florece en Mayo/ y Junio./ En sentir de algunos Botanicos esta/ que Linneo pone por variedad de la Sy-/ringa; *Persica*; se debe tener pr. especie distinta.
12. *Veronica* *spicata* [tachado *spicata*] W./longifolia W/varietas β.
13. *Veronica* *spicata* W/Siles.
14. *Veronica* *Baccabunga*/ W.
15. *Veronica* *anagalis* /W.
16. *Veronica* *agrestis*/Cordoba W.
- 17 *Muy rara y escasea*/ *Veronica* *Arvensis* W. ¿an *agrestis* W?
18. *Veronica* *arvensis*/W./Cordoba.
19. *Veronica* (*arvensis*) *floribus solitariis, foliis corda-/tis incisis pedunculo longioribus*. Pract. Bot. de Lin./por Palau tº. 1º. pag. 73./ *Veronica* *flosculis cauliculis adherentibus*. T. Inst./R. H 145. Flora Española t'. 6º. pag. 455./ Esta especie nace con frecuencia en los Jar/dines y tierras cultivadas de Cordoba: crece dere-/cha, florece en el principio de la primavera, es annua.
20. *Veronica* *acinifolia*/W.
21. *Pinguicula* *vulgar*/ Navalasna en el/arroyo qe. baja á/espaldas de la Casa/en Junio de 1829.
22. *Verbena* (*Nodiflora*) *tetrandra, /spicis capitato-conicis, Foliis ser-/ratis, caule repente* Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 1º. pag. 110./*Verbena* *nodiflora*. C. Bauh./comment Mat. sup. Diosc. 742./Coji esta planta en el Jardin/Botanico de Sevilla año de 1793./ Se cria en Virginia y Sicilia: y en/España en Barcelona y Valencia/ cerca del Mar.Palau./Su raiz es perenne.
23. *Verbena* *Caroliniana* L/Entrena.
24. *Verbena* (*Caroliniana*) *tetrandra, /spicis filiformibus, foliis*

indivisis lan-/ceolatis serratis obtusiusculis subses-/silibus. P. B. de L. pr. Palau tº. 1.º 111.../Habita en la America Septentrio-/nal. Pal /Su raiz es perenne /Me dio este esqueleto Don/Anastasio Guzman, en Sevilla/ en Septiembre del año de 1793./ con aquel nombre generico y especifico.

25. Vervena officinalis (Lin).

26. Verbena Supina.

27. Verbena citridora/Entrena.

28. Class. Secunda Diandria Ordo/Monoginia / *Salvia officinalis*: Linn Tomo/2º. pr. Palau pag.<sup>a</sup> 128/ *Salvia* officinal/Esta util y salutifera planta/se cultiva en Cordova pr. algunos/curiosos, bajo el nombre de *Salvia*/fina; desde que se principia a/cultivar, pierde mucha parte de/la finura y grato aroma que po-/see en las sierras de Granada/de donde probablen.te la traerian/a esta Ciudad, pues que en esta/Sierra no se cria: es poderoso remedio contra todas las/enfermedades de Nervios, toni-/ca, Estomatica, y un poco astrin/gen-te; ultimamte. los antiguos/ ponderaron tanto sus virtu/des, que pr. ella preguntaron a el oraculo: «Cur moriatur/ «homo, dun *Salvia* nascatur in/ «Horto» a que respondio «con-/tra vim mortis, non est me-/dicamentum in Hortis» como/ indicando, qe. ano ser pr. esta/ razon, seria un remedio uni-/versal.

29. *Salvia officinalis*? /12. C. [tachado]/ esta es la mas fina qe/ llaman Granadina/ V. 5 de Julio.

30. *Salvia Verbenaca*

31. *Salvia* (Verticillata) foliis corda-/tis crenato-dentatis, verticillis sub-/nudis, stilo corollae labio inferiori-/ incumbente. P. B. de L. pr P. tº. 139 /*Horminum* sylvestre latifo-/lium verticillatum. T. Inst. R. Her./178. Flora Espa. tº. 5º. pa. 237./ Esta especie se cria en Castilla/la vieja acia la Ciudad de Avila:/ en la Alcarria, y Serrania de Cu-/enca. Quer Florece en el Estio. / Coji este esqueleto en el Jardin/ Botanico de Sevilla año de 1793.

32. *S. glutinosa* L./ *Salviae* species.

33. Clas Iª. Diandria Ord. Monoginia/ *Salvia sclarea*/Linn. Tom 1º. pag.<sup>a</sup>. 143/ *Salvia* Esclarea (vulgo) Amaro. [Reverso]: *Salvia Sclarea*.

34. *Salvia etiope*

35 *Salvia* (ceratophylloides) foliis pin-/ natifidis rugosis villosis, caule pani-/culato ramosissimo. Pract. Bot. de/Lin. pr. Palau tº. 1º. pag. 144/Habita en Sicilia y Egipto Palu./ Esta especie la he

visto cul-/tizada en el Jardin Botanico de/ Sevilla; en donde coji este esque./leto en Septiembre de 1793.

36 *Salvia* (coccinea) foliis cordatis/ ovatis acutis serratis, subtus mol-/lissime tomentosis; racemo termi-/nali verticillato. P. B. de L. pr. P. t.º 1.º 148./Habita en el Cabo de Buena-espe-/ranza Lin. pr. Pal./He visto esta especie cul-/tizada en el Jardin Botanico de/ Sevilla; de donde traje á Cordoba/ semilla de ella, y este esqueleto/ en el mes de Septiembre del año/ de mil setecientos noventa y tres.

37. *Salvia amplexicaulis* Lamarr/ C m R H M

38. *Salvia tilifolio*. [Reverso]: an *Serotina*?

39. *Salviae* especies.

40. *Fraxinus ornus*

### Triandria Monogynia.

41. *Valeriana* (Rubra) floribus mo-/nandris caudatis, foliis lanceolatis in-/tegerrimis. Pract. Bot de P. t.º 1.º 181./ *Valeriana rubra*. T.I.R.H./ 131. F. C t.º 6.º 443. Dod. pempt. 91./ *Valeriana rubra dicta*. C. B./ com. Mat. in Diosc.p<sup>a</sup>. 40./ Se cria en España en Aragon/ cerca de Villarluego, Montalvan,/ Camarena etc. Quer./ En Cordoba se cultiva en los/ Jardines, y por los curiosos./ Crece dos á tres pies de alto:/ produce muchas ramas, es perenne/ y florece en los Meses de Abril/ y Mayo.

42. *Valeriana calcitrapa*? / Mayo vespere lugubri/ Viznagar?/ An dioica? [Otra etiqueta]: *Valeriana* / V. 5 de Julio

43. *Valeriana* (Cornucopiae) floribus diandris ringentibus/ foliis ovatis sessilibus. P. B. de Lin. pr. Pal. t.º 1.º pag. 182./ *Valerianella cornucopioides*, flore galeato./ T. Inst R. H. 133. Flora Española t.º 6.º pag. 446./ *Valeriana peregrina purpurea*. C. B. comm./ Matt. sup. Diosc. pag. 40./ Esta especie se cria en todos los campos de la-/ bor del circuito de Cordoba: es annua fe. en Abril.

44. *Valeriana dioica* W./ 1834/ Cordoba.

45. *Valeriana* (Phú) floribus triandris,/ foliis caulinis pinnatis, radicalibus in-/divisis. P. B. de Lin. pr. P. t.º 1.º p.<sup>a</sup> 184./ *Valeriana hortensis*, Phu fo-/lio Olusatris, Dioscoridis. T. Inst. R./ H. 132. Quer F. E. t.º 6.º p.<sup>a</sup> 442./ Phu magnum. C. B. com. Mat./ sup. Diosc. 38. Lag. 19 / *Valeriana hortensis*. Dod p. 349./ Farm: *Valeriana mayor* / Se cultiva en Cordoba esta Va-/leriana, en la Alameda, y yo/ la he cultivado, y remitido al Jar-/din Botanico de Sevilla planta/ viva.

Es perenne y florece en/ Mayo y Junio. Se usa su raiz en/ la Medicina.

46. Valeriana/ tuberosa W.
47. Valeriana locusta / v. coronata. 19. C.
48. Valeriana species / Valeriana locusta.
49. Valeriana /pumila/ fructu/ 6-dentato/ caule simplici/ foliis immis linearibus in-/tegris summis trifidis.
50. Loeflingia hispanica /Lin/ Soto de Migs calientes. [Otra etiqueta]: 35 Loeflingia. H / Cordoba.
51. Iris pseudo acorus W./ imberbis foliis ensiformibus/ petalis alternis stigmatibus/ minoribus. Germen trigo-/ num angulis sulcobilidis.
52. Yris Virginica.
53. Class. Tertia Triandria. Ord./ Monoginia / Yris Martinicensis? / Linn. pr. Palau tomo 1º. p.<sup>a</sup>/ 241 Lirio de la Martinica. es planta cultivada / en casi todos los jardines/ nes de Cordova y entre/ ellos en el de casa donde cogí este esque-/ leto
54. Triandria Trigynia./ Yris Persica
55. Schenus fuscus / W.
56. Cyperus Fravescens W.
57. Cyperus Fuscus W.
58. Ciperus flannonicus /W.
59. Scirpus Lacustris/ Cabrera.
60. Scirpus holoschaenus (Cav).
61. Scirpus autumnalis/ W.
62. Scirpus Sylvaticus. W.
63. *Cenchrus capitatus*/ Esta planta se la en-/vie al S.or Ortega, por Anthoxanthum? :y á/ la verdad, ni yo le he vis-/to fs. ms., ni tres estambres ni 1 pistilo; sino todas hermaf/ dos estambres, y dos pist.os
64. Sacharum Cilindricum./ (Cav) / Hermosa Grama/La he cogido frente de Casillas/ Por el lado opuesto a la Alameda.
65. Phalaris nudusa?/ nodosa W.
66. Panicum Viride Lin.
67. Panicum Sanguinale Lin
68. Panicum Crus-corví (Cavs)
69. Panicum Dactilon (Lin)/ ó Paspalum Dactilon (Cavans).
70. Panicum Asperrimum Lag<sup>a</sup>. C in R H M.
71. Panicum Coloratum (Lin.) / P. Repens et P. coloratum (Cavans) / Cavans ha reunido estas dos especies/ en una

72. *Panicum Repens* Cav. / *P. Coloratum* L.
73. ¿*Phleum Bellardi* W.? / *P. Nodosum* W.?
74. *Alopecurus pratensis* / W. [Otra etiqueta]: *Alopecurus Pratensis*. L. / En esta especie faltan las aristas á la / corola. Son de notar las glumas del / caliz comprimidas *graciosam.te*
75. *Alopecurus Agrestis* L.
76. *Alopecuro* / arrodillado.
77. *Alopecurus Monspeliensis* / *Agrostis Panicea*. W. / Willdenow ha hecho un agostis de / este *Alopecurus* reuniendo las dos / esp.s *Panicum* y *Monspeliensis*.
78. *Alopecurus Paniceum* (Cavans).
79. *Millium effusum* [tachado] / 16. L. / *Sorghum halepense* / *Millium halepense* Cav.
80. *Millium Multiflorum* (Cavans).
81. *Rara* / *Agrostis interrupta* W.
82. *Agrostis canina* L.
83. *Agrostis Capillaris* L.
84. *Agrostis capillaris* Lin.
85. *Agrostis minima* W.
86. *Agrostis Minima* W.
87. *Agrostis vinealis*: vars.  $\beta$ . W. / *A Gigantea* Roth.
88. 25 *Aira* H.
89. *Aira Aquatica* L.
90. *Aira Cespitosa* L.
91. *Melica Nutans* L. / C in R H M.
92. *Melica altissima*.
93. *Melica Montana* Cav.
94. *Melica Montana* Cav.
95. *Poa*.
96. *Poa*.. n.º 12 L / n.º 11 H. / *Poa annua*.
97. *Poa* n.º 11 / *megastachya* L. Peas. / n.º 10. H / *Briza eragrostis*. [Otra etiqueta]: *Briza eragrostis*. L. / ó *Poa Eragrostis* L. / Entrena / Estas dos plantas se confun / den y acaso son una misma / Cavan.s p.<sup>a</sup> 312.
98. n.º 14. L. / n.º 13 H. / *Poa rigida*.
99. *Poa Rigida* Cav.s
100. *Poa Bulbosa* L.
101. *Poa pratensis* [tachado] n.º 9 L. / *Briza minor* n.º 5 H / esta es

102. *B. virens*/Entrena/8/Briza L. n.º 8 media/ *virens*.- -H n.º 8.  
 103. Briza media./ *Poa* [tachado] n.º 7 L. *varietas* / *maxima*/  
 n.º 7 H. media.  
 104. Briza ó *Poa* /*maxima*.  
 105. Briza *maxima*/ *Poa* n.º 6 L./6 H.  
 106. *Cynosurus Echinatus*. L. [Otra etiqueta]: n.º 15. L/n.º 14  
 H./ *Cynosurus echinatus*  
 107. *Andropogon* [tachado] L n.º 5/H n.º 4/*Cynosurus aureus*.  
 108. *Festuca*/ *Dumetorum*/W.  
 109. *Festuca foenicoides* /n.º 3 L/n.º 2 H.  
 110. *H Bromus matritensis*. / y Lag.  
 111. *Festuca foenicoides*/n.º 3 L/n.º 2 H/ *Bromus*/*mollis*.  
 112. *Bromus Mollis* L.  
 113. *Bromus Pinnatus* L [Otra etiqueta]: *Bromus Pinnatus*, L.  
 114. *Stipa plumosa*/v. *pennata*/ n.º 1 H. [Otra etiqueta]: *Stipa*  
*Pennata* L./Entrena.  
 115. ¿*Stipa capillata* L? [Otra etiqueta]: *Stipa Juncea*/Cabrera.  
 116. *Avena Elatior*. L. [Otra etiqueta]: *Avena Elatior*.

### Triandria Digynia

117. *Avena* [Otra etiqueta]: *Avena fatua*.  
 118. n.º 13 L *avena panicea*/n.º 12 H./ *Bromus* [tachado]. [Otra  
 etiqueta]: *Avena Panicea* Lamarc.  
 119. *Arundo* Species?  
 120. ¿*Aristida Hystrix* L? /No es la *A Elatior*. [Otra etiqueta]:  
*Aristida* /*Elatior* /*Cavanilles*/Cabrera.  
 121. *Lolium* (*temulentum*) *spica aristata*, *spiculis com-/pressis*  
*multifloris*. *Pract. Bot. de Lin. pr. P. t.º 1.º p.ª 482.* /*Gramen Lolia-*  
*ceum*, *spica longiore*, *aristas/ habens*. T. I. R. H. 516. *Flora Espa-*  
*ñola t.º 5.º pag. 176.* /*Lolium*. Lag. 187. C. B. com. *Mat. sup. Diosc.*  
 331./ Esta planta se cria entre los sembrados de las/ *Campiñas* de  
 Cordoba y en los del ruedo de la Ciu-/dad, la llaman vulgarmente  
*Ballico*; es *annua*/ Florece en Abril.  
 122. *Rottboellia cylindrica*. W./Entrena. [Otra etiqueta]: *Rotbo-*  
*llia Cilindrica*/Schreber/ Cabrera.  
 123. *Aegilops ovata*/Linn./R.1 Casa de Campo/Madrid.  
 124. *Aegilops*/Ovata -t. L G L.  
 125. La creo un *Andropogon*/ *Andropogon hirtus*. (Wild).

126. *Alopecurus agrostis* [tachado] / *Andropogon hyrtum* 17 L.  
[Otra etiqueta]: Puede ser mas bien/ *Andropogon ischoemum*/L. /Yo  
asi lo tengo deter/minado Entrena.

127. *Holcus Spicatus* L.

128. Remito á Vmd el exemplar / que me encargó del *Holcus*  
*Saccharatus* L./ en mejor estado qe el otro.

129. *Secale cereale* Cav.s

130. *Triandria Digynia Hordeum Vulgare*/Cabrera.

131. *Hordeum/Nodosum*/Cabrera.

132. *Triandria. Digynia /Hordeum. Hordeum* (Murinum) flos-  
culis lateralibus mas-/culis aristatis, involucris intermediis ciliatis./  
Pract. Bot. de Lin pr. Palau t<sup>o</sup> 1.<sup>o</sup> pag. 521./ *Gramen secalinum*, spi-  
catum, vulgare. /T. I. R. H. 517. Flora Española t.<sup>o</sup> 5.<sup>o</sup> pag. 189./Esta  
especie se cria con abundancia en/Cordoba en los alrededores y  
algunas calles/poco pisadas de la ciudad. es annua fe. en Abril.

133. *Triticum* (aestivum) calycibus quadrifloris ventri-/cosis  
glabris imbricatis aristatis. Pract. Botan. de/Lin. pr. Palau tom. 1.<sup>o</sup>  
pag. 523./*Triticum aristis longioribus. spica alba.* Tour./Inst. R. H.  
512. Quer Flora Esp. t.<sup>o</sup> 6.<sup>o</sup> pag. 427./Bien savida es la fertilidad de  
las Campiñas de/ Cordoba, particularmente en criar los trigos que,  
anu-/almente se siembran en sus dilatadas tierras.

134. *Triticum Maritimum* L/ No creo qe. sea trigo.

135. *Triticum Ciliatum.* Cav.

136. 2.<sup>o</sup> 24 H./Emparedada/1 de Sbre. de 815

137. *Globularia vulgaris.* [Otra etiqueta]: *Globularia vulgaris*  
W./ caule folioso foliis ovatis/ integerrimis. Siles/20 de Marzo.

138. *Globularia/spinosa*/W.

139. *Scabiosa leucantha* L./*Lepicephalus leucanthus* Lag /Viz-  
nagar 24 Julio.

140. *Scabiosa* (succisa) corollulis quadri-/floris aequalibus, cau-  
le simplici, /ramis approximatis, foliis lance-/olato-ovatis. P. B de  
L. pr. t.<sup>o</sup> 1.<sup>o</sup> 603 / *Scabiosa folio integro gla-/bro.* T. I. R. H. 466.  
Flora Espa-ñola t.<sup>o</sup> 6.<sup>o</sup> pag. 260./ Esta especie vi cultivada/en el  
Jardin Botanico de Sevi-/lla donde cogi este esqueleto, en/ Septiem-  
bre de 1793. Se cria en/ muchas partes de España: su/ raiz perenne,  
florece en el Estio.

141. *Scabiosa arvensis*/W.

142. *Scabiosa arvensis*/Sierra de Segura/Siles.

143. *Scabiosa Stellata*/Cabrera.

144. *Scabiosa Stelata*/varietas minor  $\alpha$ .
145. *Scabiosa stellata* L./ *Asterocephalus* Lag./Viznagar. [Otra etiqueta]: *Scabiosa*/ Viznagar 26 Julio.
146. Clas. 4 *Tretrandria* ord. *Monoginia*/*Scabiosa* (Atro-purpurea) / Linneo Tomo 1.º Pag. 611 / (Vulgo) / viuditas.
147. *Scabiosa ochroleuca*/ de Chipiona á/Regla [Otra etiqueta]: *Scabiosa ochroleuca*/ Cabrera.
148. *Scabiosa rutaefolia*?
149. *Scabiosa Rutofolia*/ Cabrera.
150. *Scabiosa tomentosa*. Cav. Ic./ *Asterocephalus tomentosus*/ Lag./ Sierras de Segura.
151. *Scabiosa*.
152. *Scabiosa*...?/ La especie no se puede/ determinar sin ojas./ Entrena.
153. *Sherardia Arvensis*. L.
154. *Asperula Arvensis*/ Cav/
155. *Asperula arvensis*.
156. *Asperula*/ *odorata*/W. [Otra etiqueta] Especie de la anterior/ *jazminum redolet.*/ *Asperula* Si/Vzgr. 20 Julio.
157. *Asperula* (*arvensis*) *foliis senis, floribus terminalibus*) *sessilibus aggregatis*. P. Bot. de Lin. pr. Palau. t.º 1.º pag 634./ *Gallium arvense*, *floré caeruleo*. T. Inst R. Herb./115. Quer Flora Española t.º 5º pag. 149./ *Asperula caerulea*. Dod. pempt. 355./ Esta planta se cria entre los sembrados de los alrre-/dedores de Cordoba, con especialidad en los que estan/ situados hacia la falda de la Sierra./ Es annua y flo-/ rece en los meses de Abril y Mayo.
158. *Asperula cynanchyca* L. [Otra etiqueta]: Corola monopetala tubo infundibili/ forme lacinias 4 =estambres 4 ó /anteras oblongas pegadas al borde /interior del tubo= estilos dos fili-/forme mui [tachado] cortos qe. apenas suben/ la [tachado] 1/3 del tubo= estigmas en cabezuela/ germen bilocular.
159. *Asperula*/hexaphila/W.
160. *Gallium Montanum* L.
161. *Tetrandria Diginia*/ *Gallium*. [Otra etiqueta]: *Galium Verum* L./ ó/G *purpureum* L./ Entrena.
162. *Gallium Aparine*/ Entrena.
163. *Gallium caesaraugustanum* L.
164. *Gallium Erectum*/ Cavn. lles/ Cabrera
165. *Gallium Latifolium*. L./*Gallium foliis senis obovatolanceo-*

latis/ retrorsum serrato-aculeatis panicula difusa, /flore Luteo./ Las corolas son quinquefidas con cinco estam/bres y todas abortan; lo he hallado en la Campiñue/la y en la Palomera. observando en ambas los/ mismos caracteres




Figura 1.ª - Autógrafo del P. Muñoz Capilla, en su herbario.

166. Class. IV Tetrandria Ord. Monoginia/ Crucianela Angustifolia L.? /Linn. Tom. 1.º pagª. 662/ Crucianela de oja angosta. [Otra etiquetá]: Esta especie esta equivocada/pues no tiene flores/ espigadas, dudo que/ sea crucianella.

167. Crucianella Angustifolia L.

168. Crucianela/angustifolia. [Otra etiqueta]: Crucianella/Angustifolia L/Cabrera/ de los puertos apdnos. [Otra etiqueta]: Crucianela/ de Cordoba/ seran variedades.

169. Crucianela/marítima.
170. *Plantago* (major) foliis ovatis glabris,/scapo tereti, spica flosculis imbricatis./Lin. Spec. Plant. pr. pu. t°. 1°. p<sup>a</sup>. 691./ *Plantago latifolia*, sinuata. Tourn./Inst. Rei Herv. 126. Flora Española t°. 6°. 107./*Plantago major*. Lag. in Diosc. 209./Dod. pempt. 107 / vulgo: Lanten./ Esta Planta es muy comun en Cordoba:/abunda mucho en las huertas, en los Arro-yos de las peñas, y Pedroches, y en sotos/humedos. Es perenne, y florece por Ma-yo y Junio. [Reverso]: *Plantago* (major) foliis ovatis glabris,/ scapo tereti, spica floribus.
171. *Plantago Media*.
172. *Plantago lanceolata*/v  $\beta$  /trinervia/W.
173. *Plantago* (Lanceolata) foliis lanceolatis/spica subovata, nuda, scapo angulato./ Palau: t. 1.º p. 654.
174. *Plantago* (Albicans) foliis lanceolatis obliquis villosis, spica cylindrica erecta, scapo tereti. P. B. de L. p P. t°. 1.º pag. 695./ *Plantago angustifolia*, albida, Hispanica. T I R. H /127. Quer Flora Española tom. 6.º pag. 109./*Holostium hirsutum albicans majus*. Casp. Bauh./ commet Matth. sup. Diosc. 687./ Se cria esta especie en los alrededores de Cordoba/ en sitios aridos como margenes de caminos, paredones, y terrrenos de esta naturaleza: es su raiz pe, fe. Abril y Mayo.
175. *Plantago* / albicans/W.
176. *Plantago alpina*/W.
177. *Plantago coronopifolia* / Entrena.
178. *Plantago* (Coronopifolia) foliis linearibus dentatis,/ scapo tereti. Pract. Bot. de Lin.pr. Palau t'. 1.º pag 699./ *Coronopus sylvestris hirsutior*. T. Inst. R. H. 128./ Quer Flora Española. t° 5.º pag 6./ *Herba stella*, seu cornu cervinum. Dod. pempt. 109./ *Coronopus*. Lag. in Diosc. 212. Casp. Bauhin./ comment. Matth. pag. 383 =vulgo: Estrellamar / Se cria en los caminos, y tierras arenosas de Cordoba: es perenne y florece en Abril y Mayo. [Otra etiqueta]: *Plantago coronopifolia*.
179. *Plantago Subulata* L./ Venta del Esptu Sto.
180. *Plantago* (Serraria) Foliis lanceolatis quinquener-/viis dentatoserratis, scapo tereti. Pract. Bot. de Lin./ por Palau. t°. 1°. pag. 699./ Esta especie se cria en abundancia en algunos/ sitios humedos de los campos de Cordoba, como en tie-rra de los Palacios de la Galiana á los lados del camino/ que atraviesa desde el arroyo del Moro á la Puente/Sansueña. =Es perenne florece en Mayo.

181. *Plantago* (*Psyllium*) caule ramoso herbaceo/ foliis subdentatis recurvatis, capitulis/ aphyllis. Pract. B. de Lin. pr. P. tº. 1º. 700./ *Psyllium majus erectum* T. Inst. /R. H. 128. Flora Española. tº. 6º. 143./*Psyllium*. Dod. pempt. 115/ Lag. 418 = C. B. in Matth. 753./ vulgo: Zargatona./ Esta planta es muy comun en/los caminos y margenes de las tierras/ de labor de los campos de Cordoba,/ particularmente hacia la Albayda/ es annua y florece en Abril y Mº. [Otra etiqueta]: *Plantago psilium* Lin.

182. *Plantago Loefflingii*. W.

183. *Plantago Bellardi*. W. Ambos son del Arrollo de las Piedras.

184. *Plantago coronopus*.

185. *Eleagnus Angustifolia*/vulgo - Cinamomo.

186. *Alchemilla Vulgaris* W.

187. *Polygamia*, *Monoecia*/*Parietaria* (*cretica*) foliis subovatis, involucris fructiferis quinque-/fidis compressis: laciniis lateribus majoribus. Pract. Bot. de/Lin. pr. Palau tº. 1º. pag. 762./Habita en Creta. Lin./Coji esta planta en el Jar-/din Botanico de Sevilla, año de/1793. donde me la dieron aquel/nombre generico, y especifico.

188. *Aphane/arvense*. [Otra etiqueta]: *Aphane*.

189. *Cuscuta* (*Europaea*) floribus sessilibus./Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 1º. pa. 777./ *Cuscuta major* T. Inst. R. Her./ 652. Flora Española tom. 5º. pag. 25/*Cuscuta*. C. B. comm. Matt. sup./ Diosc. 879. Laguna 491./Farm. *Cuscuta* ó *Epithymo*./ Esta parasitica planta se halla/ en Cordoba, en las inmediaciones de el/ arroyo Pedroches sobre las plantas que/ se crian entre los peñascos, y en otras/ partes: es annua y florece por Mayo./ Quando se halla sobre el tomillo se la da/ el nombre de *Epithymo*, y como cre-/ce sobre qualquier especie, recibe va-/riado este nombre, compuesto de la voz/ Griega `επι, qe. corresponde á la Latina/ *sub* que en nuestro Ydioma equibale/ á *en*, y del nombre de la planta qe./la sustenta, como *Epitimbra*, *Epise-/so*, *Epiteucurio*, *Epicisto*, *Epithapsia* &c./ por estar la del esqueleto asida á un-/ a Pimpinela se podria llamar *Epipote-/rio*; haunque mas bien se acomoda el/ *epi* con nombres de dos syllabas.

190. *Hypecoum* (*Procumbens*) siliquis arcuatis compressis articulatis. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 1º. pag. 779./ *Hypecoon latiore folio*. T. Inst. R. H. 230. Flora Española tº. 5º. pag. 242.= *Hypecoum*. Dod. pempt. 449./ *Cuminum* sylvestre II C. B. com. Mat. 556./ Esta planta se cria con abundancia en los campos de labor/

del circuito de Córdoba, particularmente en los del camino/ de Lope-garcia; es annua, florece en Marzo y Abril.

191. *Hipocoum procumbens*. Elchechico Abril/1812.

192. *Hipocoum pendulum*.

193. Acebo/*Ilex aquifolius*/Royo frio 17 Agto.

194. *Ilex Aquifolium* L.

195. *Potamogeton* (natans) foliis oblongo-ova/tis petiolatis nantibus. Pract. de Bot./ de Lin. pr. Palau tº. 1º. pag. 784./*Potamogeton rotundifolium*. Tourn./ Inst. R. Herv. 233. F. Esp. tº. 6º. pª. 133 / an *Potamogeton Dioscoridis*?/ Esta planta se halla en Cordoba./ en el Arroyo Pedroches, en el de Ra-/banales, y en las balsas del Guadal-/quivir, en el Arrollo de la Palomera/ y en otros sitios de Agua./ Crece sumergida en las aguas/ echando una raíz gruesa asida al fon-/do, y elevando sus tallos hasta la super-/ficie, (por muy hondo que este) donde na-/dan sus ojas sostenidas de largos pezo-/nes. Sus espigas salen fuera del agua/ á florecer, en los Meses de Junio y Julio.

196. *Potamogeton Lucens*. Lin.

197. *Potamogeton crispum* (Lin). [Otra etiqueta]: *Potamogeton* (*crispum*) foliis lanceola-/tis alternis oppositisve undulatis serra-/tis. Pract. Bot. de L. pr. Palau tº. 1º. 786./*Potamogeton foliis crispis, sive Lac-/tuca ranarum*. Tourn. Inst. Rei Herv./ 233. Flora Española tom. 6º. pag. 133./ Esta planta havita sumergida/ en las aguas de varias partes de/ España: en la Alcarria, en la se-/rrania de Cuenca. &c. Quer, y en/ Andalucia./ Traje este esqueleto de Sevilla/ año de 1793. me lo dio Guzman.

198. *Sagina procumbens* L. y W./ *Sagina procumbens*/ La dificultad consistía en que nosotros suponiamos que solo poseía 3 estilos, pero observando muchas flores me cerciore de que tenía 4 y caxa de/ 4 ventallas, pª. observar bien esto conviene ver los/ frutos algo pasados y mucha paciencia.

#### Clase IV.

199. Pentandria Monogynia. *Heliotropium* (indicum) foliis cordatooba-/tis acutis scabriusculis, spicis solitariis, fruc-/tibus bifidis. Lin. Sp. P. pr. pu. tº. 2º. pª. 40./ Habita en una y otra India. Lin./ es annual y florece por Julio y Agosto. Crece/ á la altura de dos pies: yo la he cultivado en/ Cordoba á donde vino la semilla de Sevilla/ remitida por Dn. Pedro Abat, despues mi corres-/pondiente.

200. *Heliotropum indicum*/ Lin/ C in R. H. M.

201. *Heliotropum* (Europaeum) foliis ovatis/ integerrimis tomentos rugosis, spicis con/ yugatis. Lin. Sp. Plant. pr. pu. t°. 2°. p<sup>a</sup>. 41./ *Heliotropium majus*, Dioscoridis. Tourn./ Inst. R. Herv. 139. F. E. t°. 5°. 211./ *Heliotropium*. Dod pempt. 70./ *Heliotropium majus*. Lag. in Diosc. 499./ vulgo: Verrucaria / Esta planta se cria con mucha abundan-/cia en Cordoba: en el campo de la Merced, en/ el Marrubial, y demas inmediaciones de/ la ciudad. Es annua, y florece en el Ve-/rano. La usan fresca machacada, y aplicada/ sobre las verrugas para consumirlas.

202. *Heliotropium Europeum*.

203. *Heliotropium Parviflorum*/ Lin./ Cojido en Buenos aires.

204. *Heliotropium* (supinum) foliis ovatis/ integerrimis tomentos plicatis, spicis so-/litariis. Pract. Bot. de L. pr. P. t°. 2°. 42./ *Heliotropium minus*, supinum. T./ I. R. Herv. 139. Flora Esp. t°. 5°. 211./ Dodor. pempt. 70 / Esta planta se cria cerca de/ Cordoba en sitios humedos y arenosos/ en frente de los Pelambres del lado/ de halla del Rio. La he visto con mu-/chisima abundancia desde Cordoba á/ Almodovar. Crece echada sobre la tie-/rra, es annua y florece en Julio y/ Agosto.

205. *Heliotropium Supinum*/ Lin.

206. *Heliotropium* (Curasavicum) foli-/is lanceolato-linearibus glabris/ aveniis, spicis conjugatis. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau t°. 2°. pag. 42./ Habita en lugares maritimos de/ la America mas caliente. Pal./ Esta planta americana la/ hé cultivado en Cordoba, es annua,/ florece en el estio: toda la planta/ quando viba es de color garzo; bol-/viendose denegrada en la desecaci-/on, lo que sucede ordinariamente. á las/ mas especies de este genero.

207. *Miosotis scorpioides*.

208. *Myosotis versicolor*.

209. *Lithospermum*/ officinale/ Orilla del rio Carrizal/ al pie de un cerrillo/ en cuya cumbre hai ves-/tigios de una atalaya/ lo cogi en la primavera de/ 1812. Muñoz.

210. *Lithospermum* (Arvense) seminibus/ rugosis, corollis vix calycem superan-/tibus. Pract. B. de Lin. pr. P. t°. 2°. 49./ *Buglossum arvense*, annuum,/ *Litospermi folio*. T. I. R. H. 134. / Flora Española tom. 3°. pag. 312. / *Lithospermum arvense*, radice / rubra. C. B. com. Mat. sup. Diosc. 658. / Nace esta planta en los alrre-/dedores de

Cordoba entre los sembra- / dos del Marrubial, los Palacios de la / Galiána, y otros sitios. / Es annua, y florece por los / meses de Mar- / zo y Abril.

211. *Lithospermum Arvense*. Cav.
212. *Lythospermum/ fruticosum/W.*
213. *Lithospermum / Dispermum/W.*
214. *Lythospermum/ tenuiflorum/W.*
215. *Lithospermum/ apulum?/ W.*
216. *Anchusa officinalis*. L.
217. *Anchusa* (Officinalis) foliis lanceolatis, spicis im-/bricatis secundis. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 2º. 55./ *Buglossum angustifolium majus*, flore al-/bo vel coeruleo. T Inst. R. H. 134. Flora Espª. tº. 3º. 310./ *Buglossum vulgare*. Lag. 456. C. B. comment./ Matth. sup. Diosc. 825.=vulgo: *Lenguazos*. / Esta planta se cria en los campos de labor del / circuito de Cordoba: su raiz es perenne, fe. en Abril.
218. *Anchusa/ angustifolia/ W.*
219. *Anchusa/ undulata*
220. *Anchusa/ tinctoria*.
221. *Cinoglossum /choeirifolium/ W.*
222. *Cynoglossum cheiranti-/ folium. L./ Cabrera.*
223. *Cynoglosa lusitanica*.
224. 12. *Cinogl. linif. H.*
225. *Cynoglossum* (Linifolium) foliis line-/ ari-lanceolatis glabris. Pract. Bot. de/ Lin por Palau tº. 2º. pag. 63./ *Omphalodes Lusitanica*, Linifo-/ lio. T. I. R. H. 140. Flora Esp. tº. 6º. 13./ Esta planta se halla en varios / sitios de los campos de Cordoba, como/en tierra de las canteras y camino/ de la Palomera; pero donde abunda / mas y crece con mayor lozania es/ en todos los llanos qe median entre/ la Alameda y el Molino de Casillas./ Es annua y florece en Abril y Mº. Los colme/ neros la conocen con el nombre de *Nevadilla*
226. 14. C./ *Cinoglossum?/ Helianthemum/ guttatum.*
227. *Cynoglosa alisada*.
228. *Cynoglossum myosotoides?/ W.*
229. *Cynoglossum/ cristatum/ W./ varietas?*
230. *Pulmonaria* (angustifolia) foliis ra-/ dicalibus lanceolatis. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau tº. 2º. pag. 65./ *Pulmonaria alpina angusto/ folio, Italica*. T. Inst. R. H. 136./ no la trae Quer en su Flª.

Esp<sup>a</sup>./ Esta planta se cria en los alrededores de Cordoba, en los alrededores de las hazas, como en las de mas aya de la Huerta nueva/ camino de la piedra de la buena/ vista, y junto á la Huerta bayá/dares cam<sup>o</sup>. de la Al<sup>a</sup>. fle. en Abl. 21.

231. Pulmonaria subfruticosa.

232. Simfitum officinale Lin.

233. *Symphytum* (Officinale) foliis ovato-lanceolatis/ decurrentibus. Pract. Bot. de L. pr. Palau t<sup>o</sup>. 2<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>. 69./ *Symphytum* consolida major. T. Inst. R. H./ 138. Quer Flora Española t<sup>o</sup>. 6<sup>o</sup>. pag. 344./ *Symphytum* alterum. Lag. 382./ Esta planta se cria en varias partes de España/ y se cultiva en Cordoba: es pe. y fe. en Abl. y M<sup>o</sup>

234. Class quinta Pentandria Ordo/Monoginia./ *Symphitum tuberosum*/ Linn. pr. Palau tom. 2<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>./ 69 *Symphitum tuberosum*/ Se cultiva en Cordova pr./ algunos curiosos y entre otros en/ el Hospital de Jesus de donde/ cogi este esqueleto; es perenne y florece pr. Mzo. y Abl.

235. *Symphitum* (tuberosum) foliis semidecurrentibus; summis oppositis./ Pract. Bot. de Lin. pr. P. tom. 2<sup>o</sup>. 69./ *Symphitum majus*, tuberosa/ radice. T. Inst. R. H. 138. Flora / Española tom. 6<sup>o</sup>. pag. 345./ *Symphitum tuberosum*. Dod./ pempt. 134./ *Symphitum majus tuberosa*/ radice. C. B. com. Mat. sup. D. 683./ Se cria en las montañas de/ Santandér, y otras muchas partes/ de España. Se cultiva en Cordoba en la Alameda, en el Hospital de Jesus Nazareno y en el/ del cardenal, y tambien yo la/ he cultivado. Su raiz es perenne/, y florece por Abril y Mayo.

236. *Symphitum tauricum*/ Willd. Enum Hort Berolin/ C in R.H.M.

237. *Cerithe* (major) foliis amplexicalibus, corollis obtusiusculis/ patulis. P. B. de L. pr. Palau t<sup>o</sup>. 2<sup>o</sup>. 71./ *Cerithe quorundam* major./ versicolor. T. Inst. R. H. 80. Flora Española t<sup>o</sup>. 4<sup>o</sup>. pag. 143./ Esta planta se cria en muchas partes del circuito de Cordoba, tanto en tierras de labor como en terrenos incultos: como en los olivares de la Galiana, en los Olivares del Obispo junto á la Alameda &c. es annua y florece/ en los meses de Primavera.

238. *Cerithe* major.

239. *Cerithe* Mayor L./ Entrena.

240. *Cerithe*/ aspera/ En las riveras del/ Guadalimar junto/ ó frente de Veaz.

241. *Erica species*/ *Onosma*/ *simplicissima*/ W./ Fuen-cAliente.
242. *Onosma*/ *simplicissima*.
243. *Onosma echioides*.
244. *Pulmonaria angustifolia*/W.
245. *Echium*/ *italicum*.
246. *Echium italicum*/ W.
247. *Aretia Vitaliana*/ W.
248. *Primula* (*veris*) *varietas*. /*Primula* (*elatior*) *Limbus corol-*  
*larum planus*. Lin. Sp. P. pr. pu.. t°. 2°. 108./ *Primulaveris* *pallido*  
*flore*, *elati*-/or. T. I. R. H. 124. F. E. t°. 6°. 136./ *Primula Veris* *altera*.  
 C. B. Com./ Matthiol. super. Diosc. 802./ Esta Planta vegeta en  
 nuestra Pe-/ninsula: en los Pirineos, montes de Avila/ en Castilla  
 la Vieja &c. Quer. Se cul-/tiva en Cordoba en el Jardin del Obis-/po.  
 Es perenne, y florece en Marzo y / Abril, no grana semilla y se  
 propaga de/planta, en Cordoba. Se advierte en es-/ta *Primula* un  
 caracter bastante no-/ [reverso]: table, y es que al mismo tiempo  
 que levantan /sus escapos con las umbelas, arroja de la ra-/iz otras  
 flores sencillas, sostenidas de largos/ pedunculos: lo que no he  
 visto notado en nin-/guna descripcion; ni he advertido gravado en/  
 ninguna figura de quantas de *Primulas*/ he visto en diversos Auto-  
 res. Por lo que es-/toi dudoso en que esta sea la variedad pres-/  
 cripta, y me da lugar a sospechar sea esta/ otra variedad de la  
 misma especie, ó va-/riedad, de variedad tal vez, ó acaso sien-/do  
 este caracter constante podria constitu/ir especie distinta; lo que  
 no se puede de-/terminar si haver visto antes todas las/especies y  
 variedades de este Genero.
249. Creo ser la misma/ qe. se cultiva en los Jardines/ Canalia  
 812./*Primula veris*/ Esta es sin cultivo.
250. *Primula veris*. W.
251. *Lysimachia*/ *Linum stellatum*/Palau. tom. 2 pag. 130/ Esta  
 especie tiene la capsula/ de 5 ventallas / [Reverso]: Se cria con  
 abundancia en / el río de los Molinos de Siles/ bajo la peña del  
 olivar en toda / la madre de dicho Rio florece por / Mayo. La de-  
 terminó Entrenas.
252. *Anagallis Arvensis* L./ *morulli*./ Entrena.
253. *Anagallis Arvensis minima*./*morelli*.
254. *Anagallis*/ *Linifolia*/Cabrera.
255. *Anagallis*.

256. *Plumbago* (Europae) foliis amplexi-/ caulibus lanceolatis scabris. Pract/Bot. de Lin. pr. Palau t<sup>o</sup>. 2<sup>o</sup>. pag. 146./ *Plumbago quorumdam*. T. Inst./ R. H. 141. Fl. Esp.<sup>a</sup>. t<sup>o</sup>. 5<sup>o</sup>. pag. 112./ Esta planta la he visto en mu-/ cha abundancia en las cercanias / de Carmona, y en todo el camino de/ alli á Sevilla donde la coxi: se cul-/ tiva en algunas partes de Cordoba./ Su raiz es perenne, crece de pie y/ medio á dos, y florece en el Estio.

257. *Convolvulus* (sepium) foliis sagittatis/ postice truncatis, pedunculis tetragonis u-/ nifloris. Lin. Sp. P. pr. pu. t<sup>o</sup>. 2<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>. 155./ *Convolvulus major albus*. Tourn. Inst./ Rei Herb. 82. Flor. Españ. t<sup>o</sup>. 4<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>. 402./ *Smilax laevis*. Lag. in Diosc. 463./ *Smilax laevis, major*. Dod. pemp. 392./ *Smilax laevis*. C. B. comment. Ma-/ ttiol super Diosc. 839/ Esta planta se cria cerca de Cordo-/ ba en el Arroyo del Moro, y en otros si-/ tios de esta naturaleza: crece del largo/ de siete ú ocho pies enredada entre los ar-/ busculos: su raiz es perenne, y flore-/ ce en los Meses de Julio y Agosto.

258. *Convolvulus Sepium*.

259. Class. V Pentandria Ord. Monoginia/ *Convolvulus Purpureus*/ Lin. Tom. 2<sup>o</sup>. pag.<sup>a</sup> 159/ *Convolvulo Purpureo*/ (Vulgo) Marabillas.

260. *Convolvulus althæoides*.

261. *Convolvulus* (althæoidies) foliis cordatis sinuatis seri-/ ceis: lobis repandis, pedunculis bifloris. Pract. Bot. de Lin./ por Palau t<sup>o</sup>. 2<sup>o</sup>. pag. 167./ *Convolvulus peregrinus, pulcher, folio Betonicae* T./ Inst. R. H. 85. Flora Española t<sup>o</sup>. 4<sup>o</sup>. pag. 405./ Esta especie se halla mui frecuente en los paredones/ y laderas de los campos del circuito de Cordoba: su raiz es/perenne, sus tallos crecen á dos pies enroscados, ó postrados.

262. *Convolvulo de 5 lacinias*.

263. *Convolvulus lineatus*.

264. *Convolvulus Wheleri*/W.

265. *Convolvulo*/ rayado.

266. *Convolvulus/ capitatus*/ Cab. 237/ V. 3 de Julio.

267. *Ypomea quamoclit*.

268. *Campanula Patula*/ó / C.-Carece de ojas, y no/ se puede determinar la especie/ Entrena.

269. ¿*Campanula Patula*? / C./ Entrena. [Otra etiqueta]: *Campanula*/ Vngr.

270. *Campanula Patula* Cavs.  
 271. *Campanula/tenera* — *tiernecita*.  
 272. *Campanula* ó *Prismato/carpus porosa*.  
 273. *Campanula hybrida* [tachado *hybrida*]/ *prismato-/carpus/* Webb.  
 274. *Campanula Speculum/L.* /C in R H.M.  
 275. *Campanula speculum* [tachado *speculum*] /*hybrida* W.  
 276. *Campanula /hibrida*.  
 277. *Campanula Erinus*.  
 278. *Campanula Hispidula / rapunculus*.  
 279. *Campanula /erinoides/W*.  
 280. *Campanula/ mollis an Saxatilis?* [tachado]/ *erinoides* W  
 281. *Campanula/ Viznagar 3 de Julio/No se ve bien la/fig<sup>a</sup> de las ojas*.  
 282. *Plumbago?/ Pentandria/ Estigma partido en 3/ 5 escamas cubren al germen/ Campanula/ Arroyofrio 17 Ag.to*.  
 283. *Campanula/ Vzgr. 20 Julio*.  
 284. *Campanula /velutina*.  
 285. *Campanula/microphila?*  
 286. *Campanula microphila? /de Cábanilles/ Amo 11 Jul*.  
 287. *Campanula /species nova?/Prismatocarpus species*.  
 288. *Campanula/ saxatilis* W.  
 289. *Trachelium Coeruleum/vulgo — Hermosilla*.  
 290. *Samolus (Valerandi)*. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau. t<sup>o</sup>. 2<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>. 234./ *Samolus valerandi*. T. Inst / R. H. 143. F. E. t<sup>o</sup>. 6<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>. 249 / Esta yerba se cria con abundancia en Cordoba en las margenes de Guadalquivir, y en el Arroyo de Pedroches, y otros sitios bañados de Agua limpia. Es perenne y florece en Julio y Agosto./ La dan el nombre de Yerba de la Erisipela, por el uso que se hace de ella en esta enfermedad, aplicandola machacada, y curandola.  
 291. *Lonicera caprifolium*.  
 292. Class, quinta *Pentandria Ordo/ Monoginia/ Lonicera caprifolium/Linneo pr. Palau t<sup>o</sup>. 2<sup>o</sup>./pag<sup>a</sup>. 255 = Lonicera/ caprifolio (vulgo) Madre-selva. Se cria abundantemente. en la sierra de Cordova y esparce al el tpo de estar florida un suave y agradable olor a larga distancia pr/ lo que se seria apreciable en los jardines =/ virtudes/ Sus ojas son vulnerarias y detersibas y/el agua destilada de / sus flores quita la inflamacion de los ojos/ ved a/Linn.pr./ Pal. t<sup>o</sup>. y/p.citada.*

293. *Lonicera periclymeno*.
294. *Lonicera Periclymenum*.
295. *Mirabilis* (Jalapa) floribus congestis terminalibus erectis. L. d. P. pr. pu. tº. 2º. pª. 274./ *Jalapa* flore purpureo. Tourn./ Inst. R. H. 129. Fl. Esp. tº. 5º. pª. 257./ *Solanum Mexicanum*, flore magno. C. B. P. 168 / *Admirabilis* perviana, flore varii coloris albo rubicunda. (Et altera species)/ Swent. Florileg. lib. 2º. fol. 24 / vulgo Don Diegos ó Juanes de noche y, en/ Cordoba Don Pedros./ Esta planta havita en una y otra/ India: se cultiva en toda España: en Cordoba en todas partes, por la variedad y hermosura del color de sus flores, varia tambien de magnitud pues la hai enana./ Crece a la altura de tres pies muy ramosa/ su raiz es perenne: florece en el verano.
296. *Coris monspeliensis* W.
297. *Verbascum thapsus* W.
298. *Verbascum phoeniceum*/ 29 de Mayo a la subida/ de S. Estevan junto al Conv.to/ de S. Francisco, y vi otras/ dos plantas á la salida/ de Andujar por la trocha, y no he visto otras/ es planta muy bonita.
299. *Verbascum blattaria*/ Mi amado y querido Jose no/ puedes tener una ydea de lo que/ me an conplasido tus dos cartas/ y saber te allas bien disfrutando de una completa salud esto... [Reverso]: ente que pueda causarte la menor incomodidad fueras a Madrid y tu bieras el gusto de ver a/ tus amigos y despues te binieras con el generar esto no quita para que tu con mas conosimiento agas lo que mejor te acomodes pero tu benida no quiero/...
300. *Datura* (*Stramonium*) pericarpium spinosis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. Pract. B. de L. pr. P. tº. 2º./ 288./ *Stramonium* fructu spinoso, oblongo, flore albo. T. Inst. R. Herv./ 119. Flora Esp. tº. 6º. pª. 336./ *Solanum foetidum* spinosum./ c. B. com. Mat. in Diosc. 228./ Esta planta dicen ser originaria/ de America; pero se halla connaturalizada en nuestra Peninsula: en/ Cordoba se cria con abundancia en/ las orillas del Rio, particularmente/ desde el arenal hasta el Molino de/ Martos. Crece de quatro pies de alto:/ es annua, y florece en los meses de/ Julio y Agosto.
301. *Datura* (*Metel*) pericarpium spinosis nutantibus globosis, foliis cordatis subintegris pubescentibus./ Pract. Bot. de Lin. pr. Pal. tº. 2º. 290./ *Stramonium* fructu spinoso./ rotundo, flore albo simplici. T. Inst./ R. H. 118. Flora Española tº. 6º. 337 / *Stramonium*. Lag.

421./ Esta especie he visto cultivada/ en el Jardin Botanico de Sevilla/ donde coji este esqueleto: despues la/ he obserbado en Cordoba en la/ orilla del Rio al lado de alla de la/ ciudad, mas arriba de la Zua; lo que estrañe. en el año de 1793.

302. *Datura Arborea* Cav.s./ En cambio de la *Catalpa/ ternifo-  
lia* Cavs. qe. creo es la/ qe. me remitió.

303. Class. V Pentandria Ord. Monoginia/ *Hiosciamus Albus/* Linn. Tom. 2º. pag. 293/ *Hiosciamo* blanco (vulgo) Beleño blanco.

304. *Hyoscyamus Physaloides/* Linn./ C in R H M.

305. Class. V Pentandria Ord Monoginia/ *Nicotiana Tabacum/* Linn. Tom. 2º. pag. 298 *Nicociana/* Tabaco (vulgo) Tabaco/ Havi-  
taba solo en America hasta qe. Nico-/cio la introdujo en Europa

306. *Nocotiana.* (Rustica) foliis petiolatis ova-/tis integerrimis, floribus obtusis. Lin./ Sp. Plant. pr. pu. tom 2º. pag. 299./ *Nicotiana minor.* T. J. R. H. 117./ *Hyoscyamus tertius* C. B. comm./ Matth. su-  
per. Diosc. 750./ vulgo: Tabaco fino ó tabaco pequeño./ Esta planta es originaria de la Ame-/rica como todas las dems especies de este/ Genero; y esta mui estendida en Cordoba [tachado Cordoba]/ Euro-  
pa: en Cordoba se halla en muchas casas/ donde la conocen por aquel nombre vulgar./ Es annua, crece de dos pies de alto, y flore-/  
ce en los Meses de Julio y Agosto.

307. *Atropa* (Belladonna) caule herbaceo,/ foliis ovatis integris. L. S. P. pr. pu. tº. 2º. 302./ *Belladonna* majoribus foliis, et/ floribus. T. I. R. H. 77. F. E. tº. 3º./ 203.º *Solanum* lethale. Dod. pempt. 456/ *Solanum* sommiferum. Swert flo-/rileg. lib. 2.º fol 20./ *Solanum* ma-  
jus sive herva Bel-/ladonna C. B. comm. Mat. sup. Diosc. 756 / Es-  
ta planta se cria en España en te-/rrenos incultos, desiertos, y som-  
brios: en el/ monte de ntra. Sra. de Monserrate: & c./ Quer. La he  
cultivado en Cordoba y he/ remitido semilla de ella al Jardin Bo-/ta-  
nico de Sevilla. Es perenne, crece de/ quatro pies de alto, y florece  
por Junio./ Es narcotica y venenosa: sus frutos comi-/dos matan, y  
se socorre este peligro con/ los acidos vegetales, como el de Li-  
mon & c.

308. *Nicandra physaloides*, W./ *Atropa physaloides* (Lin).

309. *Atropa Physalodes.*

310. *Physalis...?*: Entrena.

311. *Solanum/? Physalis* somnifera L?/ no hai fruto pr. lo qe-  
dudo/ Entrena.

312. *Physalis* (somnifera) caule fruticoso, / ramis rectis, floribus confertis. Lin. Sp. / Plant. pr. pu. t<sup>o</sup>. 2<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>. 306. / Alkekengi fructu parvo, verticilato / Tour Inst. R. H. 151. Fl. Esp. t<sup>o</sup>. 2<sup>o</sup>. 244. / *Solanum somniferum*. Dod. pempt. 455. / En Cordoba Orabale. / Se cria en Andalucia, y señaladamen-te en Malaga. Se cultiba en Cordoba en / muchas casas, donde hacen mucho uso de / las hojas para las ulceras de las piernas. / Crece á la altura de tres ó quatro pies, y / es perenne, florece en el Verano.

313. *Physalis* (Alkekengi) foliis geminis inte-/gris acutis, caule herbaceo inferne ramoso. / Lin. Sp. Plant pr. pu. t<sup>o</sup>. 2<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>. 310. / Alkekengi officinarum. Tourn. Inst. R. / Herb. 151. Flora Española t<sup>o</sup>. 2<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>. 222. / *Solanum vesicarium* Dod. pempt. 454 / *Solanum Halicacabum*. Lag. in Diosc. 419. / C. B. com. Matth. sup. Diosc. 754. Swert. Florileg. lb. 2<sup>o</sup>. fol. 20 / vulgo: Vegiga de Perro. / Se cria en España en las viñas, y cercas som-/brias, particularmente en las de Castilla la Vieja / y en el Real sitio de Aranjuez. & c. Quer. / Se cultiba en Cordoba; donde la he cultivado y he propagado. Produce los tallos de dos pies de largo, / y debiles, su raiz es perenne, y rastrera, florece por Ma-/yo y Junio. Su fruto tiene uso en la Medicina.

314. *Physalis* Angulata Lin. / C in R H M.

315. *Physalis* tuberosa Cav. / C in R H M.

316. *Solanum* (diphylum) caule inermi fruticoso, foliis geminis, altero minore, flo-/ribus cymosis. Lin. S P. pr. pu. t<sup>o</sup>. 2<sup>o</sup>. 315 / An: Rubrum? / Esta Planta fue traída á Cordoba / el Año de 1790 remitida por D. Pedro / gutierrez Troncoso Boticario en el Pu-/erto de Sta. Maria, con el nombre de / hierva de la abundancia. / Produce el tallo angular y ahorquillado, / perece en el invierno ó a lo menos padece / mucho en el, segun la graduación del frio. / Florece por Septiembre y Octubre / crece á la altura de tres pies.

317 Class V Pentandria. Ord Monoginia / *Solanum Dulcamara* / Linn. Tom. 2<sup>o</sup>. Pag<sup>a</sup> 315 / Solano dulce-amargo.

318. *Solanum dulcamara* / varietas  $\beta$ .

319. *Solanum* (Dulcamara) caule inermi fru-/tescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, / racemis cymosis. L. Sp. P. pr. pu. t<sup>o</sup>. 2<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>. 315. / *Solanum scandens*, seu *Dulcamara*. T. / Inst. R. H. 149. F. E. tomo 6.º p.º 316. / *Dulcamara*. Dodon pempt. 402. / en Cordoba: vulgo Yerva de la cuchillada. / Esta Planta se halla en las cercanias / de Cordoba en sitios umedos: en la desembocadu-/ra del Arroyo Rabanales al Rio, Soto de quema- / dillas & c y en la Ciudad la tienen eu

mu-/ chas casas, donde hacen uso de ella en las/ heridas por lo que le dan aquel nombre./ Sus tallos crecen echados del largo de / diez ó doze pies: es perenne y florece en / Mayo y Junio.

320. Class. V. Pentandria Ord Monogina/ Solanum Licopersicum/ Linn Tom. 2º., pag.ª 319 / Solano Licopersico (vulgo) Tomates.

321. Solanum Nigrum/ Entrena.

322. *Solanum* (Sodomeum) caule aculeato fruticoso/ tereti, foliis pinnatifido-sinuatis sparse acu-/ leatis nudis, calycibus aculeatis. L. S. P. pr. pu./ tomo 2º. p.ª 329 // Habita en Africa. Linneo./ Este Solano se cultiva en los Jardines/ Botánicos de España; fue venida su semi-/ lla á Cordoba el Año de 1792 enviada / por don Pedro Abat, Catedrático de Bota-/ nica del Jardin de Sevilla./ Crece a la altura de tres ó quatro/ pies: es perenne, y florece en los Meses/ de Abril Mayo, y Junio: sus frutos son/ del tamaño de Nueces, y estan maduros en / el Ynvierno

323. Solanum Cornutum/ Lamark/ C in R H M.

324. Lycium (Barbarum) foliis lance-/ olatis, calycibus subbifidis. Pract./Bot. de Lin. pr. Palau tº. 2º. p.ª 345./ Habita en Africa y Europa. Pal./ Esta especie de Lycio es un Ar-/ busto endeble que crece de tres / á quatro pies poco mas ó menos/ mui poblado de ramas: es peren/ ne y florece en el estio./ Hallelo cultivado en el Jar-/ din Botanico de Sevilla, en/ donde coji este esqueleto, año/ de 1793.

325. Lycium (Europaeum) foliis obli-/ quis. ramis flexuosis tere- tibus./ Practica Bot. de Lin. pr. P. tº. 2º. 346./ vulgo Cambronera./ Este Arbusto se halla en las / inmediaciones de Cordoba formando/ ballados, por la espesura de sus ra-/ mas armadas de agijones. Crece de/ cinco á seis pies de alto, es peren/ ne, y florece en Agosto y Sep- ti-/ embre.

326. Chironia Spicata (Wildenow).

327. Chironia Spicata W./ Entrena.

328. Chironia Centaurium (Wild).

329. 32. H/ Ramus infectorius ¿/graine d'avignon.

330. ¿Rhamus Frangula?/W.

331. *Rhamnus* (Alaternus) inermis, floribus dioicis, stigma-/ te triplici, foliis serratis. Pract. B. de Lin pr. Pal. tº. 2º. p.ª 385./ *Alaternus*. I. (et. II) Clus. histor. 56. T. Inst. R./ H. 595. Flora Española tº. 2º. pag. 200. *non videatur ejus figª*./ Este arbusto se cria en Cordo- ba en varias partes de / su Sierra, y le tengo observado, en los Va-

llados de los Palacios/ de la Galiana el sexo femenino en distinto pie que el masculino. Crece á la altura de un hombre ó algo mas, es perenne y florece en los meses de Febrero y Marzo.

332. *Rhmanus alaternus* W./ seu *Philica elatior* Bauh./ 20 de Marzo.

333. *Romnus Alaternus*/ Cabrera.

334. *Ramno* espina de / Christo / de 5 ojuelas.

335. *Rhanus Zizifus* / Vulgo-Azofaifo.

336. *Rhamnus Hispanicus*, folio Buxi,/minor. T. 593. Q. tº. 6º. pag. 199./ vulgo: Tamujos. Cordubae.

337. *Rhamus*/ licioides.

338. *Ribes rubrum*/ Grosellero/ Caban. p. 380/ Jaen Hacienda del Doctoral.

339. *Lagoecia cuminoides*.

340. *Celosia (coccinea) foliis ovatis stric-/tis inauriculatis*, caule sulcato, spicis/ multiplicibus cristatis. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau tº. 2º. pª. 461./ *Amaranthus panicula incurva*./ T. I. R. H. 235. F. E. tº. 2º. pª. 283./ *Amaranthus holosericus sanguineus reticulatis floribus*. Swent. Flo-/rileg. lib. 2º. fol. 21 / en Cordoba: vulgo Borlas./ Habita en la India. Lin / Se cultiva en España: en Cordoba / en todos los Jardines, y casas particulares, / por su color, y varia disposición de sus cres /tas, las he visto formando una perfecta esfera de seis Pulgadas de diame-/ (reverso): tro. Crece á la altura de tres ó quatro / pies, es annua, y florece en lo Meses/ de Agosto, y Septiembre.

341. *illecebrum*...

342. *Illecebrum cymosum* /W.

343. *Illecebrum (Paronychia) floribus bracteis nitidis obvallatis*, caulibus procumbentibus, foliis laevibus. Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau tomo 2º. pag. 467./ *Paronychia Hispanica*. T. I. R. H. 507. Quer/ Flora Española tº. 6º. pag. 63.=vulgo: *Sanguinaria* / Esta se cria en el circuito de Cordoba, en terrenos guijarrosos, y en los caminos, como en toda la cu-/ esta de la Asomadilla. &c. su raiz es pñe. florece en Mº.

344. *Illecebrum capitatum*/ Siles de Segura 812.

345. *Illecebrum*/ polygonoides/W.

346. *illecebrum*/ alsinefolio/W.

347. *Illecebrum Cimosum*/ Cabrera.

348. Esta planta qe. Vmd me dio p<sup>a</sup>. deter-/minarla y qe. sospechaba Vmd se un / Plumbago, es el / thesium Linophylum. L /varietas  $\alpha$  mui bien./ Clase 5<sup>a</sup>. Ordn. 1<sup>o</sup>. flors. incompletas.

349. Vinca major/Vinca (minor) caulibus procum-/bentibus, foliis lanceolato-ovatis, / floribus pedunculatis. Pract. Bot. / de Lin. pr. Pal-su tom. 2<sup>o</sup>. pag. 492 /Pervinca vulgaris, angustifo-/lia, flore coeruleo. T. Inst. R. H. / 120. Flora Esp. tom. 6<sup>o</sup>. pag. 82./ Clematis prima. C. B. com / Matthiol. sup. Diosc. 679. / Clematis Daphnoides. Dodon / pempt. 405./ Clematis. Lag. 380. [Reverso]: Farm. Vincapervinca./ vulgo: Yerva Doncella./ Esta planta se cria en Cordo-ba en el arroyo de las peñas detras/ de la Huerta del Naranjo, en el de/ Pedroches detras del Molino del pa-pel con mucha abundancia, y en/ todos los arroyos, Huertas y sitios/ humedos de la sierra. Produce los/ tallos mui largos, tendidos por tier-ra, es pe. y florece pr. Abril, y sigue.

350. Ceratonia Siliqua.

351. Atriplex Laciniata L./Entrena.

352. Asclepias nigra/ Vzgr. [Otra etiqueta]: Sí es lo qe. creo pr. la oja/ Lo tengo Deter/minado por/ Apocynum Venetum/ y lo veremos fresco./ Entrena.

353. Asclepias Syriaca [tachado] Syriaca)/ fructicosa.

354. Class. V Pentandria Ord. Diginia/ Stapelia Variegata/Linn. Tom. 2<sup>o</sup>. pag. 568/ Estapelia de varios colores. [Otra etiqueta]: Sta-pelia Variegata./ Foliculos.

355. Chenopodium urbicum.

356. Chenopodium rubrum.

357. Chenopodium Murale (Lin).

358. Chenopodium hybridum.

359. Chenopodium urbicum Lin/ó/Chenopodium híbridum Lin/ Son muy parecidas algunas /especies de este genero de/ modo qe. tal vez seran solo/ variedades.

360. Chenopodium Hybridum L./ Entrena.

361. *Chenopodium* (Botrys) foliis oblongis sinuatis, race-/mis nudis multifidis, Pract. B. de L. pr. Pal. t<sup>o</sup>. 2<sup>o</sup>. pag. 580./*Chenopodium* Ambrosioides, folio sinuato. T. Inst./ R. H. 509. Flora Española t<sup>o</sup>. 4<sup>o</sup>. pag. 223./ *Botrys*. Lag 346. C. B. com. Mat. 620. Dod. pem. 34./ Esta planta es comun en el circuito de Madrid y otras/ partes de España. Qer. La he cultivado en Cordoba/ algunos años: es annua y florece en Julio y Agosto.

- 362. *Chenopodium*..?/ ambrosioides/botris W./ foliis lanceolatis/integris.
- 363. *Chenopodium*/ Ambrosioides./ the de España.
- 364. *Chenopodium Scoparia* L./ Entrena.
- 365. *Chenopodium albicans*/ vulgaria.
- 366. *Salsola* (*Tragum*) herbacea, erecta, foliis su-/bulatis spino-




Fig. 2.<sup>a</sup>—Autógrafo de Antonio Cabrera

sis laevibus, calycibus ovatis. Lin./Spec. Plant. pr. pu. tº. 2º. pa. 589  
*Kali spinosum*, foliis longioribus, et an-/gustioribus. T. I. R. H. 247.  
 F. E. tº. 5º. 289./ *Tragum*. Lag. in Dioc. 405. C. B. com-/ment. Mat-  
 tiol. super Diosc. 730./ Esta planta se cria con mucha abun-/dancia  
 en Cordoba, en las margenes de Gua-dalquivir, como en el arenal,

los pelambres, y en la Ysla de los Molinos por bajo del Puente. Es annua y florece en los Meses de Julio y Agosto.

367. *Salsola tragus* L.

368. *Gomphrena* (Globosa) caule erecto, foliis ovato-lanceolatis, capitulis solitariis, pedunculis diphilis. Lin. Sp. P. pr. pu. tº. 2º. 603. / *Amarantoides*, lychnidis folio, capitulis purpureis. T. I. R. H. 654. Flora / Española tom. 2º. 281. / vulgo: Siemprevivas encarnadas. / havita en la India. Lin. / Se cultiva esta Americana planta en los Jardines de España: en Córdoba esta muy extendida, y así la hai en todas partes. Varía con las cabezuelas blancas ó de color de Plata. Es annua, crece a la altura de pie y de medio, florece en los Meses de Julio, Agosto y Septiembre.

369. Almotesa ú olmo.

370. *Eringium*

371. *Eringium tricuspidatum* W.

372. *Eringium tricuspidatum* W.

373. *Eringium Maritimum* / Cabrera

374. *Eryngium* (Campestre) foliis radicalibus amplexicalibus pinnato-lanceolatis. Pract. Bot. de L / pr. Palau tº. 2º. pag. 641. *Eryngium vulgare*. T. I, R. H. 327. Fª. Eª V 82. / *Eringium*. Lag. 279. =montanum. C. B. com. 505. / Esta se cria en los campos del circuito de Córdoba, la llaman vulgarmente *cardo cuco* y corredor: su raiz es perenne, florece en los meses de Mayo y Junio.

375. *Eringium coeruleum* (tachado coeruleum) / *Ametistinum* / 55 H.

376. *Bupleurum* / *Rotundifolium*.

377. *Bupleurum* / *rotundifolium*.

378. *Bupleurum* (*rotundifolium*) *involucratum* Link. / *lucris universalibus nullis*, foliis perfoliatis P. B. de L. pr. P. tº. 2º. 654. / *Bupleurum perfoliatum*, *rotundifolium*, *annuum*. T. Inst. / R. H. 310. Flora Esp. tº. 3º. 332. / *Perfoliata*. C. B. com. Mat. / super Diosc. 805. Dod. pempt. 104. / Esta planta se cria entre los sembrados, de las inmediaciones de Córdoba, particularmente en los de hacia la Alameda. Es annua, y florece en Mayo y Junio.

379. *Bupleurum rotundifolium* / 25 H.

380. *Bupleurum* / *Odontites* / Cabrera. [Otra etiqueta]: *Bupleurum Semicompositum* / Entrena. [Otra etiqueta]. *Bupleurum*? / 33 / C.

381. *Bupleurum fruticosum*.

382. *Bupleurum* (Fruticosum) frutescens,/ foliis obovatis integerrimis. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau t<sup>o</sup>. 2<sup>o</sup>. pag 662./ *Bupleurum* arborescens, Salicis-/ folio T. Inst R. H. 310. Flora España-/la tom. 3<sup>o</sup>. pag. 334 / *Seseli* Aetiopicum ex frutex./ Dodon. pempt 312./ Esta especie se cria en el Reyno/ de Cordoba junto á Baena: la he/ visto cultivada en el Jardin Botanico/ de Sevilla donde coji este esqueleto / Es perenne, y crece á la altura de/ un hombre poco más ó menos, mui/ poblado de tallos

383. *Bupleurum*...? /frutescens / 23 L.

384. *Torilis antriscus*.

385. *Caucalis* Daucoides.

386. *Caucalis* (Daucoides) umbellis trifidis aphyllis, umbe-/ llulis trispermis triphyllis. P. B. de L. pr. Pal. tom. 2<sup>o</sup> pag. 675./ *Caucalis* Monspeliaca, echinato magno fructei. T. I./R. H. 323. Flora España-/la t.<sup>o</sup> 4<sup>o</sup> pag. 98. est.?) / Esta planta se cria en los campos de labor del circuito de/ Cordoba: es annua Haunque de aquellos caracteres especificos/ de *Jacquin* aplicados pr. Palau á esta especie se colige carecen/ de involucre universal; supone Lineo expresamente tenerlo/ quando la describe en su Sp. plant. 3. edic pag. 346. por/lo que me inclino á que la nuestra es la especie dicha, va-/riando en tener involucro universal y no tenerlo, como tambi-/en en el numero de las semillas, cullas variaciones parec2/ se observan en las mas de las especies de este Genero

387. *Caucalis latifolia*/Linn et Cabanilles.

388. *Caucalis* /latifolia /W

389. *Caucalis Arvensis*. W.

390. *Daucus visnagoides* Entrena./ D. seminibus levibus, umbella uni/ versali basi coalita, involucro/bi- triphylo petala integra./ Vulgo visnagorro.

391. *Daucus Visnaga* L.

392. Class. V Pentandria Ord. Diginia. / *Daucus Muricatus* / Linn. Tom. 2<sup>o</sup>. pag<sup>a</sup>. 684/ Dauco con puntas rigidas.

393. *Daucus muricatus*.

394. *Daucus Lucidus*. W./ Es parecido al D. Mauritanico/ y al D Carota. Se diferencia del 1<sup>o</sup>. / en no tener flosculo central este/ril y del 2<sup>o</sup>. en la oja y peciolo/ lampiños.

395. *Daucus Hispidus* Entrena./ D. seminibus radi umbellule tribus/ hispidis, centrali vero tuberculosa,/ involucro universalis pi-

nato, partiali/que ternati, caule hispido tenuifolio./ Corrija Vmd el Latin.

396. Ammi Majus. W.

397. Conium / Dicotomum/ Cabrera.

398 Selinum (Carvifolia) caule sulcato/ acutangulo, involucro universali eva-/nido, pistillis fructus reflexis. Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau tº. 2º. 695./ Se cria esta planta en España/ en la Alcarria, Asturias, y otras/ partes. Vease á Palau./ Me dio este esqueleto en Sevi-/lla Don Anastasio Guzman, con/ aquel nombre generico y especi-/fico año de 1793.

399 34.H/ Athamanta cervaria?

400. 2ª. H/ Athamanta Mathioli W.

401. *Crithmum* (Maritimum) foliolis/ lanceolatis carnosis. Pract. Bot. de L./ pr. Palau tº. 2º. pag. 706./ *Crithmum*, foeniculum maritimum, minus. T. Inst. R. H. 317. Flo-/ Española tom. 5º. pag. 14./ *Crithmum* marinum. Dodon./pemp. 705./ *Crithmum* I. Casp. Bauhin./ comment. Mat. sup. Diosc. 381. Lag. 212./ Se cria en las costas del Mar/ Mediterraneo y Oceano en España./ vide Quer. La halle cultivada en/ el Jardin Botanico de Sevilla don-/de coji este esqueleto. año de 1793.

402. ¿Cachrys Panascifolia. W.? /Estoi muy dudoso en el nombre de esta Planta, cuya semilla/ no está madura ni en estado/ de ver nada. Sube a la altura de/ un hombre y las ojas caulinas ternadas.

403. *Ferula tingitana* L./ Como las ojas radicales y del/ tallo se habian secado podra / haber variación en la especie.

404. *Heracleum sphondylium*/ 35/H.

405. *Sium nodiflorum*, L. / Orilla del Manzanares.

406. OEnante / Prolifera.

407. *Phellandrium Acuaticuma* L.

408. ¿*Phellandrium Mutellina*? / No he visto la oja radical / pero la semilla es de *Phellandrium*.

409. *Coriandrium* (testiculatum) fructibus didymis. Pract /Bot. de Lin. pr. Palau tº. 2º. pag. 759 / *Coriandrum* minus testiculatum. T. Inst. R. H. / 316. Quer Flora Española t. 4º. pag. 427./ *Coriandri* altera Ircon. Dod. pempt. 302./ Esta especie se halla en los campos de Cordoba en ti-/erras de labor: es annua florece en Abril y Mº.

410. Cilantro / de testiculos.

411. *Scandix odorata*/W. [Otro ejemplar y otra etiqueta]: *Scandix*/ *odorata*.

412. *Scandix Pectenvenensis*. L.

413. *Scandix* (*Pectenvenensis*) *seminibus rostro longissimo*. P./ Bot. de Lin. pr. Palau tº. 2º. pag. 761./ *Scandix semine rostrato*, vulgaris. T. Inst. R. H./ 326. Flora Española tº. 6º. pag. 262./ *Scandix*. Lag. 222. C. B. com. Matth./ *Scandix Pecten Veneris*. Dod. pemp. 701./ Es muy comun esta planta entre los sembrados del cir-/cuito de Cordoba: es annua y florece en Abril y Mº.

414. *Scandix Anthriscus*/W /*Choerophilum Anthriscus*/Ventenat.

415. *Scandix*/ *australis*.

416. *Imperatoria* (*Ostruthium*) Lin. Sp. Plant. /pr. pu. tº. 2º. pª. 773./ *Imperatoria major*. Tourn. Inst. R. H./ 317. Flora Española tº. 5º. 270./ *Astrantia*. Dodod. pemp. 320./ Farm. *Imperatoria*./ Se cria en los Montes Pirineos de Cataluña, / en el Moncayo de Aragon, y en otros muchos / de nuestra Peninsula Quer. Es perenne: y / florece por Junio y Julio. / La he cultivado, y se cultiva en Cordoba en / la Alamea en el Hospital del Cardenal &c./ y en el Año de 1794 remití desde esta Ci-/udad á la de Sevilla, á Dn. Pedro Abat Cate-/dratico de Botanica en la Sociedad Medica, / una Planta arraigada para aquel Jardin.

417. *Thapsia Asclepium*. L.

418. *Pastinaca opoponax*. W./ No tenia ya ojas.

419. *Smyrnum Perfoliatum* L./ En la bajada pª. el olivar de / Val de las huertas 19 Junio.

420. *Smirnum/perfoliatum*.

421. *Sium Repens* W [tachado *Repens* W] *Sium Nodiflorum* L. [Otra etiqueta dice]: *Anetum Segetum* L?

422. *Pimpinella Glauca*. L./ sera *Seseli pimpineloides*?

423. *Pimpinella* ahorquillada / *Orchis*.

424. *Viburnum tinus*. W.

425. *Viburnum* / *Thinus*/ *Cabrera*.

426. *Viburnum lantana*.

427. *Viburnum lantana* / W.

428. *Viburnum* (*Opulus*) *foliis lobatis, petiolatis glandulosis*./ Vs. *roseum*. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 2º. pag. 829./ *Opulus* flore globoso. T. Inst. R. H. 607. Quer Flo-/ ra Española tº. 6º. pag. 18./ *Sambucus aquatica polyanthos*. C. B. com. M. 874./ Este arbusto se cria en los montes de Leon y Asturias:/Quer. y se cultiba en Cor-

doba en Jardines y casas particulares, la llaman *Mundo* por la disposicion globo/sa de sus flores, florece en los meses de Mzo. y Abril.

429. *Sambucus* (nigra) cymis quin-/que partitis, caule arboreo. Pract. / Bot. de Lin. pr. Palau tº. 2º. pª 835 / *Sambucus* fructu in umbel-/la nigro. T. I. R. H. 606. Flora/Española tom. 6º. pag 243./ *Sambucus*. C. B. com. Matth / sup. Diosc. 873. Lag. in eodem 887./ vulgo: *Sauco*./ Se cultiba en Cordoba el Sa-/uco, hecho arbol mui frondoso, en/ varias partes, como en el Hospi-/tal de Jesus, en la Alameda, y/ algunas casas particulares, flore-/ce en Mayo, y Junio,/ se hace uso de la/ flor en la/ farma-/cia.

430. *Tamarix Gallica* L./Entrena.

431. *Corrigiola Littoralis* / 23. H 20. C.

432. Le he contado 5 estambres 3 pistilos/ y aunque exactamte no están marcados/ todos las caracteres en el caliz y venta/llas de la caja. me parece es el/ telephium oppositifollum. W./Examinela Vmd. tal vez variaran/ los estambres.

433. Podra ser la *Alsine Mucronata*/vea Vmd la nota de W. despues/ de la minuarta montana.

434. La Plantita tiene cinco estambres/ y 3 pistilos las anteras color de Lila/ y algo mellizas: En caso de no ser/ la *Alsine mucronata* es ena espe/cie nueva de este Genero.

435. *Alsine* (Media) petalis bipartitis, foliis ova-/to-cordatis. Pract. Bot. de Lin. pr. Pal tº. 2º. 853./*Alsine* media T. I. R. H. 243. F. E. tº 2º. 257./*Alsine*. Lag. 432. C. B. com. Mat in D. 782./vulgo *Pampolina*./ Esta planta es harto comun en Cordoba en/ las huertas, Jardines, y todos los sitios humedos/ de la ciudad: es annua y florece en Marzo y Al

436. *Parnasia palustris*/Boissier [véase 623. *Oxalis* nov. sp.]

437. *Statice Armeria*.

438. *Statice armeria* v.  $\beta$ . / alliacea.

439. *Statice armeria*.

440. *Statice limonium*/armeria.

441. 24. L./*Statice echioides*.

442. *Statice iuniperifolia* W./ coespitosa. Caban.

443. 36 *Statice dechotoma*/Cabanilles H /*Velezia rigida*.

444. *Staticeae Ferulacea*/Cabrera.

445. *Statice ferulacea*.

446. *Statice* (sinuata) caule herbaceo, /foliis radicalibus alternatim pinna-/to-sinuatis, caulinis ternis trique-/tris subulatis decurrentibus. Pract./Bot. de Lin. pr. Palau tº. 2º. pª. 876 / *Limonium peregrinum*, fo-/liis Asplenii. T. Inst. R. H. 342. /Flora Española tom. 5º. pag. 353. / Se halla esta p!anta en Ali-/cante, Reino de Valencia, cerca de/ Malaga, de Cadiz y otras partes de/ Andalucía. Quer./ Coji este esqueleto del Jardin/Botanico de Sevilla. año de 1793.

447. [*Linum catharticum*].  
 448. [*Linum angustifolium*].  
 449. *Linum/usitatissimum* / se cria silvestre / en las costas del oceano.  
 450. *Linum tenuifolium*.  
 451. *Linum tenuifolium*/W.  
 452. *Linum tenuifolium*/v.  
 453. Lino azul/ de francia.  
 454. Lino de flor/amarilla-rosa.  
 455. *Linum flavum*?  
 456. *Linum strictum*.  
 457. *Linum strictum* (Cavans).  
 458. *Linum suffruticosum*.  
 459. *Linum/ suffruticosum*/W.  
 460. *Linum suffruticosum*?/ 36/H.  
 461. *Linum africanum*.  
 462. Pentandria/ Pentaginia / *Samolus*? /*Linum*/ 34/L.  
 463. *Crasula*. 18. C./ y *Sedum* [tachado y *Sedum*].  
 464. *Crassula rubens*/W.

### **Clasis/VI/ Hexandria / Ordo / Monogy/nia**

465. *Narsisus Poeticus*, / Arroyo de las piedras / florece por 8bre.  
 466. *Narcisus pseudo Narcisus*/W/Dehesa del Oro - 12 Abril.  
 467. *Narcisus bicolor* L/Entrena.  
 468. *Narcissus* (*Tacetta*) *spatha multiflora*, nectario campanulato plicato truncato triplo petalis brevior, foliis/planis. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 3º. pag. 43./ *Narcissus palidus*, circulo luteo. T. Inst. R. Herb./ 354. Quer Flora Española tº. 5º. pag. 477./ *Narcissus* I. C. Bauh. comment. Mat. sup. Diosc. 858./ Esta especie se cria con abundancia en sitios humedos de/ los campos de Cordo-

ba, como en la Albayda, en el Cerro/ de las hermitas y otras partes. florece en En°. y Feb°.

469. Hexandria. Monogynia./ G./ Narcissus/. De Narcisso, cierto Mancebo mui pagado de su belleza/ el qual segun fingen los Poetas se transformo en esta / Planta./ *Narcissus* (Bulbocodium) spata uniflora,/ nectario turbinato, petalis majore, geni-/talibus declinatis. P. B. de L. pr. P. t°. 3° 44./ *Narcissus montanus, juncifolius. caly-/ce flavo. T. I. R. H. 356. F. E. t°. 5°. 478./ Narcissus, Pseudonarcissus juncifolius,/ tuba non fimbriata, flore flavescente./ Swert florileg. fl. 21./ Este Narciso se cria en las/Provincias de España: en Andalucia en-/ tre Sevilla y Lisboa./ Trage este esqueleto de Sevilla el /Año de 1793 donde me lo dio Dn. Anas-/tasio Guzman, entonces agregado á a-/quel Jardin Botanico. &tc.*

470. *Narcissus* (Jonquilla) spatha multi-/flora, nectario campanulato brevi, fo-/liis subulatis. P. Bot. de L. Pal. t°. 3°. 45./ *Narcissus juncifolius, oblongo/ calyce, luteus, major. T. Inst Rèi./H 355. Flora Española t°. 5° pag. 477./ Esta se halla en las campiñas/ de Cordoba en sitios humedos, y don-/de la he visto con mas abundancia/ es en la Ysla que formo mas arriba/ de Lopegarcia el Rio quando dexo a-/quel molino en seco. Se cultiba tam-/bien en la Ciudad pr. su vista y olor agra-/dable: florece en Enero y Febrero.*

471. Narciso/ hermoso/ con lacinias/ en la campanilla/ 6 estambres/ iguales.

472. *Pancratium* (Maritimum) spata multi-/flora, petalis planis, foliis lingulatis./Lin. Spec. Plant. pr. pu. t°. 3°. pag. 47./ *Narcissus maritimus. T. I. R. H./ 377. Flora Española tomo 5°. pag 478./ Narcissus Pancratium marinum,/ flore albo. Swert. florileg. lib. 1°. fol 27./ vulgo: Narcisos./ Esta planta que havita en las cos-/tas maritimas del Oceano de Anda-/lucia, se cultiva en Cordoba en Jar-/dines, y Casas particulares. La dan va-/rios nombres, pero aquel es el mas frecuente. Florece por Julio y Agosto.*

473. Amarillys Belladona.

474. *Allium Mollis. L. S. P. 432./ Clase sexta orden Monoginia./ Allium angustifolium,/ umbelatum, album. T. Y. R. H. 385*

### **Clasis/ VIII/ Octandria,/ Ordo/Monogy-/nia**

475. *Allium/Vzgr. 10 Julio. [Otra etiqueta dice]: Class 6.<sup>a</sup> Hexandria Ordo/Monoginia/ Allium Chamaemolis /Linn. Tom. 3°. Lag<sup>a</sup>. 86/ Ajo pequeño Moli.*

476. *Allium clusianum*/W.

477. *Tulipa* (Sylvestris) flore subnutante, fo/liis lanceolatis. P. B. de L. pr. Pu. tº. 3º. 101./ *Tulipa* minor, lutea. T Inst. Rei/Herv. 376. Flora Española tº. 6º. 432./ Esta especie de *Tulipa* se cria en varias Provincias de España: en Anda/lucía cerca de Carmona &c. Quer / Su raiz es perenne, bulbosa; y flo-/rece en los meses de Pri-




Figura 3.<sup>a</sup>—Autógrafo de Rafael Entrena

mavera./ Trage á Cordoba, en el año de/ 1793 cebollas de ella, y este esqueleto,/ del Jardin Botanico de Sevilla

478. *Tulipa silvestris*?

479. *Tulipa* (Gesneriana) flore erecto, foliis ovato-lan-/ceolatis. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 3º. pag. 101./ *Tulipa* praecox, lutea. T. Inst R H. 373. Qr. tº. 6º. 432./ *Narcissus* V. C. B. com. Mat. sup. Diosc 859./ *Tulipa* major. Dod. pempt./ Esta planta se cultiba en Cordoba en varios Jardines/ y casas particulares, yo la he cultivado tambien algu-/nos años. Fue traída á España de Capadocia año de/ 1559. segun Gesnero, á cuya memoria se consagra.

480. *Ornithogalum Pirenaicum* L.

481. *Ornithogalum umbelatum*/ W./ en la torrecita del Carrizal/ 28 de Marzo.

482. *Scila italica*/W.

483. *Scila Peruviana*/ Entrena.

484. *Anterico ramoso*.

485. *Convalaria Mayalis*.

486. *Convallaria Polygonatus*/ Fuente del Texo.

487. *Hyacinthus* (Nonscriptus) corollis campanulatis sex-/partitis apice revolutis P. Bot. de L pr. Pal. tº. 3º. 158./ *Hyacinthus* oblongo flore, coeruleus, major. T /Inst R. H. 344 Quer Flora Española tº. 5º. 237 / *Hyacinthus* non spicatus Dod. pempt. 216./ Se cria en varias partes de España: vease á Quer/ la cultibo en Cordoba, traxe sus bulbos del Jardin/ Botanico de Sevilla, en 1793. fe. en Abril.

488. *Hyacinthus* (Serotinus) petalis exterioribus sub-/distinctis, interioribus coadunatis. Pract. Bot. de/ Lin. por Palau tº. 3º. pag. 159./ *Hyacinthus* obsoleto flore. T. Inst. R. H. 345./ Quer Flora Española. tº. 5º. pag. 238./ Esta especie se cria en Cordoba en Peñataxa-/da y otros sitios de la Sierra: florece en Abril.

489. *Hiacintus Serotinus*/Lachenalia. [Otra etiqueta dice]: *Hyacinthus Serotinus*/ Cab./ Batan de Siles.

490 *Hyacinthus* (Orientalis) corollis infundibuliformis se-/mixfidis basi ventricosis. P. Bot. de Lin. pr. Pal. tº. 3º. 160./ *Hyacinthus* Orientalis major et minor. Dodon / pempt. 216./ *Hyacinthus* Orientalis alter. C. B com. Mat. 744./ Esta planta se cria ó mas bien se cultiba en los/ Jardines, y casas particulares de Cordoba: la llaman *Ja-/cintos*, su raiz es pe., florece en Mzo. sus corolas son azules.

491. *Hyacinthus* (Orientalis). Vs./ Estas variedades del Jacinto Oriental se cul-/tiban en Córdoba en el Jardin del Obispo y/ otros de curiosos: de la variedad blanca tra-/xe una cebolla de Jardin Botanico de Sevilla/ año de 1793. florece en Marzo y Abril.

492. *Hyacinthus Cymosus*.

493. *Hyacinthus* (Racemosus) corollis ovatis, summis ses-/silibus (rectius sterilibus) foliis laxis Pract. Bot. de/ Lin. pr. Palau tº. 3º. pag. 164./ *Muscari* arvense, Juncifolium, coeruleum, mi-/nus. T. Inst. R. H. 348. Flora Española tº. 5º. pag. 457./ He visto esta especie en la cerca de Peñataja-/da camino de Linares, y en algunos sitios de la Ala-/meda, y otros sitios cerca de Cordoba. florece en Abril.

494. *Hyacinthus Race/mosus*.  
 495. [*Juncus*.]  
 496. *Juncus filiformis*. L.  
 497. *Juncus Bulbosus*.  
 498. *Juncus buffonius*/H. 9.  
 499. *Juncus Jacquini*. L.  
 500. *Juncus Muricatus*/ Cabrera.  
 501. *Franquenian*/ Pulverulenta.  
 502. *Rumex /verticillatus*/ Cabrera  
 503. *Rumex Patientia*.  
 504. *Rumex crispus*/Lin.  
 505. *Rumex Pulcher*.  
 506. *Rumex bucephaloforus* /W.  
 507. *Rumex Vesicarius* Lin.  
 508. *Rumex Tingitanus* /Cabrera.  
 509. *Rumex Acetosa* /Azedera.  
 510. *Rumex / acetosella*/W.  
 511. *Rumex acetosella*. L./Venta del espíritu. Sto  
 512. *Rumex*.  
 513. *Colchicum* (Autumnale) foliis pla-/nis lanceolatis erectis  
 Pract. Botan./ de Lin. pr. Palau tº. 3º. pª. 265./ *Colchicum commune*.  
 C. B. 67./T. 348. F. E tº. 4º. pª. 386./ *Colchicum*. Lag. 430. Dodon/  
 pempt. 460. C. B. com. Matt sup./ Diosc. 777./ *Colchicum vernum*  
 flore pur-/pureo. Swert. florileg. lbº. 1º. fol. 56./ Se cria esta planta  
 cerca de / Cordoba, en las torronteras del A-/rroyo de las peñas de-  
 tras de la Hu-/erta del Naranjo, en la Albayda,/ y en la Campiña  
 tambien. florece / en el Otoño, y arroja las ojas en el invierno.  
 514. *Alisma plantago*.  
 515. *Alisma* (Plantago) foliis ovatis/acutis, fructibus obtuse-tri-  
 gonis./Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 3º. 273./ *Ranunculus palustris*,  
 Planta-/ginis folio, ampliore. T. Inst. R/H. 292. Flora Española tº.  
 6º.168./*Plantago aquatica*. Laguna en Diosc. pag 371/Coji este esque-  
 leto en el Jardin/Botanico de Sevilla en 1793. haunqe./ todabia no lo  
 he visto tengo noticia cierta de que se cria en Cordo-/ba en quema-  
 dillas./ Crece de dos á tres pies de alto. [Reverso]: Esta especie la  
 cogi en 1796 en el /canal de Manzanares, de donde pr /comision del  
 pr. Catedratico del Rl./ Heptandria. Monogynia. Jardin Botanico  
 D. Casimiro Orte-/ga lleve un zesped á dicho Jardin.  
 516. *Folium communis /magnitudinis, AEs-/culi Hippocastani,*/  
 petiolo dissecto.=, in 1794.

## CLASE VIII.

Clasis/VIII/Octandria, Ordo/Monogy-nia

517. Octandria Monogynia / Tropeolum Peregrinum / vulgo-Carnarios.

518. Oenothera (mollissima) foliis lanceola- / tis undulatis. Lin. Spec. Plant. pr. pu. / tº. 3º. pª. 308 / Habita en el Campo de Buenos-ayres L. / Se cultiva en Córdoba esta exo- / tica planta en la Alameda de el Obis- / po, y en mi Hortulo Botanico tengo noticia de que su semilla vino á Cor- / doba de Sevilla. Es suavísima al tacto. / Es annua, ó dura dos Años, y / florece por Junio y Julio / Crece de la altura de un pies á dos.

519. [Oenothera].

520. Epilobium (hirsutum) foliis opositis lance- / latis serratis decurrenti amplexicaulibus. / Lin Spec. Plant. pr. pu. tº. 3º pª. 313. / Chamaenerion villosum, magno flore. / purpureo. T. Inst. R. H 303. F. E. tº. 4º. 187. / Lysimachia siliquosa, hirsuta, magno flo- / re purpu- reo. C. B. Pin. 245. / Lysimachia purpurea Fuchs 491. / Pseudolysima- chium purpureum I. Dod. / Pempt. 85 / Este arbusto crece a la altura de un hombre, en las inmediaciones de Cordoba, como es / en el Arro Pedroches, y en la Palomera, donde lo / he cojido, y en otros Arro- yos y sitios de agua qe. / es donde abita Florece por Mayo y Junio.

521. Epilobium tetragonum / L. / Entrena. [Otra etiqueta dice]: Epi- lobium / Vzgr. 20 Julio.

522. Epilobium tetragonum L.

523. Erica vulgaris / vulgo - Brezo.

524. Erica foliis quaternis corollis ovatis / coeruleis antheris muticis inclusis / stilo exserto floribus spicatis / no me atrevo á de- terminarla Vulgaris / Se cogio en Fuencaliente / Erica vulgaris va- rietas ð W.

525. Erica Vulgaris / varietas / γ W Cabrera.

526. Erica scoparia. W

527. Erica purpurascens / umbria / W. / de Morote.

528. Dehesa de los Endrinales Sierra de / Alcaraz día 16 de Marzo de 1812. / Planta de 8 estambres 4 mas largos / corola mono- petala 4 drifida / de un pistilo ovario de figura de huebo / tubo corti- simo stigma en cabezuela. / Caliz comun de unas 6 ojuelas / llaman- la Martin Polo / Es purgante mordaz / Daphne / mezereon.

529. Daphne mezereum / W. / Royo frio y Sierra del agua.

530. *Dapne Dioica*.
531. *Daphne Gnidium* (Lin).
532. *Stellera passerina*/W / en Sbre. en la Palomera
533. 18. H. / 2/ *Paserina nitida*/Pereon.
534. *Passerina*/ *orientalis*/ W.
535. *Acer*/ *platanoides*./ W.
535. *Acer campestre*. L./ C in R H M.
537. *Poligonum*/ *Bistorta*/ Cabrera.
538. *Polygonum* (*Persicaria*) *floribus hexandris*/ *digynis*, *spicis ovato-oblongis*, *foliis lanceo-/latis stipulis ciliatis*. L. Sp. P. pr. pu. tº. 3º. pª 428 / *Persicaria mitis*, *maculosa*, *et non ma-/culosa*. Tourn T. R. H. 509. Fl. Esp. tº. 6º., 79./ *Persicaria*. Dodon... pempt. 597./ Esta Planta se cria con mucha abundan-/cia en Cordoba en las margenes del Guadal-/quivir. y en qualquiera parte de la Ciudad, en/ sitios pantanosos. Crece á la altura de dos ó tres / pies, es annua y florece en Julio y Agosto.
539. *Polygonum* (*Oriente*) *floribus heptan-/ dris digynis*, *foliis ovatis*, *caule erecto*,/ *stipulis hirtis*, *hypocrateriformibus*./ Lin. Spec. Plant. pr. pu. tº. 3º. pª. 430./ *Persicaria Orientalis*, *Nicotianae fo-/lio calice florum purpureo*. Tourn. C. 38./ *Flora Española* tomo 6º. pª. 81./ Habita en Oriente y en la India. Lin / Esta Planta exotica, se cultiva en Es-/paña en los jardines de muchos curiosos, co-/mo lo dice Quer en su *Flora Española*; la/ vi la primera vez en Cordoba en el Jar-/dín del Obispo á donde parece vino la semi-/lla de Madrid; la he cultivado; crece á la / altura de quatro pies, florece en Julio y Agosto.
540. *Polygonum Aviculare* Lin.
541. *Cardiospermum* (*Halicacabum*) *foliis/ laevibus*. L. Sp. P. pr. pu. tº. 3º. pª. 448./ *Corindum folio ampliore*, *fructu/ majore*. T. I. R. H. 431. F. Esp. tº. 4º. 433./ *Halicacabus peregrinus*. Dodon./ pempt. 452./ *Vesicaria Repens*. C. B. comm./ *Matth. super. Diosc. 755-/ Habita en las Indias*. Lin./ Esta Planta es exotica y se cultiva/ en España: en Cordoba en muchas casas/particulares; unos la llaman *Bombitas*, / y otros *Farolillos*. El año de 1793 invie/ semilla de ella al Jardín Botánico de/ Sevilla. Crece agarrandose con sus cirros á/ los los cuerpos vecinos, de 5 pies de alto, florece en Julio. ☉

**Clasis. IX, / Enneandria / Ordo / Monogy-/nia**

542. *Laurus* (*nobilis*) *foliis lanceolatis/ venosis perennantibus*, *floribus/ quadrifidis dioicis* Pract. Bot. de/ Lin. pr. Palau tº. 3º. pag.

462./ *Laurus vulgaris*. T. Inst R./Herv. 597. Flora Esp. tº. 5º. pag. 319./ *Laurus*. Lag. in Diosc. 64. C. B./ com. Mat. 125. Dod. pempt. 849./ Se haya el Laurel en Cordo-/ba en muchisimas partes, y en ca-/si todas las Huertas de la sierra/ y en muchos arroyos de ella. Es Ar-/bol de 15. ps de alto, fle. en Mzo. y Abl.

## CLASE X

543. *Anagiris foetida*.

544. *Cercis* (*Siliquastrum*) *foliis cordato-or-/bicularis glabris*. P. B. de L. pr. P. tº. 3º. 499./ *Siliquastrum*. T. Inst. R. H. 647./ Flora Española tom. 6º. pag. 296./ *Arbor Judae*. Dod. pempt. 786./ *Casp. Bauhin.* com. *Matt. sup. Diosc.* 171./ vulgo: *Arbol del Amor*./ Este Arbol se cultiba en Cordoba/ en la Alameda, de donde se han saca-/do/ varias plantas que se hallan en otros/ Jardines. Es mui corpu-/lento y robusto,/ y en el mes de Abril, quando se halla/ despoxado de oja, se cubre todo el de flos / encarnadas qe. ofrecen un aspecto agradable. [Otra etiqueta dice:] *Cercis Siliquatri/ flos./ Cercis Siliquastrum/ fructus*.

545. *Cassia* (*Occidentalis*) *foliis quin-/quejugis ovato-lanceo-latis mar-/gine scabris, exterioribus majo-/ribus. glandula baseos petiolorum*./ *Pract. Bot. de Lin. pr. Pal tº. 3'. 511.*/ Habita en la Ja-/maica. *Lin.*/ Coji esta planta en el Jar-/din Botanico de Sevilla año de / 1793, donde me dixeron ser la/ especie dicha.

546. *A Ruta muraria/ con las cajas Maduras*.

547. *Cassia Acuminata? W / Entrena* [Otra etiqueta dice:] *Cassiae quaedam species*. coxi esta especi de Casia en la Huer-/ta de los Padres Agustinos de Sevilla.

548. No es la *Robinia pseudo/ Acacia / La creo Cassia floribun-da/ Cav.s / Entrena*.

549. *Ruta* (*Graveolens*) *foliis decompositis, floribus laterali-/bus quadrifidis*. *Pract. Bot. de Lin. pr. Pal. tº. 3º. pag. 538./ Ruta sylves-tris, major. Tourn. Inst. R. H 257./ Quer Flora Española tº. 6º. pag. 228./ Ruta. Lag. in Diosc 298. Casp. Bauhin./ comment. Matth 540.= vulgo: *Ruda*./ Esta planta se cria en la Sierra de Cordo-/ba, y donde la he visto con mayor abundancia es/ en los contornos del castillo de la Albayda./ es perenne y florece en Abril y Mayo.*

550. *Ruta Linifolia/Palau t. 3. p. 540 / [Otra etiqueta dice:] Ruta linifolia W. tomo. 2 pag. 544/ Unica mata que he visto, cogida/ el 2*

de Julio entre la Puerta y/ Veas en el Valle de Guadalimar/ año de 1829.

551. *Melia* (Azedarach) foliis bipin-/natis. Pract B. de L. pr. P. tº. 3º. 552./ *Azedarach*. Dod. pempt 848./ T. Inst. R. H. 616. Flora Espa-/ñola tom. 3º. pag. 193./ *Pseudosycomotorus* C. B. com./ Ma-  
tthiol. super Diosc. 232 /vulgo: *Arbol del Paraiso*./ Este arbol se cria en Cordoba/ mui corpulento y frondoso, en la/ cerca de la Huerta Morales en/ frente de San Cayetano, y den-/tro de la Ciudad en la casa frente/ al colegio de la asumpcion, en/ el Convento de Religio-  
sas Agus /finas de Sta. Maria de las Nie-/bes, y otros sitios y casas parti-/culares. Florece en Mayo y/ Junio.

552. *Tribulus* (terrestris) foliolis sexjugatis sub-/aequalibus, se-  
minibus quadricornibus, Lin / Sp. Plant. pr pu tº. 3º. pª. 567./ Tri-  
bulus terrestris, Ciceris folio, semi-/num integumento aculeato. T.  
Inst. R. H./ 266./ Flora Española tº. 6º pª. 412./ *Tribulus terrestris*.  
Dodon. pempt./ 557. Lagun in Diosc. 385./ vulgo Abrojos./ Sus ta-  
llos crecen del largo de un pie en/ contorno de la raiz echados sobre  
tierra: es/ annual y florece por Julio./ Se cria en abundancia en to-  
dos los al-/rededores de esta Ciudad, y dentro de ella/ como en el  
campo de la Merced, Marrubial,/ y en patios de casas grandes y ca-  
lles poco pisadas.

553. *Saxifraga punctata*/W.

554. *Saxifraga* (Geum) foliis reniformi-/bus dentatis, caule nudo  
paniculato./ Pract. Bot de Lin. pr. Palau tº. 3º. 640./ *Geum rotundi-*  
folium, minus. T./ Inst. R. H. 251. F. E. tº. 5º. pª. 164./ *Saxifraga* iv.  
Casp. Bauhin./ comment. Matth. sup. Diosc. 694 / Esta planta se cria  
en Cordo-/ba, en la cuesta de trasierra suviendo,/ pasado el sitio que  
llaman el rebenton;/ en todo el cerro de la yzquierda, donde/ la he  
cogido, y visto repetidas veces./ Su raiz es perenne, brota en el/ Oto-  
ño, y florece en Abril y Mayo.

555. *Saxifraga Geum*.

556. Caliz adherente/ Decandria. Diginia/ Jenave Abril 812./ Sa-  
xifraga/ rotundifolia. [Otra etiqueta dice:] ¿*Saxifraga Granulata*? /  
Entrena.

557. *Saxifraga* (Tridactylites) foliis/ caulinis cuneiformibus tri-  
fidis/ alternis, caule erecto ramoso. Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau  
tº. 3'. pª. 648./ *Saxifraga verna*, annua. hu-/milior. T. I. R. H. 252.  
F. E. tº. 6º. 256 / *Paronychia altera*. Dod. pem. 113/. Esta plantica se  
cria en Cordo-/ba en las paredes viejas, y en al-/gunos patios enla-

drillados, como / en el del Argibe de Capuchinos, y/ en el del angulo grande de Sn. Ag.n/ es annua y florece en Abl. y M °

558. *Saxifraga tridactylites*/ W.

559. *Saxifragia* de Cespel.

560. *Saxifraga muscoides*. W./ Solo ese exemplar separado es/ por donde he podido determi/nar la especie, apesar de no/ estar mui seguro por el color/ q.e es blanco en la mia/ S Coespitosa. W.

561. *Gypsophila* (*Struthium*) foliis line-/aribus carnosis, axilla-ribus confer-/tis teretibus. P. B. de L. pr. P. t°. 3°. 660./ *Lychnis* Hispanica, Kali fo-/lio, multiflora. T. Inst. R. H. 338 / Flora Española t°. 5°. pag. 382./ Se da en los cerros de las Sa-/linas del Real Sitio de Aranju-/ez en terrenos incultos, secos, a/ridos y arenosos. La raiz es pe-/renne, y florece por Agosto. Qr./ Vi esta planta culibada en/ el Jardin Batanico de Sevilla/ donde coxi este esqueleto. 1793.

562. *Saponaria officina'is* Cav/ Entrena. [Otra etiqueta dice:] *Saponaria officinalis* Lin

563. *Saponaria officinalis*, L./Cabrera.

564. *Xabonera* / que se estiende/ porrigens W./ Dehesa del Oro.

565. [*Saponaria ocymoides*].

566. *Dianthus* (*Barbatus*) floribus aggregatis fasciculatis, / squamis calycinis ovato-subulatis tubum aequantibus, fo-/liis lanceolatis. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau t°. 3°, pag. 670 / *Caryophyllus hortensis*, barbatus, angustifolius, (vel lati-/folius.) T. Inst. R. H. 332. Flora Esp.ª t°. 4°. pag. 74./ *Armerius flos alter*. Dod. pempt. 176./ Esta planta se cultiva en los Jardines y casas particu-/lares de Cordoba, y la dan la denominación de *Ramilletes*,/ pr. la disposicion de sus flores. es pe. florece en Mayo &tc.

567. *Dianthus*/ *carthusianorum*/ Lin. Lag./ varietas.

568. *Dianthtus Carthusianorum* / Entrena. [Otra etiqueta dice:] *Dianthi Species*.

569. *Dianthus Proliferus*. L./ [Otra etiqueta dice]: *Cianela blauca*. [Y otra etiqueta]: *Dudo sea Cyanela* porque/ le falta el carácter de tener/ un estambre doble largo que/ los otros: La planta está sin/ fruto ni ojas por lo cual se/ra aventurado cuanto se diga.

570. *Dianthus*/ *prolifer*. Lin/ Lag.

571. *Diantho clavellina*/ *Caryophyllus*/W.

572. Class. X Decandria Ord Diginia/ *Dianthi Cariophili*/ varietas?/ Linn. tom. 3°. pag.ª. 674 *Clavellinas*.

573. *Dianthus Deltoides* L./ C ° in H R M.

574. *Dianthus Chinensis* / Entrena. [Otra etiqueta dice]: Esta esp es / *Dianthus Chinensis* L. / Entrena.
575. *Dianthus Plumarius* L. / C in R H M.
576. *Dianthus* / *virginicus* / W / an *pungens*?
577. *Dianthus hispanicus* / Asso. Lag.
578. *Diauthus carregianosum*
579. *Cucubalus/Behen/Cabrera*.
580. *Silene Lusitanica*? W/S. *Sericea* W. ? / Entrena.
581. *Silene Gallica* L / La otra sera / especie nueva. / Entrena.
582. *Silene Gallica*. L.
583. ¿*Silene cerastioides* L.? / ¿*S. Gallica* L.? / Entrena.
584. *Silene cerastioides*.
585. *Silene cerastioides* W.
586. *Silenes*? / 10 C. / Cambron / 9 Julio. [Otra etiqueta dice]: *Silene/ paradoxa/ preciosa/ hacia las juntas / de Guadalimar/ y Guadalmena*.
587. *Silene paradoxa*?
588. *Silene Portensis* L / Entrena. [Otra etiqueta dice]: *Silene/ 11 G. / V. 5 Julio*.
589. 73 Lag. / *Silene Viscosa* Cabrera / Sp. nova. [Otra etiqueta dice]: Cabrera / *S. Portensis*.
590. *Silene armeria* / W / *Saponaria/ ocymoides*.
591. *Silene saxifraga*.
592. *Silene*.
593. 34. *Silene* H.
594. *Silene*.
595. 33 *Silene* H.
596. *Silene ciliata* / W.
597. *Stelaria holostea* W. / in rupibus — mense Junio — 29 — / en las riscas del Cerro del rayo / y del arroyo blanquillo sobre / Navalasna.
598. *Arenaria* / 9. C. 13. M H. / V. 8 de Julio. [Otra etiqueta dice]: *Arenaria tetraquetra / rubra/ vars. β W. / Entrena*.
599. *Arenaria* / 12 H. 8. C. / Cambron / 9 de Julio. [Otra etiqueta dice]: *Arenaria tetraquetra / L/ striata [tachado striata] pungens* L. Entrena.
600. *Arenaria serpilifolia* / W / 5. S.
601. *Arenaria rubra* / W.
602. *Arenaria rubra* / W.

603. *Arenaria media*.  
 604. *Arenaria / gypsofiloides*.  
 605. H/ *Arenaria 19./ saxatilis*.  
 606. *Arenaria saxatilis / W./ laricifolia*.  
 607. *Arenaria / iuniperina /W.*  
 608. *Arenaria / coespitosa /W./ Rio molinos / an idem cum sequenti?*  
 609. *Arenaria polygonoides /W,*  
 610. *Arenaria / recurva /W.*  
 611. *Arenaria.*  
 612. *Cotyledon Umbilicus.*  
 613. *Cotyledon hispanica.*  
 614. *Cotyledon hispanica /W.*  
 615. *Cotyledon viscosa/ W.*  
 616. *Sedum*(*Telephium*) *foliis planius-/ culis serratis, corymbo folioso, caule/erecto Pract. Bot. de Lin. pr. P. tº. 3º. 750./ Anacampseros, vnlgº faba crasa./ T. I. R. H. 264. Flora Esp. tº. 3º. 17 / Telephium alterum sive Crasula. /Dodon. pempt. 130./Fabaria C. Bauhin. comm./Matthioli. in Diosc. 472./ Dice Don Josef Quer que se/cria en algunas partes de Andalu-/cia; pero no señala el Lugar. /Se cultiva en Cordoba en / muchas partes, y lallaman *Canji/-lona*. La usan para los callos de los pi-/es, y Grietas de los pechos. Crece de / un pie, es perenne, florece en Julio. [Reverso]: Tengo observada esta especie en Ca/taluña, junto á Calella á la parte / de la montaña/ en 1795.  
 617. *Sedum reflexum [tachado rupestre].*  
 618. *Sedum de 6 angulos.*  
 619. *Sedum Sexangulare L. /Entrena. [Otra etiqueta dice]: 30 H / en Jaen/Sedum/acre.*  
 620. *Sedum atratum/W.*  
 621. *Oxalis Acetosella L./ Entrena.*  
 622. *Oxalis (corniculata) pedunculis umbelliferis, caule ramoso diffuso. Pract. Bot. de Lin pr. Palau tº. 3º. pag. 771./ Oxys lutea. T. Inst. R. H. 88. Flora Española tº. 6º. 42./ Tritolium acetosum luteu. C. B. com. Mat. 608./ Esta planta es harto comun en los Jardines, y tierras/ cultibadas de Cordoba: se esparce mucho sobre la tierra / á causa de producir sus tallos raices, á trechos; por lo que /no es fácil esterminarla. Espe. florece en Abl. y Mayo.*  
 623. En el año de 1812 coji esta planta en / el viznagar junto á la fuente que llama/ban del pino, é hize de ella la descripcion/ si-*

guiente./ Caliz libre de 5 lacinias profundamente/ henchidas hasta su base./ Corola de 5 petalos./ Estambres 5 y otros 5 alternos de cada uno / de los cuales sale un hacecito de filamentos/coronados por unos globulitos que no se si /seran antheras./ Germen aovado. 5 estigmas sentadas/ una caja de 5 ventallas y 10 celdas /semillas menudisimas. / Reflexionando sobre el caracter de las / antheras asurcadas y persuadido á qe. los / filamentos de los 5 estambres mas cortos /pueden ser las paredes ó ventallas de las /antheras ya abiertas: y tambien á qe. / abriendose las ventallas de la caja en dos /por el dorso pudo parecer caja de 10 cel-/das me inclino á creerla una espe-/ [reverso]: cie nueva de *Oxalis* pues en este / caso solo varia del caracter generico / en tener los estigmas sentados sin / estilo vease Caban. n.º. 1111./ Yo no la he visto fresca / Pero en vista de lo que /Vmd dice tal vez sera / la *Oxalis rostrata* W. ó la *O Lepida* unicas/ especies de ojas simples./ es lastima no tener mas/ exemplares, p<sup>a</sup> examinar/la bien. Puede Vmd ver el Sonnini /*Parnasia palustris* /Boissier.

624. *Oxalis cernua*.

625. *Agrostemma Gitago*.

626. *Agrostema Jitago*.

627. *Agrostemma Corona-ria*.

628. *Lychnis* (*Chalcedonica*) *floribus/ fasciculatis fastigiatis*. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau. t.º. 3.º. pag. 779./ *Lychnis hirsuta*, flore incar-/nato, major. T. I. R. H. 334./ Flora Española t.º. 5.º. pag. 382./ *Flos Constantinopolitanus*./ Dodon. pempt. 178./ Esta planta habita en Rusia/ y se cultiva en los Jardines de Cor-/doba, su raiz es perenne, crece de/ dos á tres pies, y florece por Ju-/nio y Julio. Le tengo obserbada/ la capsula de una celdilla.

629. *Cerastium vulgatum* /L.

630. *Cerastium viscosum* / W. / Rio molinos.

631. *Cerastium semidecandrum?* W. / Stamina 8. Stili 5. petalis bifi-/dis, calice brebioribus in eo/obserbavi.

632. *Cerastium Dichotomum* / 21. C.

633. *Cerastio apretado* / *Cerastio apretado* / en las rocas de Segura.

634. *Cerastio* / apretado.

635. Planta curiosa que debe/ buscarse para determinarla./ No es necesario buscar otra pues aunque/ con bastante trabajo, remojando en agua/ dos capullos qe. tenia pude contarle los /7 estambres ó mas y los 5 pistilos./ *Spergula Arvensis*. W.

## CLASE XI

636. Euforbia/ Serrata/ Cabrera.
637. Euphorbia spatulata W./ Especie mui rara en esta/Wilde-  
now la pone como exótica pero yo /estoi en qe. es esta especie ú  
otra nueva/ Siempre es planta curiosa.

**Clasis/ XII/ Icosandria/ Ordo/ Monogy-/nia**

638. Class. 12 Ycosandria Ord. Monog./ Philadelphus Corona-  
rius/ Linn. p. P. Tom. 4 Pag. 127/ Philadelpho de coronas (vulgo)  
ge-/ringuilla/ en Cordovà lo llaman Celinda
639. G. Philadelphus/ De Phyladelpho Rey de Egypto./ Phila-  
delphus (Coronarius) foliis sub-/ dentatis. P. B. de Lin. pr P. tom.  
4º. 127./ Syringa alba, seu Philadelphus/ Athenaei. T. Inst. R. H.  
617. Flora/ Española tom. 6º. pag. 345./ vulgo: Zelinda.../Este Arbus-  
to dice Linneo se/ cria en Alemania y Suiza. Se cul-/tiba en Cordo-  
ba en muchisimas par-/tes, donde le dan aquel nombre. Sus / flores  
gozan un subidisimo y agrada-/ble aroma: crece á 7 ps., fle. en  
Mayo.
640. Amigdalus Communis/Almendro.
641. Mespilus. [Otra etiqueta de otro ejemplar dice]: Mespilus/  
pseudo-cidonia [tachado]/ [=Pirus Amelan/chier].
642. 20 de Abril/ Mespilus chamaemes-/pilus W./ me parece es-  
pecie nu/ eva foliis serratis acute/ como el Chamaemespilus/ y sub-  
tus tomentosis como/ el Cotoneaster Riomolinos [Falta el ejemplar].

## CLASE XIII

643. Chelidonium/ maius.
- 644 Chelidonium maius W / Siles. 28 de Marzo.
645. Chelidonium (Glaucium) pedunculis/ unifloris, foliis am-  
plexicaulibus/ sinuatis, caule glabro. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau  
tº. 4º. pª. 301./ Glaucium flore luteo. T. Inst./ R. H. 254. Flora Esp.  
tº. 5º. pª. 165./ Papaver corniculatum. Lag. in/ Diosc. 415. majus.  
Dodon. pem. 448./ Papaver flore luteo corniculat.m /Swert. florileg.  
lib. 2º. fol. 22./ Habita en los suelos mariti-/mos de España, y se  
cultiba en Cor-/doba, en el Jardin de la Alameda./ y pr. mi: es pe-  
renne fle. Abl. y Mo. [Reverso]: Observé esta especie en la playa/ del

Mediterraneo, en Cataluña/ junto, á Malgrat, en Sbre de 1795./ y de ayi trage semilla á Cordoba.

646. *Papaver* (Hybridum) capsulis subglobosis torosis hispidis, caule folioso multifloro. P. B. de L. pr. Palau tº. 4º. 304./ *Papaver erraticum*, capite oblongo, hispido. Tourn./ Inst. R. H. 238. no lo trae Quer F. E./ Esta especie se cria en los campos de labor de los/ alrededores de Cordoba en los mismos sitios que la/ *Hamapola* vulgar: es yerba anual y florece en/ los meses de Marzo y Abril.

647. *Papaver hybridum*.

648. *Papaver* (Rhoeas) capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisis. Pract. Bot. de Lin. pr./ Palau tom. 4º. pag. 306. / *Papaver erraticum*, majus Dioscoridis, Plinii./ Theophrasti. T. Inst R. H. 238. Flora Española tº. 6º. 54./ *Papaver erraticum*. Lag. C. B. com. Mat. 745./ Se cria en abundancia asombrosa en todos los/ campos de labor del circuito de Cordoba, la llaman *A-mapola*, es annua y florece en Marzo y Abril.

649. Class. Decima-tercia Polian-/dria Ordo Monoginia/ *Papaver cristatum* o *papa-/paberis somniferi*/ Linn. pr. Pal. tom. 4º. pª./ 308 / Se cultiva en Cordova en/ casi todos los jardines bajo el/ nombre de *Amapolas* de Yndias,/ este esqueleto no es de los mas/ dobles aun quando su semilla/ lo era, pr. algunas circunstan-/cias que acompañaron el tpo. / de su sembradura, otras son/ como el buelo de los Claveles [Reverso]. mas grandes a esta benefi-/ca planta debemos la salutife-/ra medicina del opio, tan acre-/ditada de algun tpo a esta par-/te y no sin mucha razon, es el/ tonico difusibo mas poderoso/ que se conoce, pero aun es mas/ calmante y anodino, y pudiera/ llamarse con razon el reme-/dio unibersal, y el manjar de/ los Dioses, hablando con el/ language de los Poetas, en el es/tado de opio puro es mas narcoti-/ca que calmante, pero en el de ex-/tracto acuoso segun los ultimos/metodos, es el anodino mas se-/guero, y posee las propiedades di-/chas arriba en el mas alto grado.

650. *Papaver / corniculatum*.

651. *Nymphaea* (Lutea) foliis carda-/tis integerrimis, calyce petalis/ majore pentaphyllo. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau tº. 4º. pag. 316./ *Nymphaea lutea*, major./ T. Inst. R. H. 261. F. Esp. tº. 5º. 497./ *Nymphaea lutea*. C. Bauhin./ com. Mat. sup. Diosc. 643. Dodon./ pemp. 585 / Vi esta planta en un pilon/ de agua en el Jardin Botani-/co de Sevilla, donde cogi este esqto.

652. *Tilia* (Europaea) floribus nectario/ destitutis. P. B. de L. pr.

P. tº. 4º. pª. 329./ *Tilia foemina*, folio majore. T./ Inst. R. H. 611 Flo. Esp. tº. 6º. pª. 388./ *Tilia*. Lag. in Diosc. 78. foemi-/na. C. B. com. Mat. sup. Diosc. 156./ vulgo: Tila / Este Arbol que es de la corpulencia de un Alamo, se cria en España/ en Aragon, Asturias, y los pirineos de/ Jaca, se cultiba un gran Arbol en Cor-/doba en el Ospital de Jesus, de donde se/ han sacado varias plantas. florece en Mayo, y Junio.

653. *Tilia microphylla* / Decandolle.
654. *Tilia Platyphyllos* / Decandolle.
655. *Cistus laurifolia* / W.
656. *Cistus Laurifolia* W./ Ledon?
657. *Cistus Ladaniferus*. W.
658. *Cistus Monspeliensis* / Cabrera.
659. *Cistus Salvifolius* W.
660. *Cistus / albidus* / W.
661. *Cistus Albidus*.
662. *Cistus Crispum*. L.
663. *Cystus crispus* L.
664. 38 *Cistus crispus*/ H.
665. *Cistus Halimifolius*. L./ sericeus. W.
666. *Cistus Libanotis*. L.
667. 34 Lag / *Cystus Libanotis*. fol nob. [tachado rosmar].
668. *Cistus Rosmarinifolios* / *Libanotis* L.
669. *Cistus libanotis*/W.
670. *Cistus / umbellatus* / W./ ipse est / *libanotis*.
671. *Cistus umbelatus* W./ Arroyo de D. Lucas
672. *Cistus / calycinus*/ W.
673. *Cistus / calycinus*.
674. *Cistus Levipes*. / *fumana* / W.
675. *Cistus canus* W.
676. *Cistus Italicus* / Cabrera.
677. *Cistus / Marifolius*.
678. *Cistus guttatus*.
679. *Cistus Guttatus* W./ tambien encuentro yo xaras, / sin herborizar en las Sierras de / Segura. / Es el *Cistus punctatus* W.
680. *Cistus / Ledifolius* / Abril de 1808.
681. n.º 39. H. / *Cystus salicifol*. L.
682. *Cistus Ledon*. W.
683. *Cistus Salicifolius* / W.

684. *Cystus Niloticus* L.  
 685. *Cistus aegyptiacus* W / Lagar del rosal 10 de Abril.  
 686. *Cistus aegyptiacus*  
 687. *Cistus aegyptiacus*/W.  
 688. *Cistus squamatus*. / [Otra etiqueta dice]: Determinada por Dn / Pedro Abatt catedra / tico de Botanica en / Sevilla./ Yo la tengo por variedad del / *C. Racemosus*.  
 689. *Cystus... Surreianus*. / n.º 33 Lag. ca. / Esta especie se distingue de / las demas herbaceas con estipulas/ pr. las hojas florales sentadas y/ sin estipulas, y pr. las flores en/ espiga ladeada y rebuelta: tiene/ los calyces mas agudos qe. las de-/mas especies, y diez estambres.  
 690. *Cistus numularius* / W.  
 691. 30/*Cistus serpilifolius* / W.  
 692. *Cistus thimifolius* / W./ An sp. nova / quae vercilatus dici/ poterit / nam stipulae in folia abeunt.  
 693. *Cistus Thymifolius*.  
 694. *Cistus Thimifolius* / Cabrera. [Otra etiqueta dice]: *Cistus thym* / *Fumana viscida* Spach/ 10 M/ Vsgr - 2 Julio.  
 695. *Cistus pilosus* / v.  $\beta$  W./ 38.  
 696. *Cistus strictus* [tachado *strictus*]/ W./ *pilosus* v.  $\beta$ .  
 697. *Cistus racemosus* / H. / Segura.  
 698. *Cistus Racemosus*/. Cabrera.  
 699. 33 / *Cistus racemosus*.  
 700. *Cistus polifolius* / W./ *hirtus*. [tachado *polifolius*].  
 701. *Cistus Populifolius* L.  
 702. 11 *Cistus* H.  
 703. Xara como romero.  
 704. *Cistus croceus*/ W.  
 705. *Cistus dichotomus* ? / W.  
 706. *Cistus ellipticus* / W./ *polianthos*.  
 707. *Cistus ellipticus* /W./ 29.  
 708. *Cistus lavandulaefolius*/ W.  
 709. *Cistus mutabilis* / Caban. /33/ H./ 38/ C.  
 710. *Cistus/plantagine-us*/ W.  
 711. *Cistus/ plantagineus*/W.  
 712. *Cistus punctatus*/W.  
 713. *Cistus serratus*. W./ aunque no tiene los Petalos/ aserrados creo es mas bien esta/ especie que el *C. Guttatus*/ pero de las dos no' escapa.

714. *Corchorus* (olitorius) capsulis ob-/longis ventricosis, foliorum serra-/ turis infimis setaceis. Pract. Bot / de Lin. pr. Palau t°. 4°. pag. 369./ *Corchorus* sive *Melochia*. T / I. R. H. 259. / Esta planta habita en Asia, / Africa y America. Pal. la vi culti-/bada en el Jardin Botanico de Se-/villa año de 1793. donde cogi este / esqueleto: es annua y florece en/ el Estio.

715. Polyandria. Diginia / G. / *Poeonia* / Llamada asi porque *Poeon* medico antiguo/ la descubrio ó puso en uso./ *Poeonia* (Officinalis) foliolis oblogis. mascula. / Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tom. 4°. pag. 382./ *Poeonia* folio nigricante, splendido, quae mas. T./ Inst. R. H. 273. Flora Española t°. 6° pag. 42./ *Poeonia* mas. Dod. pempt 194. C. B. com. Mat. 655. / La Peonia se cria en la sierra de Cordoba, y donde se/ halla en grandisima abundancia es en las Gamonosas/ dehesas situadas hacia Villa-viciosa: su raiz es perenne,/ florece en Abril y Mayo.

716. *Delphinium* consolida/ú otra especie.

717. Class. Decima - tercia Poliand<sup>a</sup>./Ordo Triginia/*Delphinium* Ajacis/Linneo por Palau t°. 4°. p.<sup>a</sup> 390/ *Delphinio* de Ajax/ vulgo Espuela de Caballero/ Se cultiva en casi /todos los jardines de /Cordoba, y varia ma-/ravillosamte. en los colo-/res de la corola y doblan-/do su flor, qe. se hace ri-/zada y plena.

718. *Delphinium*/ ajacis/W.

719. *Delphinium* Peregrinum Lin.

720. *Delphinium* peregrinum/ ó/ D. Ajax/ Entrena.

721. *Delphinium*/ *Staphisagria*.

722. *Delphinium* (*Staphisagria*) necta-/riis tetraphyllis petalo brevioribus / foliis palmatis, lobis obtusis. Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau t°. 4°. p.<sup>a</sup> 394 / *Delphinium* Platanifolio, Sta-/phisagria dictum. T. I. R. H. 428./ Flora Española tom. 5°. pag. 44 / *Staphisagria*. C. B. com. Mat / sup. Diosc. 850. Lag. 471. Dod. p. 366./ vulgo: Albarraz./ Se cria esta especie en el/termino de Cordoba, particularmte. /en las dehesas de Rivera, se hace/ gran cosecha de sus semilla, que sir-/ [Reverso]: ve para matar los piojos con su/cocimiento. Es annua y florece/ por los meses de Mayo y Junio.

723. *Delphinium*/ V. 14 Julio.

724. Classis Decima-tercia Poliandria Ordo/ *Pentaginia*/ *Aquilegia vulgaris*/Linneo pr. Palau t°. 4°./ pag.<sup>a</sup> 405= *Aquilegia*/vulgar, (vulgo) Aguile-/ña, Manto real, Peli-/canos./ Se cultiva en Cordo-/va en casi todos los /Jardines y entre ellos/ en el de la Condesa/ de la Torre de donde/ obtube este esqueleto.

725. *Aquilegia* (vulgaris) nectariis incurvis. Pract. Bot. de/ Lin. pr. Palau tº. 4º. pag. 405. / *Aquilegia* sylvestris. T. Inst. R. H. 428. Quer / Flora Española tº. 3º. pag. 81. / *Aquilegia*. Dod. pempt. 181. *Aquilina*. C / Bauhin. comment. Matth sup. Diosc. 467./ Esta planta se cultiva en Cordoba, la llaman/ *Pelicanos*, varia produciendo las flores dobles, y de color blanco, florece en Abril y Mayo.

726. *Nigella*/ *Arvensis* /Cabrera.

727. *Nigella* Orientalis.

728. *Nigella* Vulgaris/ vulgo Arañas.

729. *Anemone* Coronaria.

730. *Anemone* (coronaria) Variet. *à* ./Pract. Bot. de Lin. pr. P. tº. 4º. 434./ *Anemone* tenuifolia, mul-/tiplex, rubra. C. B. P. 176./ *Anemone* tenui folio ple-/no flore, ex atro purpuracen-/ti. Swert. florileg. lib. 1º. fol 4 / Esta hermosísima *Anemone*/ se cultiva en todos los Jardines/ de Cordoba, y en muchísimas ca-/sas, Su raíz es pe. fle. en Mzo y Al.

731. *Anemone* (Palmata) foliis cordatis/ sublobatis, calyce hexaphylo colorato / Lin. Spec. Plant. pr. pu. tº 4º. pª. 435./ *Anemone* Cyclaminis seu Malvae/ folio, lutea. C. B. P. 173. T. I. R. Herv./ 275. F. E. tº. 3º. pª. 34./ *Anemone* hortensis lutea Swert./ Florileg lib. 1º. fol. 3./ Esta planta se cria con abundancia á/una Legua de distancia de la Ciudad de Cordoba/ en Sierra-morena, en territorio del Lagar de/ torre-doria, y en todos aquellos contornos, donde/ la he observado, y de donde la traje á Cordoba el/ Año de 1792. Su raíz es perenne, tuberosa, de/ donde salen las hojas con pezones mui largos, ha-/ llandose estas pegadas al suelo alrededor de la plan-/ta pr. estar aquellos soterrados. Florece en Abril.

732. *Anemone*

733. *Clematis* (Vitalba) foliis pinnatis foliolis cordatis/ scandentibus. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 4º. 449./ *Clematitidis* sylvestris latifolia. T. I. R. H. 293./ Quer Flora Española tº. 4º. pag. 351./ *Clematis*. tertía. C. B. com. Matth. pag. 680./ *Clematis* altera. Lag. in Diosc. 380./ *Vitalba*. Dodon. pemp. 404./ Se cria en Cordoba en el arroyo Pedroches y otros/ su raíz es perenne, brota en Mzo. y fe. Junio y Jo.

734 Class. decima-tercia Poliandria/ Ordo Poliginia/ *Clematis* vitalva/ Linneo pr. P. tº. 4º. p. 449/ *Clematide* vidalva (vulgo) /Yerva de los Pordioseros. este/nombre lo deve a ser una/planta muy acre corrosiba/ razon pr. qe. los Pordioseros fin-/gidos se la aplicaban a

el cu /erpo, y se formaban llagas:/ se cria con mucha abundancia en la sierra de Cordova / donde vulgarmte. la llaman/ yerba Molinera= flore-/ce pr. Junio, y Julio.

735. Clematis Flamula Lin.

736. Talictrum Flavum. L.

737. Adonis/ autumnalis.

738. Umbria Abril. 1812./ 48. L /Adonis vernalis.

739 Polyandria Polygynia / G/ Ranunculus./ *Ranunculus* (bullatus) =/foliis ovatis serratis, scapo nudo/ unifloro. Lin. Spec. Plantarum/ pr. pu. tº. 4º. pª. 471./ *Ranunculus Lusitanicus*, folio sub-/rotundo, parvo flore. Tourn. Inst / Rei Herbar. 286./ Flora Española tº. 6º. pª. 171./*Ranunculus Lusitanicus*. Dod./pempt. 420./*Ranunculus latifolius*, bullatus,/Asphodeli radice C. B. P. 181./Se cria con mucha abundancia en/ los con tornos de Cordoba, como es en las / canteras, en las inmediaciones de la /Arrizafa &tc. florece por Octubre y / Noviembre: su raiz es perenne: pr. cri-/arse en la Arrizafa y florecer en Noviembre/ la llaman vulgarmente flores de San Diego.

740. *Ranunculus* (Repens) &c. Pract. /Bot de Lin. pr. Palau tº. 4º. pª. 483./ Variatus floribus plenis.=/vulgo: Boton de Oro. /Esta planta se cultiba en /Cordoba, en Jardines y casas/ particulares; se propaga y cunde /mucho con sus sarmientos: es pe/renne y florece en Marzo y/ Abril.

741. *Ranunculus* (Ficaria) foliis cordatis angulatis petio-/latis, caule unifloro. Pract. Bot. de Lin. pr. Pal. tº. 4º. 471./ *Ranunculus vernus*, rotundifolius, minor. Tournef / Inst. R. H. 286. Quer Flora Española tº. 6º. pag. 166./ *Chelidonium minus*. Lag. in Diosc. 257. Casp. B./ commnt. Matth. pag. 468./ Esta planta se cria en sitios humedos de los campos de /Cordoba, como el Arroyo Pedroches. en el Bosque de la A-/lameda, en las Acequias de las Hnertas. &tc. 2. fe. en Mzo.

742. *Ranunculus Asiaticus*.

743. *Ranunculus* (Asiaticus) Vs. φ / Pract. Bot. de Lin. pr. P. tº. 4º. 478./ Se cultiba en Cordoba en/los Jardines y casas particula-/res: su raiz es pe. fe. en Mzo.

744. *Ranunculus bulbosus*.

745. *Ranunculo* /acre.

746. *Ranunculus Aquati*/lis.

747. *Helleborus fetidus* [tachado fetidus] niger /W.

## CLASE XIV

Clasis / XIV / Didynamia. / Ordo / Gimnos- / per / mia.

748 *Aiuga pyramidalis*. / cultivada en casa / 1814.

749. *Ajuga* (reptans) stolonibus reptantibus Pract. Bo- / tanic. de Lin. pr. Palau t<sup>o</sup>. 4<sup>o</sup>. pag. 525. / *Bugula*. Dod. pempt. 135. T. Inst. R. H. 209. / Flora Española t<sup>o</sup>. 3<sup>o</sup>. pag. 317. / Se cria en varias partes de España vease Qr. / la cultibo en Cordoba, y el año de 1794 invié / un cespel de ella á Sevilla; se propaga mucho / rastreando, es perenne y florece en Abril y M<sup>o</sup>.

750. *Teucrium* / *Chamepitis*.

751 *Teucrium camaeopt* L.

752. *Teucrium* / pseudo-chamepitis / W.

753. *Teucrium Pseudo-Cha- / mepytis*.

754. *Teucrium Iva* L. / Cabrera.

755. *Teucrium fruticans*. / Vulgo-Olivilla.

756. *Teucrium* (Marum) foliis integerrimis ovatis acutis petiolatis subtus to- / mentosis, floribus racemosis secundis. / Pract. Bot. de Lin. pr. Palau t<sup>o</sup>. 4<sup>o</sup>. 534 / *Chamaedris* incana maritima fru- / tecens, foliis lanceolatis. T. I. R. H. / 205. Flora Española t<sup>o</sup>. 4<sup>o</sup>. pag. 167. / *Marum*. Lag. 296. C. B comm. / Mat. in Diosc. 536. / Farm. Marum Cortusi, et verum. / Se cria en el Reyno de Valencia, / y se ha cultibado en Cordoba en Jesus / Nazareno, y se cultiba hoy por mi. / En el Año de 1790. remití un / gran Zesped de esta planta al Jardín / Botánico de Sevilla, donde la vi en / el de 93. Es perenne- / y florece en los Meses de Junio y Julio. / El olor de esta planta es suma- / mente agradable á los Gatos, los incita / á Luxuria, por lo que se deleitan en mor- / derla, y revolcarse sobre ella, derraman- / do muchas babas, y alguna vez su es- / perma, quedando despues como aturridos / ó enagenados. Por este motivo, para con- / servarla, no se puede tener en el suelo, / ni en parte donde ellos la alcancen.

757. *Teucrium Scorodonia*.

758. *Teucrium* / *Scordium* / Cabrera.

759. *Theucrium* / *cameidrios*.

760. Class. XIV Didinamia Ord. Gimnospermia / *Theucrium Chamaedris* / Linn. Tom. 4<sup>o</sup>. Pag<sup>a</sup>. 543 / *Teucro Camedris*.

761. *Theucrium* / *pirenaicum* / W. [tachado *An rotundifolius* ?]

762. Class. XIV Didinamia Ord. Gimnospermia / *Theucrium Polium*/ Linn. Tom. 4º. pagª. 547/*Teucro Polio* (vulgo) Zamarilla. [Otra etiqueta dice]: Dudo qe sea *teucrium*/ pero no hai corola.

763. *Teucrium* (*Polium*) capitulis subrotundis, foliis oblongis/ obtusis crenatis tomentosiss sessilibus, caule postrato. Pract. / Bot. de Lin. pr. Palau. tº. 4º. pag 547. [Otra etiqueta dice]: *Teucrium* (*Polium*) Vs. β. Pract. Bot. de Lin. pr. / Palau tº. 4º. pag. 547 / *Polium montanum album*. T. Inst. R. H. 206./ Quer Flora Española tº. 6º. pag. 114./ Se cria con mucha abundancia en Cordoba/ en terrenos incultos y margenes de los caminos de la / sierra y en toda la falda de ella: es perenne y flo-/rece en los meses de Mº. y Jº

764. *Teucrium Polium* L/ Entrena.

765. *Teucrium/ polium* Lin./ seu *capitatum*/ W

766. *Teucrium Gnafalodes*. W.

767. *Teucrium valentinum*.

768. *Theucrium/ rorismarinifolio?*/ 41. H. / V. 8 Julio

769. *Teucrium/ son dos variedades?* / *rotundifolium*/ 45. L./ C. istmo 21 de Julio.

770. *Rara*./ *Satureia Greca* L.

771. *Satureia* (*Hortensis*) pedunculis bifloris / Lin. Sp. Plant. pr. pu. tº. 4º. pª.555./ *Satureja sativa*. Tourn. p. 197 Flora Española tº. 6º. pª. 253./ *Satureja*. Dod. pempt 289./ *Satureja*. Lag. in Diosc. 294./ vulgo *Axedrea*./ Dice Quer en su Flora española que se/ cria naturalmente en algunos terrenos de/ España; pero no los señala, se cultiva en las/ huertas y Jardines, y en Cordoba en muchas/ partes. Es annua y florece por Junio y/ Julio.

772. *Satureia* (*Capitata*) floribus spicatis, foliis cari-/natis punctatis ciliatis. Pract Bot. de Lin. pr. Palau/ tº. 4º. pag. 555. *Thymus capitatus*, qui *Dioscoridis*. T. Inst. R./ Herv. 196. Quer Flora Española tº. 6º. pag. 384./ *Thymus*. Lag. 292.= *Thymum*. C. B. comment./ Matth. sup, Diosc. 531.=vulgo: *Tomillo legitimo*. / Esta planta se cria con mucha abundancia/ en los terrenos aridos de los campos de Cordoba, es/ perenne y florece en los meses de Junio y Julio.

773. *Satureya/ Linifolia* Cabrera/ Desfontaines.

774. *Timbra spicata*.

775. *Thymbra verticilata*/ W.

776. *Hyssopus* (*Officinalis*) spicis se-/cundis, foliis lanceolatis.

Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau tº. 4º. 558./ *Hyssopus officinarum*, coerulea seu spicata. T. Inst. R. H / 200. Flora Española tº. 5º. pag. 247. *Hyssopus vulgaris* Dod. pem-/ pt. 287./ Esta planta se cria en varias partes de España: Quer, y se cultiva/ en Cordoba por algunos curiosos./ Es perenne y florece en Ma-/yo y Junio. Su semilla la hice ve-/nir á Cordoba del Jn. Bº. de Sevilla.

777. Class XIV Didinamia Ord. Gimnospermia/*Nepeta Cataria*/ Linn. Tom 4º. pag.<sup>a</sup> 561/ *Nepeta Cataria*.

778. *Nepeta*/ *Cattaria*/ Cabrera.

779. *Nepeta violacea* L. / Entrena. [Otra etiqueta dice]: *Nepeta*/ V. 3 de Julio.

780. *Nepeta Violacea*.

781. *Nepeta Nepetela* L / Entrena.

782. *Nepeta tuberosa*/ *Statice limonum*.

783. *Nepeta* (*Tuberosa*) *spicis sessili-/bus terminalibus*, *bracteis ova-/tis coloratis*, *foliis summis sessi-/libus*. Pract. B. de L pr. P. tº. 4º. 564./ *Cataria Hispanica*, *supina*/ *Betonice folio*, *tuberosa radice* / T. J. R. H. 202. F. E. tº. 4º. p.<sup>a</sup> 33./ Se cria esta especie de plan-/ta tres leguas de Cordoba entre/ campo alto y campo baxo, cami-/no de los Pedroches, y la he visto/ hacia las cuebas de la Albayda./ Su raiz es perenne: florece en Mayo.

784. *Lavandula* (*Spica*) *foliis lan-/ceolatis integerrimis*, *spicis nudis*./ Pract. B. de L. pr. Palau tº. 4º. 571./ *Lavandula angustifolia*. T. I./ R. H. 198. F. E. tom. 5º. p.<sup>a</sup> 315 / *Dodon. pempt. 273.*/ *Lavendula*. C. B. comm. Mat./ sup. Diosc pag. 32./ vulgo *Alhucema*./ Se cria en Andalucia: se/ hace mucho uso de la flor para/ perfumar, la planta se culti-/ba en Cordoba para dibuxos en/ los Jardines. Es pe. fle. en Junio.

785. *Lavandula spica*/ W.

786. Class. XIV Didinamia Ord. Gimnospera / *Lavandula Dentata*/ [tachado *spicata*] Linn. tom. 4º. pag.<sup>a</sup> 572./ *Lavandula Dentata*.

787. *Lavandula* (*Dentata*) *foliis pinna-/to-dentatis*, *spicis ramosis*. Pract./ Bot. de Lin. pr. Pal. tº. 4º. pag 572 / *Lavandula foliis crenatis*. T./ Inst. R. H. 198. Fl. Esp. tº. 5º. p.<sup>a</sup> 316./ Esta especie dice Quer la ha/ visto en el contorno de Cordoba;/ mas yo no la he visto todavia./ Se cultibaba en el Jardín Bo-/tanico de Sevilla el año de 1793./ donde cogi este esqueleto: es pe-/renne y florece en el Estio.

788. *Lavandula* (Stoechas) foliis lanceo-/lato-linearibus integerrimis, spi-/cis comosis. P. B. de L. pr. P. tº. 4º. 572./ *Stoechas* purpurea. T. I. R. H./ 201. Flora Española tº. 6º. pª. 335./ *Stoechas*. Lag 284. C. B. com./ Mat. sup. Diosc. 518./ vulgo *Cantueso*./ Esta planta se cria con mu-/chisima abundancia en las cer-/canias de Cordoba en terrenos/ aridos y guijarrosos, como en la/ peña de la buena vista, en el/ arroyo de las peñas, y en toda la/ Sierra. Es perenne y florece/ en los meses de Abril y Mayo.

789. *Sideritis* (montana) herbacea ebracteata/ *calicibus corola* [tachado brevioribus] *maioribus* spinosis/ labio superiore trifido. Palau. t. 4 p. 576./ La cogi en Nabalasna cortijada de Segura/ y la traxe viva á Cordoba año de 1814.

790. *Sideritis* Romana/ Mayo 24/ Cavan. f. 323.

791. No se pueden observar/ los estambres revueltos/ *Stachis* recta Cav/ó/ *Sideritis* romana Cav/ Entrena.

792. *Sideritis* romana. 22. L.

794. *Sideritis* / incana/ W. [Otra etiqueta dice]: Collado arenoso -10 Julio.

795. *Sideritis*/ blanquecina.

796. *Sideritis* scordioides/ W./ Desde la Venta de Ezpelui/ en el sitio de las Canteras/ viniendo á Andujar.

797. *Sideritis*/ Scordioides/ W.

798. *Sideritis*/ de pelo aspero.

799. *Sideritis* /hirsuta.

800. *Mentha* (Sylvestris) spicis oblon-/gis, foliis oblongis tomentosis ser-/ratis sessilibus, staminibus co-/rolla longioribus. Pract. Botan. de/ Lin. pr Palau tom. 4º. pag. 583./ *Mentha sylvestris* folio longi-/ore. T. I R. H. 189. Flª. Espª. tº. 5º. 429./ *Menthastrum*. C. B. comment./ Matthiol. sup. Diosc. 527. Lag 291./ Se cria esta especie en varias/ partes de España: vease á Quer./ Me dio este esqueleto con aquel/ nombre Genérico y Especifico, Dn./ Anastasio Guzman en Sevilla/ año de 1793. *Mentha Rotundifolia* L/ Entrena. [Otra etiqueta dice]:

801. *Mentha* Menthast-/rum. [Otra etiqueta dice]: *Mentha Rotundifolia* L/ Entrena.

802. *Mentha* Hirsuta L./ M ¿Aquatica? / Entrena.

803. *Mentha*/ Aquatica/ Cabrera.

804. *Menta* Rotundifolia L/ Entrena. [Otra etiqueta dice]: Class.

XIV Didinamia Ord. Gimnosp<sup>a</sup> / *Mentha Aquatica*/ Linn. Tom. 4<sup>o</sup>. pag.<sup>a</sup> 586 / *Menta Aquatica*.

805. Class. XIV Didinamia Ord. Gimnosperm<sup>a</sup>./ *Mentha Sativa*/ Linn. Ton. 4<sup>o</sup>. Pag<sup>a</sup>. 587./ *Menta Sativa* (vulgo) Yerva buena.

806. *Mentha* (Gentilis) floribus ver-/ticillatis, foliis ovatis acutis ser-/ratis, staminibus corolla brevio-/ribus. Pract. B. de L. pr. P. t<sup>o</sup>. 4<sup>o</sup>. 588./ *Mentha hortensis*, verticil-/lata, Ocymi odore. T. Inst. R. H./ 189. Flora Española t<sup>o</sup>. 5<sup>o</sup>. pag. 486./ *Sandalos* llaman en Cor-/doba á esta planta que se culti-/ba en muchisimas partes de la / Ciudad: la raiz tiene perenne/ y cundidora: florece en Junio/ y Julio y parte de Agosto.

807. Class. XIV Didinamia Ord Gimnosperm<sup>a</sup> / *Mentha Gentilis*/ Linn. Tom. 4<sup>o</sup>. pagina 588/ *Menta Gentil* (vulgo) Sandalos.

808. *Mentha pulegium* / Lin. Spec. plant. 807 / clase 14. orden gimnosperm / *Mentha aquatica*, seu Pu-/legiun vulgare. T. 189.

809. *Mentha Pulegium*/ vulgo Poleo/ Cabrera.

810. Class. Decima-quarta Didinamia/ Ordo Gimnospermia/ *Glecoma Hederacea*/ Linn. pr. Palau tom. 4<sup>o</sup>. p<sup>a</sup> / 594 *Glecoma* como Yedra (vulgo) / Yedra terrestre: es sola en su es-/pecie hasta aora, ó pr. lo menos/ pr. Linneo y Cabanilles, se culti-/ba en Cordova en varios jardi-/nes, y entre ellos en el de el Hos-/pital de Jesus, de donde trage/ este esqueleto.

811. *Lamium amplexicaule* L.

812. *Betonica officinalis*/W.

813. *Stachys germanica* Cav.

814. *Stachis* / de Palestina?

815. *Stachys recta*, Mayo/, 22.

816. *Stachys recta* 23. C.

817. *Stachys recta*/Entrena.

818. *Stachys recta*.

819. Balota negra.

820. *Marrubium/ candidissimum*/W. /Siles-Junio-29-

821. *Marrubium hispanicum*. L.

822. *Leonurus*/n.<sup>o</sup> 41 C. [Otra etiqueta dice]: *Leonurus*. *Marrubias/trum?* /Entrena.

823. *Phlomis Fruticosa* Cavs. /Entrena. [Otra etiqueta dice]:

Class. XIV Didinamia Ord. Gimnospermia/Phlomis Lichnites /Linn. Tom. 4º. pagª. 634/ Phlomis Lichnitide (vulgo) Candilera.

824. *Phlomis Purpurea*.

825. *Phlomis Licnithis-Mayo* 22.

826. *Phlomis* (Lychnites) foliis lanceo-/latis tomentosis, floralibus ovatis,/ involucris setaceis lanatis. Pract./Bot. de Lin. pr. Palau tº. 4º. pª. 634./ *Phlomis Lychnitis*. T. I. R. H./ 178. Flora Esp. tº. 6º. pag. 95./ Esta planta se cria en Cor-/doba en terrenos aridos y gijar-/rosos, como en toda aquella par-/te del camino de los Pedroches pa-/sada la puente. Es pe. y fe en Mayo.

827. *Phlomis Nisolii?* [Otra etiqueta dice]: No es el Plomis Nisolii, /ni ninguna especie de/ las qe. describe Lineo, Acaso/W. la trahera. como no/ esta fresca no se puede decidir/ sera el *Marubium Peregrinum*.

828. *Phlomis herbaventi*. Cavs.

829. *Phlomis herva-venti* L./ no se cria muy cerca de Cordo/ba aunque ignoro el paraje.

830. nº. 426/ *Mollucela Spinosa* Cav.

831. *Origanum* (Dictamnus) foliis inferiori-/bus tomentosis, spicis nutantibus. Lin./ Spec. Plant. pr. pu. tº. 4º. pª. 647 /*Dictamnus Creticus*. C. B. P. 222./ *Dictamnium verum*. Dod. pemp. 280./ *Origanum Creticum*, latifolium, to-/mentosum, seu *Dictamnus Creticus*. T./I. R. H. 199./*Dictamnium*. Lag. in Diosc. 288./ Farmac: *Dictamnus*, vel *Dictamus Cret* / Havita en el Mote Ida de Creta. L / Esta planta apreciable pr. ser exotica/ se cultiva en Cordoba por algunos Curiosos,/ donde vejeta con la mayor lozania: sazona/ sus semillas, y nace de ellas; yo la he cultiva-/do, y el Año de 1792 invie una maceta della/ al Jardín Botánico de Sevilla, donde la vi / con conplacencia el de 93. Es perenne y florece en el Estio.

832. *Origanum* (Vulgare) spicis subro-/tundis paniculatis conglomeratis,/bracteis calyce longioribus ovatis./ Pract. Bot. de L. pr. P. tº. 4'. pª. 649./ *Origanum sylvestre*, Cunilla/ bubula Plinii. T. I. R. H. 198 / Flora Española tº. 6º. pª. 26./ *Origanum sylvestre*. Lag. 286./ Dodon. pempt. 285./ *Origanum Vulgare*. C. B. in/ comment. Mat. sup. Diosc. 519./Se cria en toda la Sierra-mo-/rena de Cordoba. Se hace mucho / uso de el en las viandas; es pe-/renne y florece en el Verano.

833. *Origanum Mayorana*/ vulgo - Mejoranas.

834. Class. XIV Didinamia Ord. Gimnospermia/ *Origanum Mayorana*/Linn. Tom. IV pag<sup>a</sup>. 652/ Oregano Mejorana ó Almoradux




Figura 4<sup>a</sup>—Portada del Herbario de los botánicos cordobeses Rafael de León y Gálvez, Fr. José de Jesús Muñoz Capilla, Rafael Entrenas y Antonio Cabrera. Se conserva en el Museo de Biología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba.

835. *Thymus vulgaris*/varietas  $\gamma$  W.

836. *Thymus Zygis*. Cav.

837. *Thymus* (*Zygis*) floribus verticillato-/spicatis, caule suffruticoso erecto, foli-/is linearibus basi ciliatis. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau tom. 4<sup>o</sup>. pag. 655./ *Thymbra Hispanica*, Coridis fo-/lio. T. I. R. H. 197. F. E. t<sup>o</sup>. 6<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>. 377./ Esta planta se cria con mucha/ abun-

dancia en las cercanías de Cor-/doba, como el Marrubial, y parti-/cularmente en los cerros que vierten/ al Arroyo Pedroches, es perenne, y / florece por Abril y Mayo.

838. Vease el caracter diferencial/ de la Satureia que la separa/ del thymus. en Lin tourn./ *Thymus Cephalotus* L./ Entrena/ vide viride.

839. Class. XIV Didinam. Ord. Gimnosper<sup>a</sup>./ *Thimus Cephalotus* [tachado: *Capitatum*] /Linn Tom. 4<sup>o</sup>. pag<sup>a</sup>. 657 /Tomillo de cabezuela.

840. ¿An *thymus Villosus* L.?/ Entrena. [Otra etiqueta dice]: *Thimus/Capitatus/Cabrera*.

841. Class. XIV Didinamia ord. Gimnosper<sup>a</sup>./ *Melissa Oficinalis*/ Linn. Tom. 4<sup>o</sup> pag.<sup>a</sup> 660/*Melisa officinal* V. Toronjil.

842. *Melisa officinalis*. Lin.

843. *Melissa/ Calaminta/Cabrera*.

844. *Calaminta Montana /Rodr. /Melissa calamintha. L. /C in R H M.*

845. Class, XIV Didinamia Ord. Gimnospermia/ *Chalaminta Montana Vel/ Mellisa Chalaminta/ Lin. Tom. 4<sup>o</sup>. pag<sup>a</sup>. 661 Mellisa calaminta/ Mellisa pedunculis axilaribus/ dichotomis longitudine foliorum Mat. Me-/dic 176=Mellisa foliis subhirsutis ova-/to-lanceolatis acute serratis petiolis/floriocris comosis folia superantibus Hall. /Cavs. n<sup>o</sup>. 241.*

846. Class XIV Didinamia Ordo /Gimnospermia/ *Occimun Basilicum* Linn Tom. 4<sup>o</sup>. pag<sup>a</sup>. 678/ *Albahaca Real*

847. *Prunela Laciniata /Entrena*.

848. *Prunela Laciniata/ Lin./ Puente-hondo - Junio-29.*

849. *Cleonia Lusitanica/Cabrera*.

850. *Rhinanthus / crista-galli.*

851. *Rhinanthus (Trixago) calycibus hir-/suto-tomentosis, foliis oppositis, obtuse/ serratis, caule simplicissimo. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau tom. 4<sup>o</sup>. pag. 709./ Pedicularis maritima, folio oblongo/ serrato T.I.R.H. 172. F. E. t<sup>o</sup>. 6<sup>o</sup>. 69./ Esta planta se cria en si-/tios humedos; en Cordoba en el Arro-yo Pedroches, y en el Caño Bazan/ cerca de la Arrizafa. Es annua/ y florece por Mayo y Junio.*

852. *Euphrasia (Officinalis) foliis ova-/tis lineatis argute denta-tis. Pract./ Bot de Lin. pr. Palau t<sup>o</sup>. 4<sup>o</sup>. pag. 712./ Euphrasia Offi-cinarum. T.I./R.H. 174. Flora Españ. t<sup>o</sup>. 5<sup>o</sup> p<sup>a</sup>. 92./ Esta plantica se*

cria en/ Cordoba en los prados de las dege-/sas, y en qualquier suelo ó terreno/ de corteza, como en la Peña de/ la buena vista, y en Peña taxa-/da y la Campiñuela, y otros. / Es annua y florece en Abril y/ Mayo.

853. *Euphrasia officinalis* L.

854. *Eufrasia linifolia* se cria junto/ á Siles de Segura y desde el Bonillo/ á Villarodrigo llamase vulgarmte./ Algarabia. 40. C./ 42. H.

855. *Eufrasia viscosa* 37. L. / Se cria con abundancia junto á/ Siles de Segura camino de la fuente/ Salivas y por todo el cerro de la her-/mita de Sta. Quiteria

856. *Euphrasia Viscosa* L. [Otra etiqueta dice]: *Euphrasia Purpurea* W.

857. *Linaria pilosa* (Desfontaines)/ ó/ *Anthirrinum pilosum* Lin.

858. *Linaria spuria* / Cab. 804 / *Antirrin. L* / Viz. 3 Sbre.

859. *Anthirrinum Spurium* L.

860. *Anthirrinum/ Cirrosum*.

861. *Antirrinum Purpureum*.

862. *Anthirrinum / bipunctatum/ mui bonito/ hacia la Ventilla/ en las Orillas del/ Guadalimar y el Cortijo de Paulez.*

863. *Antirrinum sparteum* L/ an? *A. Arvense* Vars.  $\beta$  L.

864. [tachado *Narcisus bulbocodium*] / *Linaria* n°. 39. L. / *Antirrhin. triste?* L. [Otra etiqueta dice]: *Linaria* 41. L. / Amo. 11 Jul.

865. [*Anthirrinum / Saxatile*].

866. *Anthirrinum / saxatile*.

867. *Antirrhinum / villosum* W. / *Linaria hispanica* / de Tournefort.

868. *Antirrhinum / organifolium/ W.*

869. *Antirrhinum*. [tachado *Organifolium*]. W.

870. *Antirrhinum / hirtum* W.

871. *Antirrhinum* (*hirtum*) foliis lanceolatis hirtis alter-/nis, floribus spicatis, foliolo calycino supremo maximo./ *Pract. Bot. de Lin. pr. Palau* t°. 4°. pag. 761./ *Linaria latifolia*, villosa, laciniis calycinis inae-/qualibus, flore majore pallido, striato, rictu aureo. / *Quer Flora Española* t°. 5°. pag. 356 / Esta planta la tengo por Variedad de la especie/ indicada, por no producir las ojas hirsutas: se usa pr./ la *Linaria* oficial, en Cordoba, se cria en los campos/ de labor de su circuito, es annua floe. en Abril.

872. Class. XIV Didinamia ord. Gimnospermia / Anthirrinum junceum/ Linn. Tom. 4º. pagª. 762 / Antirrinum como Junco.

873. Tetrandria monoginia/ caliz 5 fido/ corola bilabiada/ labio superior en dos lacinias/ inferior en 3, mayores las de los lados/ De los estambres 2 mas cortos unidos/ todos 4 por las antheras/ estigma en cabezuela/ caja redonda/ Antirrinum iunce-um.

874. Anthirrinum iunceum.

875. Visto 1838/ 3º / Didinamia/ Anthirrinum/ iunceum.

876. Anthirrinum Linifoli-um - Mayo 23.

877. Anthirrinum / [tachado hirtum] W./ pedunculatum.

878. Antirrinum Majus/L.

879. Antirrinum maius/Umbria/ 16 de Junio de 1812. [Otra etiqueta dice]: Antirrinum / maius. de la / Sierra de Segura.

880. Antirrhinum Mayus.

881. Anthirrinum orontium.

882. Antirrhinum orontium / Entrena. [Otra etiqueta dice]: Class. XIV Didinamia Ordo/ Gimnospermia/ Anthirriini species / Linn. Tom. 4º. pagª. 743.

883. Antirrinum Belideifo/lium. L. Entrena.

884. Anthirrinum sp. no./ foliis radicalibus / pinnatis/caulinis linearibus/ bifidis. et simplicibus.

885. Anthirrinum / simplex / W. [tachado haclava]

886. Antirrinum N. sp./in maritimis. foliis/ carnosis. nº. 38 Lag./ Cabrera/ ? Sparteum L.

887. Antirrynum/ micranthum /W.

888. Antirrhinum / [tachado bipunctatum] marginatum W.

889. Anthirrinum/ Latifolium W.

890. Anthirrinum/ aparinoides/W.

891. Anthirrinum/ Amethystinum/W.

892. Anthir. Amestistinum /W.

893. Linaria Latifolia. W.

894. Linaria 2/ 17/Cañada roman/ Abril 1812.

895. Linaria / 9 de Julio/ cambron.

896. Linaria/ 40 L/ 9 Julio.

897. Linaria 42 L.

898. Martinia annua L.

899. Class XIV Didinamia Ord Gimnosper,a. / Scrophularia Aquatica/ Linn. Tom 4º. pagª. 782 / Escrofularia Aquatica.

900. Scrofularia auriculata.

901. *Scrofularia/ Frutescens/Cabrera*. [Otra etiqueta dice]: *Scrofularia canina/ Entrena*.
902. *Scrofularia Canina L./ Entrena*.
903. *Scrophulariae Species*.
904. *Digitalis Purpurea L/Entrena*.
905. *Digitalis/obscura / W/Crujia usase para / labar las heridas y llagas á las bestias*.
906. *Digitalis*
907. *Erino africano ó triste*.
908. *Orobanche maior*.
909. *Orobanche ramosa L./ Entrena*. [Otra etiqueta dice]: *Orobanche species*.
910. *Ruellia Paniculata / Lin/ C in R H M*.
911. *Vitex (Agnus-castus) Varietas α. / Pract. B. de Lin. pr. Patau tº. 4º. 898 / Vitex latiore folio. T.I.R./ H. 603. F. Española. tº. 6º. pª. 476./ Vitex. Lag. 88. C Bahuin./ comm. Mat. sup. Diosc. pª. 173./ Agnus Castus Officinarum./ Swert. florileg. lib. 2º. fol. 43./ Se cria este Arbusto en las / orillas y en Ysletas del Guadalqui-/vir en Cordoba y se cultiba tam-/bien pr. algunos curiosos. Crece á / la altura de un Hombre y flore-/ce en el Verano*.
912. *Class XIV Didinamia Ordo/ Angiospermia/ Vitex Agnus Castus / Linn. Tom. 4º. pagª. 898 / Vitex Agno Casto (vulgo) Sauzgatillo*.
913. *Acanthus Mollis L / Entrena*.
914. *Acanthus / mollis*.
915. [*Acanthus mollis*].

## CLASE XV

916. *Rapistrum Rugosum. Cavans*.
917. *Miagram hispanicum/ vespere lugubri*.
918. *Myagram hispanicum/ Cuesta de las hermitas/ 14 de Mayo de 1817*.
919. *Miagram perfoliatum*.
920. *Myagram/ perfoliatum*.
921. *Rapistrum paniculatum*.
922. *Myagram panniculatum/ W./ Rapistrum panniculatum/ Cabanilles*.
923. *Sierra del agua/ Subularia/ alpina. [tachado Biscutela apu-*

la/ W.J. /Convento de Sn. Agustin/ Al Iltmo. Sor. Dn. Fr. José de/ Jesus Muñoz, Obispo electo de/ Salamanca en/ Cordova.

924. Lo mismo qe. la anterior/ A la entrada del 27 L / Encebrico á los Malojares para/ bajar á las fabricas 18 de Marzo/ Draba? ciliaris.

925. *Draba alpina*/ *Draba*.

926. *Draba verna* W./ *petalis bifidis stigmatate sesili/ foliis oblongis, acuminatis/ subserratis subhirtis scapo nudo/ fuente de la loba./ 30 Marzo.*

927. *Draba/ cespitosa/ apestañosa.*

928. *Draba contorta/ Decandolle.*

929. *Lepidium petreum* W./ *foliis pinnatis: radicalibus/ ovato lanceolatis caulinis/ linearibus. 29 Marzo.*

930. *Tetradinamia Siliculosa./ G./ Lepidium.*

931. *Lepidium Latifolium.*

932. *Lepidium / sufruticosum/ dos variedades?*

933. *Thlaspi (arvense) siliculis orbiculatis,/ foliis oblongis dentatis glabris. Pract. B./ de Lin. pr. Palau tom. 5º pag. 37 / Thlaspi arvense, siliquis latis / T. Inst. R. H. 212. F. Esp. tom. 6º. 371./ Thlaspi latius. Dod. pempt 712./ Thlaspi iij C. Bauhin. comment./ Matthiol. sup. Diosc. pag. 427./ Esta planta se cria en España,/ y en Cordoba se cultiba en el Jardin de/ la Alameda, y tambien yo la he cul-/tizado, y remitido semilla de ella al/ Jardin Botanico de Sevilla. Es annua/ y florece en Abril y Mayo.*

934. *Thlaspi campestre/ Caban.*

935. *Thlaspi perfoliatum/ W.*

936. *Thlaspi -bursa pastoris* W./ *foliis radicalibus pinnatifidis. Siles. 28 de Marzo.*

937. *Thlaspi vursa pasto-/ris.*

938. *Thlaspi de fruto con hastitas.*

939. *Cochlearia (Officinalis) foliis radicalibus cordato-subrotundis, cau-/linis oblongis subsinuatis. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 5º. pag. 44 / Cochlearia folio subrotundo T. I. R. H. 215. F. Esp. tº. 4º. 372./ Casp. Bauhin. com. Math. sup. Diosc. 380.=Cochlearia. Dod. p. 594 / Esta planta se cultiba en Cordoba en varias partes; yo la / he cultivado muchos años; se cria en España en los montes Py-/rineos de Cataluña, en los de Jaca, y de Vizcaya. Quer./ es annua y algunas vezes se hace perenne, florece en los / meses de Marzo y Abril.*

940. Class. Decima quinta. Tetra/ dinamia Ordo Siliculosa/ Cochlearia Officinalis/ Linn. pr. Pal. tom 5º. pagª./ 44. Cochlearia officinal/ Este esqueleto lo obtube/ del jardin del Padre Mro, qe/ la cultiva como tambien en/ el de Casa; se usa en la me-/dicina pª varias enfermedades pero/ donde especialmte. se desem-/buelben sus propiedades es en / el Alcohol llamado de su nom-/bre, pues qe. este es el anti-es-/corbutico mas poderoso de los qe / [Reverso]: se componen de ella.

941. *Cochlearia* (Armoracia) foliis radicalibus lanceo-/latis crenatis, caulinis incis. P. B. de L. pr. P. tº. 5'. 47./ *Cochlearia* folio cubitali. T. Inst. R. H 215 / Quer Flora Española tº. 4º. pag. 379./ *Raphanus magnus*. Dod. pempt. 678 / *Raphanus rusticanus sive vulgaris*. C. B./ comm. Matth. sup. Diosc. 350 / Se cria en varias ps. de España: vease á Qr./ se cultiva en Cordoba en mi Jardin y otras ps. remi-/ti en 1794 una planta viva al Botanico de Sevilla/ es perenne su raiz rastrera, y fe. en Mayo y Junio

942. *Tetradinamia Siliculosa* /G / *Cochlearia*.

943. *Cochlearia Draba* W./ Siles. 28 de Marzo.

944. *Cochlearia*/ como *Draba*/ Madd. y Mayo 5 de 18.

945. *Cochlearia sativa*/ mayo vespere fonti / Viznagar.

946. [*Iberis semperflorens*].

947. Classis Decima quinta *Tetradinamia Ordo*/ *Siliculose*/ *Yberis Semper-florens*/ Linneo pr. Palau tº. 5º. pª. 49 / *Yberide* siempre en flor (bulgo) / Carraspique —en Cordoba mi-/rabeles de flor./ *Yberis semper-florens*/ Cabanilles Descriptio plantar. / pagª. 414 plant. 937= Este sabio/ y Benemerito Botanico, apre-/ciado no solo de su Nacion si-/no de todas las que lo han / conocido ha colocado toda / esta Clase en su Hexan-/dria sin hacer caso/ de la diferencia de Estambres/ Se cultiva en Cordova/ en muchos jardines pr. la mul-/tiplicidad de sus flores y su / perpetua verdura.

948. *Iberis Sempervi-/rens* / *Gibraltarica*?

949. *Iberis sempervirens*./ W./ Varietas γ.

950. *Iberis* de oja/ redonda.

951. *Iberis* / *saxatilis*/ W.

952. Dos *Iberis*/ la 1ª. *Saxatilis*.

953. *Iberis umbellata* Cavs.

954. *Iberis* [tachado *saxatilis*.] *linifolia* W.

955. *Iberis linifolia*/ W.

956. *Iberis Thlapsi*.
957. *Ibris ciliata* W.
958. [*Iberis ciliata*].
959. *Iberis pinnada*.
960. *Alisum/ spinosum*.
961. *Alyssum Saxatile* W.
962. *Alisum Incanum*.
963. *Alisum/ incanum*.
964. *Alisum/ calicinum/ W.*
965. *Aliso montano*.
966. [*Alysum campestris* L.]
967. *Alyssum sinuatum/ W.*
968. *Alyssum sinuatum/ W.*
969. *Vesicaria utriculata, Decand./ Alyssum utriculatum L/ C*  
in R H M.
970. *Alisum/ serpyllifolium/ W.*
971. *Alysum/ Atlanticum* W. [tachado maritimum].
972. *Clypeola Jonthaspi. W./ 20 de Marzo Siles.*
973. *Clypeola (Maritima) perennis,/ siliculis bilocularibus ova-*  
*tis dis-/permis. P. Bot. de Lin. pr. P. tº. 5º. 66 / Alysson maritimum*  
*T. Inst./ R. Herv. 217. Fl. Esp. tº. 2º. pag. 277./ Thlaspi Cemtunculi*  
*angusto fo-/lio. Lobel. Icon, 215./ Esta especie se cria en los Mu-/ros*  
*viejos, y Muralla de la Mari-/na de Barcelona, y en otros lugares/ de*  
*ambos Mares, y tambien en ls./ laderas del Piul de Ribas, y en la/*  
*Marina de Ayamonte, en Andalu-/cia entre las piedras. Quer./ Coji*  
*este esqueleto en el Jn. de Sª.*
974. *Clypeola maritima.*
975. *Biscutela auriculata/W.*
976. [*Biscutela Auriculata*].
977. *Biscutella (auriculata) calycibus/ nectario untrinque gibbis,*  
*silicu-/lis in stylum coeuntibus. Pract. B./ de Lin. pr. Palau tº. 5º.*  
*pag. 70./ Thlaspidium hirtum, calyce/ floris auriculato. T. Inst. R. H./*  
*214. Flora Española tº. 6º. p. 374./ Esta planta se cria en muchs./*  
*partes del circuito de Cordoba en/ tierras de labor, como en las im-/*  
*mediatas al caño Bazan, en las/ que median entre la Victoria y/ la*  
*Alameda y otras. Es yerba/ anual y florece en Abril.*
978. *Biscutela /lirata* W.
979. *Biscutela levigata [tachado Thaderiana] / [tachado sp. no-*  
*va]. W. /nisi sit varietas laevigatae.*

980. [Tlaspi campestre].
981. Lunaria/ annua W./ cultivada.
982. Binunias Kakile /Cabrera.
983. Crambe hispanica/W.
984. Cardamine hirsuta.
985. Nasturtium/ Aquaticum/ Vulgo berros/ Cabrera. [Otra etiqueta dice]: Merece observarse / esta planta conocida/ con el nombre de Berraza/ en Cordoba.
986. Sisymbrium Polyceratum. Cav.
987. [Sisymbrium catholicum].
988. Erisimo/ oficinale.
989. Erisimum precox/W.
990. Class. XV Tetradinamia/ Erisimum vulgare.
991. Erisimum hieracifolium. W./ 15/ tetradinamia.
992. Cheiranto /alpino.
993. *Cheiranthus* (Cheiri) foliis lanceolatis/ acutis glabris, ramis angulatis, caule fru-/ticoso. Pract. B. de Lin. pr Palau. t<sup>o</sup>. 5<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>. 122./ *Leucoium* luteum vulgare. T. Inst./ R. H. 221. Flora Española tom, 5<sup>o</sup>. pag. 329./ *Leucoium* luteum. Dod. pempt. 160./ *Leucoium*. Lag. in Diosc. 352./ *Leucoium* aureum. C. Bauhin. com./ Matthiol. sup. Diosc. 632./ vulgo: Aleli pajizo ó amarillo./ Esta planta se cria en las peñas de/ la costa del mar, y en los muros de Cata-/luña. Se cultiva en los Jardines, y casas/ particulares de Cordoba: es perenne y flo-/rece por Abril y Mayo: crece de tres á qu-/atro pies: suele variar con la flor doble.
994. *Cheiranthus* Chius.
995. Class. XV Tetradinamia Ord Siliquosa/ *Cheiranthus* Incanus/ Linn. tom. 5<sup>o</sup>. pag<sup>a</sup>. 125 /Cheiranto Blanquecino (vulgo) Alheli.
996. *Cheiranthus*/tristis.
997. [*Cheiranthus* tristis].
998. [tachado *Dentaria*?] L. 2<sup>o</sup>./ Es un *Cheiranthus* /*Erisimum* angustifolium/W./9 de Julio /Canbron.
999. *Cheirantus* contortuplicatus/W.
1000. *Hesperis* *Cheirantus* Sp. N./ Cabrera. [Falta el ejemplar].
1001. *Arabis* thaliana Cavs./ Apesar de no tener mas / que 4 estambres y no /indicarse la anomalia en Lineo/ me parece es esta especie.
1002. *Arabis* con oja/ de margarita

1003. [Turrítis glabra].
1004. Turrítis alpina.
1005. Turrítis' species nova.
1006. Brassica Arvensis, L.
1007. Brassica Arvensis.
1008. 16. H./ Brassica arvensis/ Lin./ cheirantus amplexi-/caulis Lag.
1009. Brassica alpina.
1010. Brassica Pinatifida W./ [tachado]: Eruca Grandiflora Cava / Brassica Eruca L.]
1011. Brassica/ pinnatifida/W.
1012. Sinapis Arvensis. L.
1013. *Sinapis* (arvensis) siliquis multangulis toroso-turgi/disrotro ancipite longioribus. P. B. de L. pr. P. tº. 5º. pag. 158 / *Raphanistrum* segetum, flore luteo, vel palido. T./ Inst. R. Herb. 230. Flora Española tº. 6º. pag. 178./ Esta especie se cria en las margenes de las tierras de / labor del circuito de Cordoba./ Es annua y florece en los meses de Abril y Ma-/yo, la llaman vulgarmente como á las demás Xara-/mago.
1014. Sinapis alba/W.
1015. Sinapis erucoídes.
1016. Sinapis erucoídes.
1017. Sinapis hispanica.
1018. Sinapis Hispanica. L.
1019. Sinapis radicata/W./ an virgata Cabanilles?
1020. Raphanus/ erucoídes.
1021. Tetradymania. Siliquosa./ G / Cleome./ *Cleome* (Pentaphylla) floribus gy-/nandris, foliis quinatis, caule in-/ermi. P. B. de Lin. pr. Pal. tº. 5º. 169 / Habita en las Indias. Pal. loc. cit./ Es planta annua./ Vi esta especie cultivada en/ el Jardin Botánico de Sevilla en/ Septiembre de mil setecientos noben-/ta y tres; donde coxi este esqueleto.
1022. Cleome violacea L/ Entrena.
1023. Cleome violacea /W
1024. Cleome Violacea/Lin Cabrera.
1025. Clasis Decima-quarta, Ordo/Siliquosa/Cleome Violacea/ Linneo pr. Palau tº. 5º. / p.ª 175 Cleome violada se/ cogio en la Sierra de Cordova/ en Junº. de 1817 Linneo la circunscribe a Portugal.

## CLASE XVI

1026. *Pelargonium Capitatum*/ Cavs / Entrena.
1027. *Geranium odoratisimum*.
1028. Class XVI Monadelphia Ordo / Decandria/ *Geranium Odoratisimum*/ Linn Tom. 5º. Pagª. 215/ Geranio muy oloroso.
1029. *Geranium/ cicutarium*.
1030. *Erodium/ Cicutarium/W*.
1031. *Geranium Malacoides*.
1032. *Geranium Pyrenaicum L./ vars. flore albo./ C in R H M*.
1033. *Geranium [tachado Columbinum] / W./ tuberosum*.
1034. *Geranium robertianum/W*.
1035. Class. Decima-sexta Monadelphia Ordo/ Decandria/ *Geranium Robertia/ num*= Linneo pr. Palau/ tº. Vº. pª. 235= Geranio/ de Rovertó./ Se cria entre los/ empedrados y paredes/ de Cordova y en toda / su campiña; este/ Esqueleto lo cogi en/ Sn. Agustin. /Vir- tudes/ Es planta anodina/ expelente vulneraria/ y qe. retira la leche &ª.
1036. *Geranium (Robertianum) pedunculis bifloris / calycibus pilosis decemangulatis. Pract. Bot. de/ Lin. pr. Pal. tº 5º. pag. 235./ Geranium Robertianum primum. T. Inst./ R H. 268. Quer Flora Espª. tº. 5º. pag. 158./ Geranium primum. Lag. 347. =IV. C. B. com. 622./ Se cria en Cordoba en Bosques humedos de la sierra/ y se halla en el arroyo Pedroches: es annua fe. en Abril.*
1037. Geranio mancha-/do.
1038. *Geranium lucidum*.
1039. *Geranium lucidum/ pulcra varietas/ colore purpureo totius plantae*.
1040. *Geranium lucidum/ W*.
1041. *Geranium Mole*.
1042. *Geranium molle/ W*.
1043. *Geranium / Carolinianum / W*.
1044. *Erodium / praecox*.
1045. *Geranium/ Aconitifolium/ [tachado silvaticum] / W*.
1046. [Geranii sp.]
1047. [Geranii species.]
1048. *Sida (Abutilon) foliis subro-/ tundo-cordatis indivisis, pe- dun- culis folio brevioribus, capsulis/ multifolcularibus, corniculis bi- fidis. Lin. Sp. P. pr. pu. tº. 5º. 264./ Abutilon. Dod. pempt. 656.*

et/ Tourn. Inst. R. Herb. 99. Flora Español-/la tomo 2°. p<sup>a</sup> 152./ Esta planta habita en las Indias,/ en Suecia y Siberia. L. es annual, flore-/ce por Julio y Agosto / En Cordoba la he cultivado yo: produ-/ce el tallo sencillo y crece á la altura de/ tres ó quatro pies.

1049. *Sida disticha* Cav / C in R H M.  
 1050. *Sida Dilleniana* W./ *Anoda Dilleniana* Caban.  
 1051. *Althea Oficinalis*.  
 1052. *Althaea Cannabina*.  
 1053. *Althea Cannabina*.  
 1054. *Althea hirsuta*/ W.  
 1055. *Althea hirsuta*/ W.  
 1056. *Althea*/ de oja aspera.  
 1057. *Alcea* (*Rosea*) *foliis sinuato-an-/ gulosis*. Pract. B. de L. pr. P. t°. 5°. 273./ *Malva rosea*, folio subrotun-/do. T. I. R. H. 94 F. E. t°. 5°. p<sup>a</sup>. 395./ *Malva hortensis*. Dod. pempt./ 652./ *Malva Rosea flore pleno*. C./ B. commet. Mat. sup. Diosc. p<sup>a</sup>. 359./ *Malva Rosea duplex purpurea* / Swert. et *Rosa malvea ejusdem*. flo-/rileg. lib. 2°. fol. 36./ Estas dos que pone por especi-/es distintas Swertio, y el sinonimo/ precedente pertenecen á las Varie-/dades de esta especie, cuyo numero/ es mui crecido. En Cordoba se cul-/tiban en los Jardines, y casas par-/ticulares hasta diez ó doze dellas/ por su asombrosa plenitud, y rara/ belleza de coloridos, pues las hai/ de color de fuego, carmesies, blancas,/ color de Rosa, pajizas, Anteadas,/ Jaspeadas de carmesi y blanco, de/ color de cobre sumamente oscuras/ que parecen casi negras, y de to-/dos estos colores en diversas gradu-/aciones. Son sus Raices pe-/rennes, florecen por Mayo, Ju-/nio, y Julio, crecen hasta tres/ varas de alto: las llaman Vulgar-/mente *Malvaslocas*.

1058. *Malva Spicata* L./ C in R H M.  
 1059. *Malva silvestre*.  
 1060. *Malva Hispanica*. C.  
 1061. *Malva hispanica*.  
 1062. *Malva Hispanica*/ Entrena  
 1063. *Malvae species*.  
 1064. *Lavatera Arvorecens*/ *Malva arborea*.  
 1065. *Lavatera olvia*/ Cabrera.  
 1066. *Labatera trimestris*.  
 1067. *Lavatera trimestris*. variets *α*. L.

1068. Class. XVI Monadelphia Ord. Poliandria/ Lavathera Trimestris/ Linn. Tom. 5º. pag.ª 293/ Lavatera Tremesina.

1069. Anoda acerifolia. cav.

1070. Hibiscus siriacus (cavans.)

1071. *Hibiscus* (Syriacus) foliis cune-/iformi-ovatis superne inciso-ser-/rañis, caule arboreo. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau tº. 5º. pag. 309./ *Ketmia* Syrorum quibus-/ dam. T. I. R. H. 99. F. E. tº. 5º. 291./ Habita en Siria y Carniola. P./ Crece como arbol, se culti-/ ba en varias partes de España:/ lo vi en 1793 en el Jardin de Sn./ Francisco casa grande de Sevilla/ en donde coxi este esqueleto./ florece en Agosto y Septiembre.

1072. *Hibiscus* (Trionum) foliis triparti-/tis incisís, calycibus inflatis. Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau tº. 5º. pag. 318./ *Ketmia* vesicaria, vulgaris. T./ Inst. R. H. 101. Flora Esp. tº. 5º. 290./ *Alcea* vesicaria C. B. P. 317./ Dod. pempt. 657./ *Hypecoum*. Casp. Bauhin / com. Mat. sup. Diosc. 7 49 Lag. 416./ Se cria esta planta en España/ cerca de Barcelona, en el sitio que/ llaman la Granota. Quer / Crece de pie y medio: florece en/ Mayo y Junio. es annua/ Traxe este es- queleto de Sevilla/ año de 1793.

## CLASE XVII

1073. Diadelphia. Hexandria./ G. / Fumaria./ Fumaria. Enneaphilla.

1074. Fumaria officinalis. L.

1075. Fumaria oficinalis.

1076. Fumaria Capreolata W.

1077. *Fumaria* (Spicata) pericarpis mo-/nospermis spicatis, cau- le erecto, foliolis/ filiformibus. Pract. Bot. de Lin. por/ Palau tº. 5º. pag. 354./ Fumaria minor, tenuifolia, cau-/liculis surrectis, flore hilari purpu-/ra rubente. T. I. R. H. 422. Flora Es-/pañola tº. 5º. pag. 137./ Se cria esta planta en las mar-/genes de los campos de labor del cir-/cuito de Cordoba: en annua y flo-/rece en los meses de Abril y Mayo.

1078. Fumaria Spicata. L.

1079. Fumaria Parviflora. W./ F. spicata varietas  $\beta$  L.

1080. Fumaria/ [tachado longifolia] / Grassifolia.

1081. Fumaria/ crassifolia W./ Castillo de Segura/ en las rocas 3 de Abril.

1082. *Fumaria* ¿specie Nova?
1083. *Polygala amara* [tachado lupulina] / W. / [varietas flore coeruleo tachado]
1084. *Poligala amarga*.
1085. 3/*Polygala vulgaris*/17. H.
1086. *Polygala vulgaris* [tachado monspeliaca] / W.
1087. *Polygala* [tachado Senega? vulgaris] / Casas de la Nogueira / 16 de Junio 1812. / *Polygala amara* / segun la Gasca.
1088. *Polygala vulgaris*. L.
1089. *Polygala monspeliaca* / W.
1090. *Poligala de Montpellier*.
1091. *Poligala?* / *Monspelia* / de Lagasca / C. de Amo. 21 de Julio.
1092. *Polygala maior* / W.
1093. *Polygala rosea* / W.
1094. *Polygala extraxilaris*. / Sp. nova. de Lagasca.
1095. *Polygala/extraxilaris* / Lagasca.
1096. *Poligala*.
1097. *Spartium Junceum*.
1098. *Spartium* [tachado horridum] / W / *Scorpius?*
1099. *Spartium* / *angulatum*.
1100. *Spartium Patens*. L.
1101. *Spartium* / *Scoparium* / W.
1102. *Spartium* / *Scoparium* / Cabrera.
1103. *Spartium spinosum*.
1104. *Spartium?* [Otra etiqueta dice]: 10 *Spartium* H.
1105. 49. C. / *Spartium* / vide. Desf.
1106. *Genista tridentata* L.
1107. *Genista* / *tinctoria*.
1108. *Genista tinctoria*.
1109. *Genista* / *tinctoria* / W.
1110. *Genista Tinctoria* / Palau t. 5. p. 406. [Otra etiqueta dice]: *Genista florida*. L. / *Entrena*.
1111. *Atoliaga Genista* / *hispanica?* / cada flor tiene 3 bracteas / que parecen formar un caliz / exterior / antes me parecio / *Spartium spinosum*.
1112. *Genista lusitanica*
1113. *Genista lusitanica?* / W.
1114. *Genista lusitanica* / parvo flore Luteo. / T. 643. / Clase 22. / Seccion primera.

1115. [Sarothamnus].  
 1116. *Ulex europaeus*/ vulgo-Aulaga.  
 1117. *Amorfa fruticosa*.  
 1118. Clas. XVII Diadelphia ord Decandria/ *Amorpha Fruticosa* /Linneo Tomo V Pag<sup>a</sup>. 427/*Amorpha Fruticosa*.  
 1119. *Ononis*? 45. H./repens/Peña del Cambron 9 Julio/en Siles. [Otra etiqueta dice]: *Ononis Repens* L. Entrena.  
 1120. *Ononis Pubescens*. L.  
 1121. *Ononis* / pubescens/W.  
 1122. 49 / L./ *Ononis* ¿pubescens? [Otra etiqueta dice]: ¿*Ononis Cenisia*? / Entrena/ La pubescens es vellosa.  
 1123. *Ononis viscosa* Cabrera.  
 1124. *Ononis aragonensis* /W.  
 1125. *Ononis aragonensis* /W.  
 1126. *Ononis Capitata* W?/ Como no lo tengo á la Vta. dudo /si sera esa especie ú otra cercana. /Observe Vmd en un exemplar / que va en fruto el torcido casi espiral /de la Legumbre: todas las señales /me parecen de *Ononis*: es planta /rarísima y se parece á una determi- /nada con este nombre aunque no se la /flor de que color era.  
 1127. Muy Rara / *Ononis compresa*. Cavs.  
 1128. [*Ononis*].  
 1129. *Anthyllis* (*Tetraphylla*) herbacea, foliis quaterno-pinna- /tis, floribus lateralibus. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau t<sup>o</sup>. 5<sup>o</sup>. 458. / *Vulneraria* pentaphyllos T. Inst. R. Herb. 391./Quer Flora Española t<sup>o</sup>. 6<sup>o</sup>. pag. 497. / Esta planta se cria en terrenos aridos e incultos/ cerca de Cordoba, en los paredones del arroyo del moro ca- /mino de la Arruyzafa, y camino de la Alameda endere- /cho de la Huerta Balladares &c. Es annua, crece ten- /dida, y florece en Abril y Mayo.  
 1130. [*Anthyllis tetraphylla*.]  
 1131. *Anthyllis tetrafilla* /Cabrera.  
 1132. *Anthyllis*/ *vulneraria* / Cabrera.  
 1133. *Anthyllis* /*vulneraria*/ W.  
 1134. *Anthyllis montana* /W.  
 1135. *Anthyllis montana* / 43 C./Cambron/ 9 de Julio. [Tachado *Hedysarum coronarium*].  
 1136. *Anthyllis Lotoides*.  
 1137. *Anthyllis* (*Barba-Jobis*) fruticosa, / foliis pinnatis aequali- /bus tomento- /sis, floribus capitatis. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau t<sup>o</sup>. 5<sup>o</sup>. pag. 463./Habita en las peñas de Ita- /lia, de Oriente y de España.

Pal./ Es perenne: Arbusto que cre-/ce á la altura de un hombre/poco mas ó menos, mui bonito,/ como lo vi en el Jardin Bota-/nico de Sevilla, en 1793, de donde /traxo este esqueleto.

1138. *Anthilis erinacea*.

1139. *Lupinus Angustifolius*.

1140. Clas. Decima septima Diadel-/phia Ord. Decandria=/? An Dolichos Lablab/ Linn. por Pal. tom. 5º. pagª 483/ Dolico Lablab o Fasol de exipto pr. / Tournefort. /Esta planta se cultiva en cordo/va en casi todos los jardines con/ el nombre de enredo de Fran-/cia y forman con ella vistosos/ cenadores; este Esqueleto lo tu-/be del guerto de Casa.

1141. ¿*Pisum* [tachado *Arvense*] W./ *P. Sativum*.

1142. *Pisum arvense*.

1143. *Lathirus/ Aphaca /W./ Cistus*.

1144. *Lathirus cicera*

1145. *Lathyrus Cicera*. W. [Otra etiqueta dice]: pª el herba/rio de Vmd. [Otra etiqueta]: *Citisus argenteus/W*.

1146. *Lathirus / Cicera /W*.

1147. *Lathirus angulatus /W*.

1148. Classis Decima septima Diadelphia/ Ordo Decandria/ *Lathirus Odoratus?* Linn. por P. Tom. 5. pagª. 52 / *Lathiro Oloroso / (vulgo) /Guisante doble/ o Caracolas./ Se cultiva en casi/ todos los jardines pr./ sus ermosas flores,/ y su tallo voluble pro-/porcionado para for/mar Cenadores.*

1149. *Lathyrus (Odoratus) pendunculis bifloris, cirrhis diphylis, foliolis ovato-oblongis, leguminibus hirsutis*. Pract. Botanic./ de Lin. pr. Palau tom. 5º. pag. 520./ Esta planta se cultiva en Cordoba en los Jardines/ y casas particulares; con el nombre de *Caracolas*: es/ yerba anual, y florece en los meses de Mayo y Ju-/nio.

1150. *Lathyrus tingitanus, L.*

1151. *Lathirus/ clymenum/W*.

1152. *Lathirus pratensis /Lathirus/ 13-I/ Ce 17.*

1153. *Lathyrus /latifolius/W*.

1154. *Lathyrus [tachado cicera] /setifolius/ Ce 17.*

1155. *Lathirus*.

1156. *Lathiro*.

1157. *Vicia Craca/W*.

1158. *Vicia Cracca*.

1159. *Vicia como Onobrichis/ o Latiro de pelo aspero.*

1160. *Vicia onobrichioides* [tachado *onobrichioides* W] /an/ ¿An [tachado *tenuifolia*?].
1161. *Vicia como* /*onobrichis*.
1162. *Vicia Nissoliana*. L.
1163. *Vicia Biennis* L?/V. *Nissoliana* L.?
1164. *Vicia Sativa*. L.
1165. *Vicia Sativa* /W.
1166. *Vicia sativa*.
1167. *Vicia Lutea*. L.
1168. *Vicia Lutea* L/Entrena. [Otra etiqueta dice]: [tachado *Orob-  
bus* ¿*vernus*?] 44/C./*Lathirus/Vicia* sp. n.
1169. *Vicia Hibrida* L.
1170. *Vicia Peregrina*. L.
1171. *Vicia bithynica* /W.
1172. *Vicia narbonensis*. L.
1173. *Vicia* [tachado *Pisiforme*]. W./*villosa*.
1174. ¿*Ervum Lens*?/ la he cojido en un pe/dazo de tierra sem-  
brado/ todo de esto.
1175. *Citissus austriacus* /W.
1176. *Citissus/ argenteus* /W.
1177. *Citissus argenteus* / Palau. t. 5. pag. 554./ 52 L.
1178. *Citissus argenteus*.
1179. *Citissus argenteus*.
1180. 13 *Cytissus*? H.
1181. *Colutea (Arborecens) arborea, foliolis/ obcordatis*, P. B. de L. pr. P. tom. 5º. pag. 564./ *Colutea vesicaria*: T. Inst. R. H./ 649. Flora Española tom: 4º. pag. 398./ *Colutea*. Dod. pempt: 784. Casp / Bahuin. com. Mat. sup. Diosc. pag. 572./ Lagun. in Diosc. pag. 419./ vulgo: Espantalobos./ Se cria este Arbolito en Cordoba/ en los arroyos de los Lagares de Sierra/ morena, y cerca de la Ciudad se halla/ en el arroyo de Pedroches, y en el de la/ Palomera. Crece muy poblado de ra-/mas de seis á siete pies, se cubre de flo-/res amarillas en la Primavera con abunda [Reverso]: *No es la Colutea/ Coronilla Glauca* L/ Entrena. Ce 17.
1182. *Colutea arborecens*.
1183. Class XVII Diadelphia ord. Decandria/ *Colutea Arborecens* / Linn. Tomo V pagª. 564/. *Colutea Arborecens* / (vulgo) espantalobos.

1184. *Coronilla* (Juncea) fruticosa, foliis qui-/natis ternatisque, lineari-lanceolatis/ subcarnosis obtusis. P. B. de L. pr. Palau/ tom. 5º. pª. 571./ *Coronilla* caule Genistae fungoso. Tourn. I. R. Herv. 650. Flora Espa-ñola tom 5º. pª. 5./ Se cria esta especie á una le-/gua de Cordoba, en Sierra-morena./ en territorio de los Lagares de Ca-seres/ y torre-doria. Crece este Arbusto de/ quatro pies de alto, pe-renne, florece/ en los Meses de Abril, y Mayo.

1185. *Coronilla Juncea*

1186. *Coronilla juncea*/ Palau t. 5. p. 571.

1187. *Ornithopus perpusillus* / varie.s  $\beta$  L.

1188. *Ornithopus Perpusillus*/ Cabrera/ S. Lucar.

1189. *Ornithopus compresus*.

1190. *Ornithopus Compresus*. L.

1191. *Ornithopus* /Cabrera.

1192. *Lathiro* de pelo/ aspero.

1193. *Lathiro* de hoja ancha.

1194. *Lathirus*/ de ojas varias?

1195. *Lathirus Angustifolio*/ Cabrera.

1196. *Lathyrus tenuifolio*. W./ Este lo mandé con/ otro nombre especifico/ y lo he corregido pr. W.

1197. *Vicia*/ amphicarpa/W/ vi la fructificacion / subterranea.

1198. *Vicia angustifolia*/W.

1199. *Coronilla* de color garzo.

1200. *Coronilla Balearica*/ Decandolle/ C in R. H M

1201. *Ornithopus* (Scorpioides) foliis ternatis subsessilibus,/ impari maximo. Pract. Bot de Lin. pr. Palau tº. 5º. pª. 579./ *Ornitho-podium* Portulacae folio T. Inst. R. H. 400./ Quer Flora Española tº. 6º. pag. 32./ *Scorpioides*. Lag. 500. C. B. com. Matth. 895./ *Scor-pioides* Matthioli. Dod. pempt. 71./ Se cria en las tierras de labor del circuito de Cordo-/ba, es annua y florece en Abril y Mayo.

1202. *Ornithopus Scorpioides*. L.

1203. *Ornithopus* / Scorpioides/W.

1204. *Ornithopus scorpioides*/ Palau. t. 5. p. 579.

1205. *Hypocrepis comosa*/ Palau t. 5. p. 582.

1206. *Hypocrepis Unisiliculosa*/Palau. t. 5. p. 581.

1207. *Hypocrepis annua*. Lag./ [tachado Multisilicuosa].

1208. *Scorpiurus vermiculata*. L.

1209. Class XVII Diadelphia Ord. Decandria/ *Scorpiurus Muri-cata*/ Linn. Tom. 5º. pagª. 584/ Escorpiuro con puntitas.

1210. *Scorpiurus Muricata*.
1211. *Scorpiurus sulcata*.
1212. *Scorpiurus Falcata*/ Cabrera. [Otra etiqueta dice]: *Scorpioides subvillosis*/ó/ *S. Sulcata* L/ Entrena.
1213. *Scorpiurus (subvillosa) pedunculis sub-/quadrifloris leguminibus extrorsum/ spinis confertis acutis*. Palau. t. 5./p 585.
1214. *Hedysarum*.
1215. *Hedysarum Alpinum* [Otra etiqueta dice]: *Hedysarum Alpina*. L.
1216. *Edisarum/ coronarium/ Sulla / Cabrera*.
1217. *Hedysarum /coronarium/W. Onobrichis crista Galli?*/D.C.
1218. *Hedysarum / onobrichis*.
1219. *Edisarum/ Crista Galli*.
1220. *Galega (officinalis) legumini-/bus strictis erectis, foliolis lan-/ceolatis striatis nudis*. Pract. B./de Lin. pr. Palau tom. 5°. p<sup>a</sup>. 633. /*Galega vulgaris, floribus/ coeruleis*. T.I.R.H. 398. F. E. t°. 5°. 143./ *Ruta capraria*. Lag. in Diosc./ 371. C. B. com. Mat. sup. Diosc. p<sup>a</sup>. 836./ Esta planta se cria ocho leguas/ de Cordoba, en el Puerto Calatrabe-/ño, camino del Alcarrazejo, y en /Cordoba la cultiban en la Alameda/y yo. Es perenne, crece de 6 ps. fe pr. M°.
1221. *Phaca Boetica*. L.
1222. *Phaca Boetica*.
1223. *Phaca (Boetica) caulescens erecta / pilosa, leguminibus tereti-cimbi-/formibus*, Lin. Sp. P. pr. pu t°. 5°. 639./*Astragaloides Lusitanica* T.I/R.H. 399. Fl. Esp. t°. 3°. p<sup>a</sup>. 157./ vulgo Garbanzera Garbanzuelo y/ Garbanzillo./ Esta Planta se cria en la Sie-/rra-morena de Cordoba: en los Ce-/rros montuosos entre le monte mismo/ como en el cerro de Pino-gordo, y to-/dos aquellos inmediatos: en el Lagar /de Caseres en el de Torre-doria y sus/ contornos, y demas partes de la Sierra/ es perenne y florece en Abril y Mayo.
1224. *Astragalus Cristianus (L.) /Phaca species mihi videtur/an betica?*
1225. *Astragalo/ como garbanzo*.
1226. *Astragalo/ con oja de regalicia*.
1227. *Astragalus Glicifilus*.
1228. *Astragalo/ganchoso*.
1229. *Astragalus hamosus*.
1230. *Astragalus: Hamosus*. Cavs.

1231. *Astragalus hamosus*/ W.  
 1232. *Astragalus hamosus*.  
 1233. *Astragalus Boeticus* /Cabrera.  
 1234. *Astragalus Penta*/glotis.  
 1235. *Astragalus Pentaglotis*/ Palau t. 5. p. 656/45. C.  
 1236. *Astragalus epiglottis*. 46 /C.  
 1237. *Astragalus Hipoglotis*. L.  
 1238. *Astragalus narbonensis* /W.  
 1239. *Astragalus [tachado incanus] macrorrhizos* Cav. /Palau 5. pag. 667.  
 1240. *Astragalus / fragiformis*/W.  
 1241. *Biserrula pelecinus*/ W.  
 1242. *Biserrula pellicinus*/ t. 5. p. 672 47 C.  
 1243. *Psoralea (Bituminosa) foliis omnibus ternatis, foliolis lanceolatis, petiolis laevibus. flo-ribus capitatis*, P. B. de L. pr P. tº. 5º. pª. 676./ *Trifolium betumen redolens*. T./Inst. R. H. 405 Flora Esp. tº. 6º. pª. 415./ *Trifolium bituminosum*. Dodon./pempt. 566./ *Trifolium Alphastites*. Lag. 341./Casp. Bauhin. com. Mat. sup. Diosc. 608./ Esta planta se cria con mucha / abundancia en las inmediaciones de /Cordoba, como en el caño Bazan, y/ en toda aquella parte de la Arrizafa/ y tambien en la Sierra en todas par-/tes. Es pe fle. en Julio. Crece de 5, á 6 ps.  
 1244. *Psoralea Bituminosa*/ (Cavans)  
 1245. *Psoralea bituminosa* L/L/ 50.  
 1246. *Psoralea Bituminosa* / Mayo 22.  
 1247. *Psoralea (Glandulosa) foliis/omnibus ternatis, foliolis lanceolatis, petiolis scabris, flori-/bus spicatis*. P. B. de L. pr. P. tº. 5º. 677 / *Barbajovis triphyla*, flo-/re ex coeruleo vario, vulgo-/ culén. Fevill. peru. 7. t. 3. F./Española tº. 3º. pª. 201 y 6º. 509 / Esta planta se cria en/ el Peru y se ha connaturali-/zado en nuestra España, se/ cultiva en Cordoba pr varios /curiosos: crece de ocho á diez/ pies en alto, flore. en Mayo, es pe. [Reverso]: *Psoralea (Glandulosa) foliis omnibus ternatis: foliolis ovato-/lanceolatis, spicis pedunculatis*.  
 1248. Class. XVII Diadelphia Ord Decandria/ *Psoralea Glandulosa?*/ Linn. Tom. Vº. pagª. 677.  
 1249. *Trifolium Melilotindicum* L./ Posée la legumbre de una sola se/milla, lo cual separa esta especie / de las otras de la 1.ª Division.

1250. *Trifolium* (*Melilotus officinalis*)/ leguminibus racemosis nudis disper-/mis rugosis acutis, caule erecto. Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau t°. 5°. pag. 686./ *Melilotus* *Officinarum* Ger-/maniae. T. Inst. R. H. 407. Flora / Española t°. 5°. pag. 415./ *Trifolium* odoratum, seu Me-/lilotus. Dod. pempt. 567./ Esta especie es mui comun en/ las campiñas de Cordoba, y se halla/ cerca de la ciudad á orillas del Rio./ la llaman vulgarmente *trebol*: es / annua y florece en la primavera.

1251. *Trifolium repens*/ Entrena.

1252. [*Trifolium cherleri*].

1253. *Trifolium* [tachado pratense] cherleri. L.

1254. *Trifolium*/ cherlerii/ W.

1255. *Trifolium* *Lapaceum* L.

1256. *Trifolium* *angustifolium*.

1257. *Trifolium*/ *angustifolium*.

1258. *Trifolium* (*stellatum*) spicis pilosis ovatis, calycibus patentibus, caule diffuso, foliolis obcordatis. Pract. Bot. de Lin./ por Palau t°. 5°. pag. 702 / *Trifolium* *stellatum*. T. Inst. R. Herb. 405./ Flora Española t°. 6°. pag. 419./ Esta especie se cria en sitios algo humedos de/ los campos de Cordoba, como el callejon de la Huerta de/ la Reyna &tc. es annua y florece en Abril y Mayo.

1259. *Trifolium* *scabrum*.

1260. *Trifolii* *Species*./ *spumosum*.

1261. *Trifolium* *species* / trif *resupinatum* L.

1262. *Trifolium* *fragiferum*.

1263. *Trifolii* *species*./ trif. *agrarium* L vel/ filiforme. [Otra etiqueta]: T. *Agrarium*/Entrena.

1264. *Trifolium* *agrarium*.

1265. *Trifolii* *especies*/ trifol. *boeticum* Lag.

1266. Class. XVII *Diadelphia* Ord. *Decandria*/ *Trifolii* *Species*?/ Linn. Tom. 5°. pag<sup>a</sup>. 683.

1267. 3°. Emparedada/ 1 de 8bre. de 815.

1268. *Lotus* *siliculosus*.

1269. *Lotus* (*tetragonolobus*) leguminibus soli-/tariis membranaceo-quadrangulis, brac-/teis ovatis. P. B. de L. pr. P. tom. 5°. p<sup>a</sup>. 715./ *Lotus* *ruber*, *siliqua* *angulosa*. T./ Inst. R. H. 403. no le trae Quer F. E / Esta planta se cria en las cam-/piñas de Cordoba: la vi la primera/ vez en la Alameda donde coji semil-/la, y la he cultivado.

Es annua, y flo/rece por Mayo y Junio./ Produce los tallos de poco mas de un/ pie, numerosos, y echados en tierra.

1270. Lotus tetragonolo-/bus. L/ Cabrera.
1271. Lotus Angustisimus L.
1272. Lotus corniculatus vars  $\alpha$ /L.
1273. Lotus corniculata/ Emparedada/ 1 de 8bre. de 1815./ 22 H.
1274. ¿Lotus corniculatus L./Entrena.
1275. Lotus corniculatus. Variet.s
1276. Lotus [tachado Dorycnium] corniculatus L./ 55 L.
1277. Lotus.
1278. Loto como Citiso.
1279. Lotus doricnium.
1280. Lotus Dorycnium/ Lin.
1281. Lotus Dorycnium Lin/ 54/L.
1282. Lotus arenarius. Brotero/ Cabrera.
1283. Lotus/pedunculatus.
1284. Lotus [tachado corniculatus] peduncularis Cav.
1285. Lotus siliculosus/W.
1286. ¿Lotus Cytisoides? / Entrena. [Otra etiqueta dice]: Lotus Sp. N/ Cabrera/ 53. C.
1287. Trigonella Monspelliaca./ 51. L.
1288. *Medicago* (Sativa) pedunculis racemo-/sis, leguminibus contortis, çaule erecto/ glabro. Pract. B. de L. pr. Palau t°. 5°. 734./ *Medica major*, erectior, floribus/ purpurascens. T. I. R. H. 410. Flora/ Española tom. 5°. 409./ *Medica*. Lag. in Diosc. 228./ *Medica Dioscoridis*. Casp. Ba-/uhin. comm. Mat. sup. Diosc. 415./ vulgo: Alfalfa, ó Mielga./ Esta planta se cria cerca de/ Cordoba en los Palacios de la Galiana, y/ tierra de las Canteras: crece de dos/ pies de alto, su raiz parece que es / perenne, florece en los Meses de/ Junio y Julio.
1289. *Medicago*/ marítima L./ H. Mauricio.
1290. *Medicago* Marítima/ Cabrera.
1291. *Medicago* polymorpha/ v. coronata.
1292. *Medicago* polymorpha/ v. ciliaris.
1293. *Medicago* polymorpha/ v. minima.
1294. *Medicago* Polimorpha, v.s Orbicularis.

**Clasis / XVIII/ Polyadelphia/ Ordo/ Pentan-/dria**

1295. *Citrus* (Aurantium) petiolis alatis, foliis acuminatis./ Pract. Bot. de Lin. pr. Palau t°. 5°. pag. 758./ *Aurantium* acrí (seu dulci) medulla, vulgare. Tourn./ Inst. R. H. 620. Flora Española t°. 3°. pag. 180./ *Aurantia* Mala. Lag. 105. C. B. com. Mat. 206./ vulgo: Naranja.=y su fruto naranjas./ Este hermoso arbol se cultiva en Cordoba, en todas/ partes generalmente; donde vegeta con la mayor lozania/ produciendo tan exquisitas naranjas que nada le envidian/ [reverso]: á las mejores: florece en Abril, y su fruto esta sazona-/do en Diciembre.

1296. *Hypericum perforatum* Linn.

1297. *Hipericum/ hirsutum?*/ Lag. n°. 36./ V. 3 de Julio.

1298. *Hipericum tomentosum/ Vzgr*

1299. *Hypericum tomentosum.*

1300. *Hypericum Pulchrum. L.*

## CLASE XIX.

1301. *Geropogon / de pelo aspero.*

1302. *Tragopogon/ pratense.*

1303. *Tragopogon porrifolium/ vulgo salsifi. 21. H.*

1304. *Urospermum/ ventenat.*

1305. *Scorzonera Humilis. [Otra etiqueta dice]: Scorzonerae/ species.*

1306. *Scorzonera* (Hispanica) caule ramoso, foliis amplexi-/caulibus integris serrulatis. Pract. B. de L. pr P t°. 6° 30/ *Scorzonera latifolia, sinuata.* T. Inst. R. H. 476./ Quer Flora Española t°. 6°. pag. 270./ Esta planta se cria en las tierras de labor, y/ haun en las que no lo son, de las Campiñas de Cor-/doba, su raiz es perenne, y florece en los meses/ de Abril y Mayo. la raiz se usa en la Medicina.

1307. *Scorzonera gramini/folia.*

1308. *Scorzonera* (Graminifolia) foliis/ lineari-ensiformibus integris ca-/rinatis. P. B. de L. pr. P. t°. 6°. p<sup>a</sup>. 31./ *Scorzonera Lusitánica, Gra-/mineo folio, flore pallide luteo.* T. I. R. H. 477./ Esta planta se cria en Cor-/doba, entre el monte, de Sierra-/morena, en las inmediaciones del/ conbento de Santo Domingo de/ Scala-Coeli, del Santuario de Ntra./ Señora de Linares y otras partes/ parece ser perenne su Raiz, fle. en/ Junio y Julio.

1309. Scorzonera/ Resedifolia.
1310. Scorzonera laciniata/ W.
1311. Scorzonera?
1312. Sonchus Maritimus L.
1313. *Sonchus* (oleraceus) V. asper. Pract. Bot. de Lin./ pr. Palarau t°. 6°. pag. 41.=/ *Sonchus* asper, laciniatus, folio Dentis-Leonis. T./ Inst. R. H. 474. Flora Española t°. 6°. pag. 321.=/ *Sonchus* asper. Lag. 213. C. B. coment Matth/ sup. Diosc. pag. 384.= Dod. pemp. 643.=/ Esta planta se cria en los campos de Cordoba, en/ varios sitios, como en el arroyo Pedroches, la Alameda &c./ es annua y florece en los meses de Abril y Mayo.
1314. Sonchus/ oleraceus/ W.
1315. Sonchus / tenerrimus/ W.
1316. Class. XIX Singenesia Ordo Poligamia/ Æqualis/ Sonchus Picrioides/ Cabanilles Descripc. de las Plant./ pag<sup>a</sup>. 538. Plant. 1142/ Scorzonera Picrioyde (vulgo) Cerraja.
1317. Sonchus angustifolius/ W.
1318. Sonchus pycroides/ W.
1319. Sonchus tingitanus pedunculis squa/mosis foliis omnibus runcinatis amplexi/ caulibus Cabanilles p. 537./ Sonchus/ picrioides/ Lam. Lag./ 29. L.
1320. Lactuca Quercina L/ Entrena. [Otra etiqueta dice]: Lactuca Quer cifolia/ Cabrera.
1321. Lactuca/ virosa.
1322. Lactuca perennis/ Hieracium/ glutinosum.
1323. Chondrila Juncea L.
1324. [Crepis Barbata.]
1325. Crepis rubra/ W.
1326. Crepis Rubra Lin.
1327. Crepis aspera.
1328. Andriala integrifolia L.
1329. ¿Andriala integrifolia/ Entrena.
1330. Andriala/ cheiranti/ folia/ 61/ H. [Otra etiqueta dice]: Si es Andriala sera/ Andriala integrifolia vars  $\alpha$  /Entrena.
1331. Andriala integrifolia (Lin.
1332. Andriala Lanata/ Cabrera.
1333. Andriala Lanata Lin
1334. Andriala.
1335. Hipocheris/ Lampiña.

1336. *Hypochoeris Radicata*/ L/ Entrena. [Otra etiqueta dice]: *Lapsana Sacinta*.

1337. *Lapsana* (*Rhagadiolus*) *calycibus fructus undique patentibus, radiis subulatis, foliis lyratis*. Pract. Bot. de Lin./ por Palau




Figura 5.<sup>a</sup>—Portada policromada de una de las Clases

tº. 6º. pag. 119./ *Rhagadiolus Lampsanae* foliis. T. Inst. R. H. cor./ 36. Flora Española tº. 6º. pag. 195./ Esta especie se cria entre los sembrados del circui-to de Cordoba: es annua y florece en los meses de /Marzo y Abril.

1338. [*Lapsana*?]

1339. *Scolymus Maculatus*./ W.

1340. *Scolymus Grandiflorus*/ W.

1341. *Scolimus* (*Hispanicus*) *floribus congestis*. Pract./ Bot. de

Lin. pr. Palau. tº. 6º. pag. 127. / *Carduus chrysanthemos*. Dod pempt. 725. / vulgo: Tagardina / Esta planta se cria con mucha abundancia / en las campiñas de Cordoba, se hace mucho con-/sumo de ella para comer. vive dos as fe. en el Estio. [Otra etiqueta dice]: Dudo qe. sea esta planta / la qe. cita.

1342. *Arctium Lappa* L.

1343. *Serratula amarga*.

1344. *Serratula* / como *centaurea*.

1345. *Cnicus Palustris*. W. / *Cardus Palustris* (Lin.)

1346. *Cardus Picnocephalus*. L. ? / *C Palustris* L. ?

1347. *Carduus*, *Ciriacus* / *Cabrera*.

1348. *Cardus Marianus*. W.

1349. *Cardus Siriacus*. L.

1350. *Cardus Siriacus*. L / vars. *Purpurea*.

1351. *Cardus Eriophorus* / L.

1352. [*Carduus*].

1353. *Carduus*.

1354. *Cnicus Acarna* Lin.

1355. *Onopordum* sp. nov. ? / W / Es especie nueva.

1356. ¿*Acarna Macrophylla*? / ¿*Onopordum* S. N?

1357. *Carlina Acaulis* / W.

1358. *Carlina vulgaris* L. [Otra etiqueta dice] *Carlina vulgaris* / remito este exemplar con/ flor y la *Acarna Gumifera* / W / *Atractylis Gumifera* de L.

1359. *Carlina* [tachado corimbosa] L. / *suphurea* W. / *Cardillo* de la Ubas.

1360. *Atractylis cancelata*. L.

1361. *Atractylis* / *cancelata*.

1362. *Carthamus Lanatus*. / W.

1363. *Carthamus Coeruleus*. L.

1364. *Carthamus Coeruleus*.

1365. *Bidens* (*Froncosa*) *foliis pinna- / tis serratis lineatis glabris, se- / minibus erectis, calycibus fron- / dosis, caule laevi*. *Pract. Bot.* de / Lin. pr. Palau tº. 6.º pag. 203. / *Varietas calycibus non foliosis.* / Esta planta vi cultivada en / el Jardin Botanico de Sevilla / en sep- / tiembre de 1793. en don- / de cogi este esqueleto. / Es annua, y parece que / es estrangera, AMERICANA.

1366. *Bidens Froncosa*. L / No he podido encontrar las ojos

mas/ bajas de la Planta que creo recordar son/ de tres hojuelas; las tengo encargadas.

1367. *Dahlia pinnata*/ W.

1368. *Cacalia sonchifolia*. L / *Cacalia Coccinea* curt.

1369 Me parece Eupatorio/ Eupatorio Canabinum./ lo cogi en Guadalimar/ en una vega amena/ de sus orillas.

1370. *Eupatorium Micranthum* Lag<sup>a</sup> / *Regali Hortu Matrit.*/ C in R. H. M.

1371. *Eupatorium secundiflorum* Lag<sup>a</sup>./ C in R H M.

1372. *Santolina* (*Chamaecyparissus*) *pedunculis uni-/floris, foliis quadrifariam dentatis.* Pract. Bot. de/ Lin. pr. Palau t<sup>o</sup>. 6<sup>o</sup>. pag. 257. =/ *Santolina foliis teretibus* T. Inst R. H. 460./ *Quer Flora Española* t<sup>o</sup>. 6<sup>o</sup>. pag. 251. =/ *Abrotnum femina*. Lag 282 =/ Esta planta se cria en España, y se cultiba en Cor/ doba formando dibuxos en los Jardines. es pe. fe. en A<sup>o</sup>.

1373. *Santolina chamaecyparissus*.

1374. *Santolina Anthemoides*/ Lin./ C in R H M.

1375. Cabrera / *Atanasia Maritima* / la cogi en las playas / de Regla 1813.

1376. *Balsamita Multifida*/ Clemente/ Cabrera. [Otra etiqueta dice]: *Balsamita multifida*/ de Clemente/ Asi la nombra/Hemeler.

1377. *Tanacetum* (*Balsamita*) *foliis/ovatis integris serratis.* Pract. /Bot. de Lin pr. Palau t<sup>o</sup>. 6<sup>o</sup>. 273 /*Tanacetum hortense, foliis et/ odore Menthae.* T. I. R. H. 461. /*Flora Española* t<sup>o</sup>. 6<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>. 356. / *Balsamita major.* Dod. com./ 299. =/ *Farm. Costus hortensis.* / *Mentha Romana* Lag. 24. / Se cria esta planta en Es-/ paña en las calles de Canencia. / y en las orillas de los prados junto/ á Linares, y Alcalá de la Selva/ en Aragon. Quer.

1378. 22. L. / [tachado thimus] / *Arthemisia contra* / *Elcheia ambigua*/ W.

1379. *Arthemisia officinalis*.

1380. *Gnaphalium/sthechas* W.

1381. Class XIX Singenesia Ord. Poligamia Superflua/ *Gnaphalium Sthoecas*/ Linn. Tom. 6<sup>o</sup>. pg<sup>a</sup>. 297. /*Gnaphalio Estacado* (vulgo) *Perpetu-/as amarillas silvestres*.

1382. *Gnafalium sthecas*/ [tachado Centaura] / No me acuerdo donde cogi/ esta variedad o nueva / especie.

1383. Class XIX Singenesia Ord Poligam. superflua /*Gnapha-*

lium Orientale/ Linn Tom. 6º. pagª 301., Gnaphalio O-/riental (vulgo) Perpetuas amarillas de/ Jardineria.

1384. Gnaphalium sthecas/ vulgo: Siemprevivas.

1385. *Gnaphalium* (Orientale) subher-/baceum, foliis lineari lanceola-/tis sessilibus, corymbo composito, / pedunculis elongatis. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau tº. 6º. pª. 301./ Elichrysum Orientale. T./ Inst. R. H. 453. F. E. tº. 5º. pª. 67./ vulgo siemprevivas pajizas./ Habita en Africa. Lin./ Se cultiva esta planta en / Cordoba en muchas partes; es perenne, y se propaga mui bi-/es de planía: florece por Ma-/yo y Junio.

1386. Gnaphalium/arenarium/W.

1387. Gnaphalii species /Luteoalbum./ Es comun en Calanda y otras/ partes de Aragon. [Otra etiqueta dice]: Gnaphalium Luteoalbum/ L./Entrena / Criase en la falda de / la Sierra de Cordoba.

1388. Gnaphalium/ Luteo-album/W.

1389. Gnaphalium Luteo-album/L/Entrena.

1390. Gnaphalium Luteo-album/ Entrena.

1391. Gnaphalium sthecados.

1392. Gnaphalium.

1393. Xeranthemum/ innapertum Webb: /mi amigo/ antes Centaurea.

1394. Coniza squarrosa/ Emparedada/ 1 de Bbre de 1815/20 H.

1395. Class. XIX Singen. Ord. Poligamia/ Superflua/ an Coniza Linifolia/ Nescio Linn. Tom. 6º. pagª./338. [Otra etiqueta dice]: Inula Pulicaria/Entrena.

1396. Coniza saxatilis/ Cabrera.

1397. Cryssocoma verticalis /61/L.

1398. Coniza? carecen los floscu-/los de la periferia de los 3 dientes/ Erigeron/V. 5 de Julio [Otra etiqueta dice]: Inula Viscosa/ Entrena.

1399. Erigeron viscosum L.

1400. Inula viscosa Lag./57/L./erigeron viscosum Lin.

1401. Erigeron viscosum L./ Entrena.

1402. Erigeron Graveolens (Lin).

1403. Erigeron Linifolium /ó/E. Canadensis.

1404. Erigeron / acre/W.

1405. Erigeron crispum/Pourr. Lag.

1406. Class. XIX Singenesia Ordo/Polligamia Superflua /Erigeron Hisopifolium/ Esta determinada por/ Henseler el de Malaga afi-

ciona/do a la Ciencia. No la trae /Linneo. ni Cabanilles en su descripción de las plantas.

1407. *Erigeron hisopifolium* inula.../48/H./ *Inula crispa* Entrena.

1408. *Tusilago Fasfara*/ vulgo - una de caballo

1409. *Tusilago*/Fasfara.

1410. Class. 19 Singenesia Ordo/Poligamia superflua/*Tusilago petasites*/ Linn. Tomo 6°. pag. 368/ *Tusilago petastes* (vulgo)/ sombrerera.

1411. *Senecii species*. [Otra etiqueta dice[: *Senecio vulgaris*/ Entrena.

1412. *Senecio aegyptius*/W.

1413. *Senecio silvaticus* Lin.

1414. *Senecio Erucifolius* W.

1415. *Senecium*/Jacobea.

1416. *Senecio Jacobae* L.

1417. *Senecio Linifolius*. L

1418. Class. XIX Singenesia Ord. Polligamia super<sup>a</sup> /*Senecii Species* ¿*Linifolium*?/ Linn Tom. 6°. pag<sup>a</sup>. 669.

1419. *Senecium/linifolium*/40 H.

1420. *Senecium* L /62.

1421. ¿*Aster Aipinus* L?/ Entrena. [Otra etiqueta dice]: *Aster*? 46/ H/ *Inula*?/V. 8 Julio.

1422. *Aster* (*chinensis*) foliis ovatis angu-/latis dentatis petiolatis, calycibus ter-/minalibus patentibus foliosis. Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau t°. 6°. p<sup>a</sup>. 419 / *Aster Chenopodii* folio, annu-/us, flore ingenti, specioso. Dill. elth./ 38 Flora Esp. tom. 3°. p<sup>a</sup>. 149. / vulgo *Estrañas*./Havita en la China? Lin./ Esta planta se cultiva en España: en Cordoba en todos los Jardines, y/ Casas particulares, por la belleza de sus / flores, pues las produce de color de Rosa/blancas, Carmesies, Azules, Moradas, y/ Jaspeadas de estos colores, otras veces los/ flosculos del disco que son dorados, se ha-/cen del color del radio, se ensanchan y/ se alargan gradualmente formando un/ copete agraciado, crece de pie y medio á / dos de alto, es annua, y florece en los /Meses Agosto y Septiembre.

1423. Class. XIX Singenesia Polligamia superfl<sup>a</sup>/ *Aster Chinensis*/ Linn: Tom. 6°. Pagina 419/ *Aster* de la China (vulgo)/*Estrañas*.

1424. *Solidago Virga aurea*.

1425. *Cineraria*/ *minuta* W./ floribus luteis.

1426. 57/ H./ *Inula* / *oculus cristi*.

1427. *Inula Oculus christi*.
1428. *Inula Oculus Cristi*/Cabrera. [Otra etiqueta dice]: Me parece mas bien / *Inula Britanica* L./ Entrena
1429. *Inula Disenterica*. L.
1430. *Inula disenterica*/ Cabrera. [Otra etiqueta dice]: ¿Sera acaso?/ *Inula Pulicaria* vars  $\alpha$ / Entrena.
1431. *Inula Pulicaria*.
1432. *Inula pulicaria* W./ 9 bre. junto a Cordoba.
1433. *Inula Hirta*. L.
1434. *Inula Hirta*?
1435. *Inula* (*crithmifolia*) foliis linea-/ribus carnosis tricuspida-tis. Pract./ Bot de Lin. pr. Pal. tom. 6.<sup>o</sup> pag 452./ *Aster maritimus*, folio tere-/ ti, craso, tridentato T. Inst R H./ 483. Flora Española. t.<sup>o</sup> 3.<sup>o</sup> pag. 144 / *Crithmum*. III. Casp. Bauhin./ comm. Mat. sup. Diosc. 382./ *Crithmum Chrysanthemum* / Dodon. pempt. 706 / Habita en los arenales del Mar/ de Barcelona y otras partes de Es-/paña. Quer. Coji este esqueleto/ en el Jardin Botanico de Sevilla.
1436. *Inula*.
1437. *Bellis perennis*.
1438. *Bellis*/ *perennis*.
1439. Class. 19 Singenesia Ordo/ poligamia superflua/ ¿*Bellis perennis*? / Linn. Tom. 6.<sup>o</sup> pag<sup>a</sup>. 473 / *Belis* o *Margarita Perenne*.
1440. *Bellis perennis minor*/ W.
1441. *Bellis annua*/ W./ 19 de De. sobre la/ huerta del Nacanjo.
1442. *Bela* [tachado *annua*] / pseudo-citissus.
1443. *Tagetes* (*Patula*) caule subdiviso patu-/lo. Pract. de Bot. de Lin. pr. P. t.<sup>o</sup> 6.<sup>o</sup> 477./ *Tagetes Indicus*. minor, simplici/ flore, sive *Caryophyllus indicus*, seve/ flos *Africanus*. T. Inst. R. Herv. 488./ Flora Española tom. 6.<sup>o</sup> p.<sup>a</sup> 346./ *Flos Africanus*. Dod. pempt. 255./ *Othonna*. Lag. in Diosc. 257./ *Caryophyllus Indicus* minor flore sim-/plici C. B. com. Mat. in Diosc. 469./ *Africanus* flos simplex. Swert. flo-/rileg. lib. 2.<sup>a</sup> fol 26./ vulgo *copetes*./ Havita en Mexico. Lin./ Se cultiva en Cordoba: crece de/ tres pies mui ramosa, es an-nua y flo-/rece en los Meses de Junio Julio &tc.
1444. Class. XIX Singenesia Ord. Poligamia Superflua/ *Tagetes patula*/ Linn. Tom. 6.<sup>o</sup> pag<sup>a</sup>. 477./ *Tagetes* Extendida.
1445. Class. XIX Singenesia Ord. Poligamia Su-/perflua/ *Tagetes Erecta* Linn Tom. 6.<sup>o</sup> pag<sup>a</sup>./ 478 *Tagetes* derecha.

1446. *Tagetes (erecta) Varietas α.*/ Lin. Spec Plant pr. pu. t.<sup>o</sup> 6<sup>o</sup>. fol. 478./ *Tagetes maximus, rectus, flore maximo/ multiplicato.* Tourn. Inst. R. H. 488 / *Africanus flos masimus pleno flore/ aurantio colore.* Swert. florileg. lib. 2<sup>o</sup> f<sup>o</sup>. 26

1447. *Zinnia (pauciflora) floribus/ sessilibus.* Pract Bot. de Lin. pr. P./ tom. 6<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>. 482./ *Chrysogonum foliis sessilibus/ amplexicaulibus, calycibus sessilibus/ squamosis.* L. Sp. Pl. 320./ Habita en el Peru L./ Esta planta haunque no es/ propia de Jardines de recreo; se/ suele cultivar en algunos de/ Cordoba, y algunas casas par-/ticulares. Es annua, y florece/ en Julio y Agosto.

1448. *Zinnia pauciflora/ W.*

1449. *Pectis pinnata* Lamark/ P. Multifida Ortega/ C in R H M.

1450. Class. XIX Singenesia Ord. Polig<sup>a</sup>. Superfl<sup>a</sup>./ *Zinnia pauciflora/ Linn. Tom. 6<sup>o</sup>. pag<sup>a</sup>. 482/ Zinnia de pocas Flores.*

1451. *Chrysanthemum Leucanthemum/ L./ an C. Montanum.*

1452. *Chrisanthemum/ inodorum?*

1453. Class. XIX Singenesia Ordo Poligamia/ Superflua/ An *Artemisiae species.* [Otra etiqueta dice]: *Crisantemum indicum/ Entrena.*

1454. *Crisantemum Indicum L/ Entrena.*

1455. *Chrysantemum/ pectinatum. W.*

1456. *Chrysanthemum (segetum) foliis amplexicaulibus, su/ perne laciniatis, inferne dentato-serratis.* Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau t.<sup>o</sup>. 6<sup>o</sup>. pag. 495./ Se cria esta planta en grande abundancia en / los sembrados del circuito de Cordoba, y la llaman/ *Pericones*, igualmente que á otras especies de este Ge-/nero Es annua, y florece en Abril y Mayo.

1457. *Chrisanthemum/ segetum.*

1458. *Chrysanthemum (Myconi) foliis ligulatis obtusis/ serratis, calycinis squamis aequalibus.* Pract. Bot. de Lin./ por Palau t.<sup>o</sup>. 6<sup>o</sup>. pag 496 / *Chrysanthemum latifolium.* T. p. 492, no la/ trae Quer en su Flora Española./ Esta especie no es mui comun y se cria en algu-/nos parages del circuito de Cordoba en tierras de labor/ la tengo obserbada hacia el arroyo del Moro: es annua/ y florece en Abril y Mayo.

1459. *Chrisantemum/ miconii.*

1460. *Crisanthemus Myconis /Lin.*

1461. *Pyrethrum Multi/ caule. W.*

1462. *Pyrethrum* [tachado multicalue/ varietas foliis villosis W.]/ Bocconi.
1463. *Matricaria Parthenium*/ vulgo:Yerva de Sta. Maria.
1464. Class XIX Singenesia Ordo/ Poligamia Superflua/ *Matricaria Parthenium*/ Linn. Tom. 6°. pag<sup>a</sup>. 501 / *Matricaria partenio*.
1465. *Cotula Aurea*/ Cabrera.
1466. *Cotula / aurea*/ 60/ H.
1467. *Cotula Aurea* L/ Entrena. [Otra etiqueta dice]: *Cotula Anthemis*/ Cabrera.
1468. *Cotula foetida*. [Otra etiqueta dice]: Dudo qe. lo sea.
1469. *Anthemis Mixta* L./ En las calles.
1470. *Anthemis* (nobilis) foliis pinnato-compositis linearibus/ acutis subvillosis. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau t°. 6°. pag. 521./ *Chamaemelum nobile*, sive *Leucanthemum odoratius*./ T. Inst R. H. 494. Quer Flora Española t°. 4°. pag. 177./ *Chamaemelum odoratum*. Dod. pempt. 259.=/ *Anthemis* sive *Chamaemelum*. C. B. com. Mat. 649./ Esta planta es muy comun en Cordoba en los patios de muchas casas, y en los Jardines la llaman vulgarmente *Manzanilla fina*. es annua y florece en Abril y Mayo.
1471. *Anthemis* (*Cotula*) receptaculis concis, paleis setaceis, seminibus nudis, Pract. Bot. de Lin. pr. Palau t°. 6°. pag. 523./ *Chamaemelum foetidum*. T. I. R. H. 494. F. E. t°. 4°./ pagina 179./ *Cotula alba*. Dod. pempt. 258./ Esta planta se cria en Cordoba con mucha abundancia/ en los llanos de la Albayda, en la piedra de la buena vista y otros sitios, es annua y florece en febrero y Marzo.
1472. *Anthemis cotula*.
1473. *Anthemis Pyrethrum*/ Lin./ C in R. H. M
1474. *Anthemis valentina*.
1475. *Anthemis australis*/W.
1476. *Achilea* (*Ageratm*) foliis lanceolatis/ obtusis. acute serratis. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau t° p<sup>a</sup>. 531./ *Parnica lutea*, suaveolens. T. I./ R. H. 497. Flo. Esp. t°. 6°. p<sup>a</sup>. 144 / *Balsamita minor*. Dod. pempt. 295./ Esta planta se cria en sierra/morena á una legua de distancia/ de Cordoba, en el Lagar de San/José y todos aquellos contornos, y/ en torrebermeja, y otros sitios. Es/ sumate. olorosa, pne. y fe. en Junio y J°.
1477. *Achilea Millefolium*.
1478. *Achilea/millefolium*.

1479. *Achillea* olorosa.
1480. *Aquillea/microphila*/ 53. H./ C. de Amo. 20 Julio.
1481. *Achillea Microphilla*. W.
1482. 31. *Achilleia*? H.
1483. *Verbesina* (alata) foliis alternis decurrentibus/ undulatis obtusis. Pract. Bot. de L. pr P. to. 6<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>. 550./ Se cria en Curasao y en Suriman. Pal. loc. cit./ La he cultivado en Cordoba en mi Jardin;/ Es perenne y florece en Agosto y Septiembre/ crece de dos á tres pies de alto.
1484. *Buphtalmum/Spinosum/Cabrera*.
1485. *Buphtalmum spinosum* / (Cavans.).
1486. *Buphtalmum Spinosum*.
1487. *Buphtalmum/maritimum*?
1488. Class XIX Singenesia Ord. Polligamia/ Frustranea/ Helianthi tuberosi varietas? /Linn. Tom. 6<sup>o</sup>. pag<sup>a</sup>. 570. (vulgo) Patacas. [Otra etiqueta dice]: No es Heliantus.
1489. *Centaurea/ Crupina* /W.
1490. *Centaurea / crupina*/ 28 H. de la 2<sup>a</sup>. ramesa.
1491. *Centaurea saxatilis/et crupina* W.
1492. *Centaurea crupina*.
1493. *Centaurea Moschata/Entrena*.
1494. *Centaurea Alpina* L/ Entrena.
1495. *Centauria Linifolia/Cabrera* [Otra etiqueta dice]: *Centaurea Solstitia/ lis. Cavs. /Entrena*.
1496. *Centaurea Nigra* L./ no es la C. Montana/ pues no tiene el tallo/ Alado. Entrena. [Otra etiqueta dice]: *Nigra? mihi 51./ H./ Centaurea/Montana?*
1497. Mayo 21./ *Centaurea Pullata/Lin. T. 6. f. 605*.
1498. *Centaurea montana/ Sierra de Segura-Junio-29*.
1499. 50. H./ *Centaurea / panniculata*.
1500. *Centaurea / escabiosa*.
1501. *Centaurea amara / varietas β W*.
1502. *Centaurea / alba* W.
1503. *Centaurea alba/ W*.
1504. *Centaurea Alba. L/ Entrena* [Otra etiqueta dice]: 5 C. 59. H./ (tachado centaurea) / coniza/ rupestris.
1505. *Centaurea/ babilonica*.
1506. *Arzolla/ Centaurea/ Leuzea conifera*.

1507. *Centaurea* (Conifera) calyci-/bus scarioris, foliis tomen-  
tosis/ radicalibus lanceolatis, caulinis/ pinnatifidis, caule simplici.  
Pr<sup>a</sup> / Bot. de Lin pr. Palau. t<sup>o</sup>. 6<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>. 620 / *Centaurium majus*, in-  
can-um, humile, capite pini. T I./ R. H. 449. F. E. t<sup>o</sup>. 4<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>. 112./ Es-  
ta planta se cria en Cordo-/ba en terrenos montuosos: en las/ inme-  
diaciones del Santuario de/ nuestra Sra. de Linares, y en los / de-  
mas parajes de la Sierra. Su ra-/iz es perenne, florece en Junio./ á  
esta *Centaurea* la dan tambien el nombre/ de Arzolla.

1508. *Centaurea/ benedicta/ calices con espinas dupli-/cadas*  
lanudos y con involucreo.

1509. *Centaurea* (Benedicta) calicybus du-/plicato-spinosis lana-  
tis involucratis, fo-/liis semidecurrentibus denticulato-spi-/nosis. Lin  
Sp. Plant. pr. pu. t<sup>o</sup>. 6<sup>o</sup>. 624. / *Cnicus sylvestris*, hirsutior, sive/Car-  
duus Benedictus. T. p. 450. Flora/ Española tomo 4<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>. 358. / Car-  
duus Benedictus. Lag in Diosc./ 333 Dod. pempt. 725. Casp Bau-  
hin./ commeut. Matthiol sup. Diosc. 594. / Farm. *Carduus benedic-*  
*tus*. vulgo/*Cardo santo*. / Se cria y es comun en los mas ter-/renos de  
España, en Cordoba se siem-/bra, y hace mucho uso de ella en la  
far-/macia. de su raiz leñosa salen muchos/ tallos ramosos de dos á  
tres pies de largo/ reclinados é incorporados pr. lo regular./ es an-  
nua y florece pr. Junio y Julio. (Dorso): La tengo observada en la  
Sagra / de Toledo, en el año de 1795.

1510. *Centaurea Eriophora/ o/ Lanuda/ Palau. t<sup>o</sup>. 6 pag 625/ 29*  
H. 26. C.

1511. *Centaurea Calcitrapa L/ esta es la qe. no pudimos/ deter-*  
minar el año pasado.

1512. *Centaurea Solticialis Cava.*

1513. *Centaurea Solticialis Cav.*

1514. *Centaureae Species. [Otra etiqueta dice]: Centaurea Meli-*  
*tensis/L./ Entrena.*

1515. *Centaurea Salmantica /Lin.*

1516. *Centaurea / Salmantica.*

1517. Class. XIX Singenesia Ordo /Poligamia Frustranea/ Cen-  
taurea Salmantica/Linn. Tom. 6<sup>a</sup>. pag<sup>a</sup>. 631/ *Centaurea de Salamanca/*  
*(vulgo) Escobilla.*

1518. *Centaurea Galactites L.*

1519. *Centaurea Galactites. L.*

1520. *Centaurea coerulescens/ W / virgata Cab.*

1521. *Centaurea*/ 52. H/ *incana*/ de la Gasca/ segun / les/  
Herse.
1522. *Centaurea*.
1523. Clas.—19—*Singenesia ordo Poliga-/mia necesaria /Calen-*  
*dula officinalis.*/ Lin. Tomo 6°. pagna. 653/ (vulgo) Micaelas o Do-  
blones.
1524. *Filago Germanica* L/ en las inmeds de Madrid.
1525. *Filago Pyramidata* Lin/ me parece /*Gnafalium*.
1526. *Filago Gallica* L./ Rl Casa de Campo.
1527. *Filago Arvensis*. L / tengo un esqueleto del/ F. *Gallica* del  
Jardin Botanico/ mui parecido á este, pero no es tan/ tomentoso y  
las ojas mas estrechas.
1528. *Filago arvensis*.
- 1529 *Filago Arvensis* L?/ F. *Montana.*/ Entrena /No es el F Ger-  
manica. [Otra etiqueta dice]: 54. H *Filago ger/manica /arvensis / 59.*  
L/ *Gn. arenarium*?
1530. *Filago pygmea*/W/*Rabanales/a los lados de Arrecifes.*
1531. 5/ *Micropus sp. nova?*/ L./ 14. H.
1532. *Echinops Rhitro.*
1533. *Jasione Montana* L/ Entrena.
1534. *Viola canina*/W.
1535. *Viola cornuta* W / La cogi junto al arroyo de D. Lucas./  
Dia 10 de Abril de 1833.
1536. *Viola haeterophila*/sp. *nova/stipulis brevissimis ciliatis.*
1537. *Balsamina impatiens* L / Entrena/ *Balsamina Nolitangere.*
1538. *Balsamita/multifida* L/ 58/ de Clemente.
1539. *Ptarmica.*

## CLASE XX.

1540. *Orchis albida*/W./ *Satirum Albidum* L?/ Esta plantita re-  
cuerdo que /Vmd trabajó en ella, pero/ no del resultado.

1541. *Aristolochia* (Boetica) *foliis corda-/tis acutiusculis, caule*  
*volubili, pe-/dunculis subternis petiolo longiori-/bus.* Pract. B. de  
Lin. pr P. t°. 6°. 888./ *Aristolochia Clematitis ser-/pens.* T.I.R.H. 162.  
Fª. Eª. t°. 3°. 91./ Esta especie se cria con abun-/dancia en los cam-  
pos de Cordoba en-/rredada en los Olibos: señaladamente-/ hacia la  
Arrizafa y por toda la fal-/da de la sierra./ Es yerba perenne, y flo-  
rece / en los meses de Abril y Mayo, y ca-/si en todas las estaciones  
del año la/ he obserbado con flor.

1542. *Aristolochia* (*Pistolochia*) foliis cordatis crenulatis subtus re-ticulatis petiolatis, floribus solitariis Pract. Bot. de Lin./ por Paulau tom. 6°. pag 890./ *Aristolochia Pistolochia* dicta. T. Inst. R. H 162./ Quer Flora Española tº. 3º. pag. 92.=Casp. Bauhin /com. Mat. sup. Diosc. pag. 483.=Farm. *Aristoloc. tenuis.*/ Esta especie se cria cerca de Cordoba en los llanos/ de la Albayda, en la Palomera entre el monte baxo, y o-tros sitios: es perenne y florece en los meses de Marzo y Abril.

1543. *Aristolochia longa*/W.

1544. *Aristolochia*/ *longa*. W.

1545. *Cytinus hippocistis*/W.

1546. *Cytinus hypocistis*/ Lin. t. 6. p. 901.

1547. *Ari*, *Dracunculi*/ *Filius parvulus*.

1548. *Arum Maculatum* L./ Entrena.

1549. *Arum Maculatum*. [Otra etiqueta dice]: *hisopofolium*.

1550. *Arum Arisarum*,

1551. *Arum Arisarum*.

#### CLASE XXI

1552. *Chara Vulgaris*.

1553. 9. H. *Chara*.

1554. 8. H. *Chara*?

1555. 5. H. *Chara*.

1556. *Carex/arenaria*/W.

1557. *Carex flava* L./ ó / *C. cespitosa* L./ Entrena.

1558. *Carex Distans*. L.

1559. *Carex vesicaria* L./ Es la especie qe mas se acer/ca; pero tal vez en W/habra otra qe mas le/ combenga.

1560. *Carex*.

1561. *Carex*?

1562. *Betula Alnus*. L/ *Alnus Glutinosa* W.

1563. *Urtica Urens*.

1564. *Urtica dioica*/ W.

1565. *Urtica/Dioica*.

1566. [Bardana menor.]

1567. *Amarantus Melanolicus*.

1568. *Amarantus*.../Melanolicus—foliis ovato lanceolatis / macula nigra in medio foliorum infectus.

1569. Class XXI Monoecia Ord. Pentandr<sup>a</sup> / *Amaranthus tricolor*/ Linn./ Tom. 7<sup>o</sup>. pag<sup>a</sup>. 134/ Amaranto de tres colores/ (vulgo) papagayo.

1570. *Amaranthus viridis*. L.

1571. *Amaranthus viridis* W.

1572. *Glomeraria deflexa* (Cavans) / ó / *Amarantus Deflexus*  
Lin

1573. *Amarantus deflexus*

1574. *Amaranthus Deflexus*./ L. /Entrena.

1575. *Amaranthus deflexus*. [sic]

1576. *Amaranthus (caudatus) racemis pent-/andria decompositis cylindricis pendulis/ longissimis*. Lin. Spec. P. pr. pu. t<sup>o</sup>. 7<sup>o</sup>. p<sup>a</sup>. 143./ *Amaranthus maximus*. Tourn. Inst. R./Herb. 224 Flora Española 2<sup>o</sup>. fol. 283./ vulgo: Moco de Pabo./ Habita en el Peru, en Persia, Zeylan/ y Rusia. L. se cultiva en Cordoba en los/ Jardines de la Alamea, y otros /Crece á la altura de cinco pies ó mas,/ y sus racimos cuelgan hasta cerca del suelo. /Es annua y florece por Agosto y Septiembre.

1577. Class. XXI Monoecia ordo/ Pentandria/ *Amaranthus Caudatus*/ Linn. Tom. 7<sup>o</sup>. pag<sup>a</sup> 103 / Amaranto de Cola / (vulgo Moco de pavo.

1578. *Potherium Sanguisorba* Lin.

1579. *Poterium Sanguisorba*/ Cabrera.

1580. *Quercus (Ilex) foliis ovato-oblongis/ indivisis serratisque subtus incanis./ cortice integro*. Pract. Bot. de Lin./ pr. Palau t<sup>o</sup>. 7<sup>o</sup>. pag. 167./ *Ilex oblongo, serrato folio*. T./ Inst. R. H. 583. Flora Esp<sup>a</sup>. t<sup>o</sup>. 5<sup>o</sup>. 262 / vulgo: *Encina*./ Se cria con tanta abundancia este arbol en toda la Sierra de Cordoba, que hai bosques formados de el de muchisima extensin./ se halla generalmente en toda la /Sierra y muchas partes de la Campiña. Vibe muchos siglos, crece de /una magnitud mui grande, y florece en Abril y Mayo.

1581. *Quercus illex/v. smilax* β /Mesto.

1582. *Quercus Aegilops*/ W./ Mesto en España. [Otra etiqueta dice]: El Fruto del Mesto, aun/ que no enteramente maduro.

1583. *Quercus* /Cerris.

1584. *Quercus Cerris* /Malojo. /W. /Sierra del agua/ Es acaso el *Q. pubescens*/ó el pirenaica de W.?

1585. *Corillus* / avellana.

1586. *Mimosa (Pudica) aculeata, foliis/ subdigitatis pinnatis,*

caule hispido / Lin. Spec Plant. pr. pu. tº. 7º. pª. 193./ vulgo: en Cordoba Sensitiva./ havita en el Brasil./ Esta Planta se cultiva en Cordoba pr/ los curiosos, en donde la dan aquel nombre/ por el prodigioso sentimiento que hace al/ tocarla: pues si sus ojas quando estan abi-/ertas se tocan ligeramente se cierran al/ instante las ojuelas parciales de las pinnas./ aproximandose estas entresi; y graduando el /toque se dobla el pezon por su base quedan-/do la Oja colgando: lo que se hace con gran-/de admiracion, y gusto del curioso especta-/dor Crecen sus tallos del largo de un pie ó mas./ declinados. Florece en Agosto y Septiembre, y/ se hiela en el invierno comunte.; haunque al-/guna vez se ha hecho perenne reserbandola/ del rigor de aquella estación.

1587. Mimosa /Pernanbucana.

1588. *Thuja* (Orientalis) strobilis squarrosis, squamis acutis./ Pract. Bot de Linn. por Palau tº. 7º. pag. 231 / Este Arbolito es procedente de la China y se cul-/tiba en España: en el año de 1789 por acaso hube á las/ manos unas semillas de el, sin nombre, las sembre y/ nacieron quatro que. en breve se criaron, y existen/ todos en Cordoba, uno en la Alameda del Obispo,/ otro en el Real convento de San Pablo, otro en el/ Real Colegio de la Asuncion, y otro en mi poder. [Reverso]: florece en Cordoba por Enero, y grana perfectamente/ sus semillas que estan maduras en el Estio.

1589. *Croton tinctorium*/ an sp, nova seu varietas/ Lin. t. 7. p. 246

1590. *Croton* (Tinctorium) foliis rhombeis/repandis, capsulis pendulis, caule herba-/ceo. Lin. Spec. Plant pr pu, tº. 7º. pª. 245./ *Ricinoides*, ax qua paratur Tourne-/sol Gallorum. T. I. R. H. 655. F. E. tº. 6º. 202 / *Heliotropium minus*. Diosc. pr. Lag. 500./ *Heliotropium minus*, Dod. pemp. 71./ Habita en las inmediaciones de la Ciudad de Cordoba: donde se cria con a-/bundancia, en los campos de labor y ha-/un en los que no lo son, como en las hazas/ del Marrubial, y en todos aquellos suelos./ La he visto tambien en la Villa de Posadas/ seis leguas de esta Ciudad. Es annua y flore /ce en Julio y Agosto.

1591. [*Ricinus communis*.]

## CLASE XXII

1592. *Salix rorismarinifolia* /W. [Otra etiqueta dice]: *Salix riparia* / W./ eadem/quae ante/ [ilegible]: le Vmd?.

1593. *Salix Viminalis* /Sauce ó Mimbrera.
1594. [*Salix*.]
1595. *Empetrum* (Album) erectum. /Pract. Bot. de L. pr. Palau tº. 7º. pª. 344./ *Empetrum Lusitanicum*, fruc-/tu albo. T. I. R. H. 579. Fl. Esp. tº. 5º. 69./ Este Arbustico se cria en Espa-/ña en las costas maritimas de Gali-/cia: donde la llaman aquellas gentes/ *Caramiñas*. vease á Quer. loco citado./ Me dio este esqueleto en Sevil-/la Don Anastasio Guzman: con/ dicho nombre generico y especifico / en Septiembre del año de 1793.
1596. *Osyris Alba*.
1597. *Viscum album*/ en los pinos junto al Hornillo.
1598. *Pistacia* (*Lentiscus*) foliis abrupte-/pinnatis, foliolis lanceolatis. Pract./ Bot. de Lin. pr Palau tº. 7º. pª 372./ *Lentiscus vulgaris*. T. Inst./ R. H. 580. Flora Espª. tº. 5º. pag. 323./ *Lentiscus*. Lag. 55. Dod. pempt/ 281. C. B. Comm. Mat. in Diosc. 105 / Este arbusto es mui comun en/ la sierra de Cordoba por todas ps./ no obstante ser arbusto se hallan/ algunos de tronco tan grueso, y esta-/tura tan corpulenta, que puedn./ equibocarse con los mas frondo-/sos Freznos. florece en Abril-
1599. *Thamnus comunis*.
1600. *Tamus communis*, L./ No he encontrado la flor/ femenina ahora, pero se la/ mando, pues creo es la qe tiene /Vmd determinada con otro nombre./ es de la Ce 22 or 6º.
1601. [*Tamus communis* L ]
1602. *Smilax/nigra* W.
1603. *Mercurialis* / Anbigua/Cabrera.
1604. Planta ♂ /*Mercurialis* (annua) caule bra-/chiato, foliis glabris, floribus spica-/tis. Pract. B. de Lin. pr. Pal. tº. 7º. pª. 412./ *Mercurialis* spicata, sive foe-/mina Dioscoridis et Plinii. T. Inst./R. Herv. 534. Flora Espª. tº. 5º. pag. 432./ *Mercurialis foemina*. Lagun./ 498. C. B. com. Mat. sup. Diosc. 890./ *Mercurialis spicata* seu foemi-/na. Dod. pempt. 685./ Esta planta es demasiado co-/mun en las Huertas, Jardines y/ qualquier sitio humedo. Es annua/ y florece en Marzo y Abril.
1605. *Mercurialis annuae*, planta / foemina. ♀
1606. *Mercurialis* (tomentosa) caule suffruticoso. foliis to-/mentos. Pract. Bot. de Lin pr. Palau tº. 7º. pag. 412./ *Mercurialis fruticosa*, incana, spica (seu testi-/culata). T. Inst. R. H. 534. Flª. Espª.

t°. 5°. pag. 433 / *Phyllum*. Lag. 353. C B. com. Mat. 634/. Esta especie se cria en Cordoba, en las tierras de la / isla que, formo el Rio mas arriba de Lope-garcia, qu-/ando dexo aquel molino en seco: Es perenne y flore/ce en los meses de febrero y Marzo.

1607. *Mercurialis*/ tomentosa.

1608. *Mercurialis*/ tomentosa W.

1609. *Schinus* Molle L / C in H R M. [Otra etiqueta dice]: *Schinus* Areira L./ *Schinus* Molle variets β. W./ Siento qe el tiempo no le permita/ herborizar despacio, yo tampoco hago nada,/ y la prueba es qe. he tenido qe. entretener/me con las plantas de las cercanias. como la/ sigte qe es de su huerto y he aprobechado su/ estado de fructificacion. Entrena.

1610. *Schinus* (Areira) foliis pinnatis,/ foliolis integerrimis aequalibus, petio-/lis aequalibus. Lin. Sp. P. pr. pu. t°. 7. 420./ *Lentiscus* Peruviana. Caspar Bahu-/hinus in comentar. Mathiol. super Dioscorid. 107 / Este Arbol habita en el Brasil y en / el Peru. Se cultiva en Cordoba en la Ala-/mea, y en el Ospital del Cardenal, se conoce/ vulgarmente con el nombre de falsa-pimi-/enta; aunque no es, el *Molle*, á quien se da es-/te nombre./ Es de un aspecto agradable. Cortandole al-/guna rama ó hiriendole suda inmediatamte./ un licor lacteo pegajoso, que se condensa en/ resina mui blanca de la figura y color de los/ mocos de cera, la que pasado algun tiempo se po-/ne azulada, quemada huele al modo del In-/cienso./ Florece en el Otoño.

1611. *Coriaria*/ mirthifolia W./ Redor/ para tenir negro.

1612. *Sabina*/ *Juniperus*/ *Sabina* W. [Otra etiqueta dice]: *Juniperus* (Sabina) foliis oppositis/ erectis decurrentibus, oppositionibus/ pyxidatis. P. B. de L. pr. Palau t°. 7°. 439./ *Sabina* folio Tamarisci, Dioscori-/dis. Quer Flora Española t°. 6°. 229./ *Sabina* baccifera. Casp. Bauh./ commet Mat. sup. Diosc. 120./ *Sabina*. Lagun. in Diosc. 63. Do-/don. pempt. 854./ Se cria este Arbol en varias partes de España, como en los cerros del / pinar de la Cartuxa del Pualar de/ Segovia, en Bustarviejo. &tc. Quer./ Traje este esqueleto de Sevi-/lla en el mes de Septiembre del / año de 1793. me lo dio Guzman.

1613. *Juniperus*/ comunis W.

1614. *Juniperus* (communis) foliis ter-/nis patentibus mucronatis, bacca / longioribus. Pract. Botan. de Lin./pr. Palau t°. 7°. p<sup>a</sup>. 441./

*Juniperus vulgaris*, fruticosa./ T. Inst. R. H. 588 F. E. tº. 5º. pª. 284./  
*Juniperus*. Lag. in Diosc. 62./ Dodon. pempt. 852. C. B. commet./  
 Matthiol. sup. Diosc. 118./ Se cria esta especie de Enebro/ en Cor-  
 doba en Sierra-morena, en/ aquel paraje que llaman los Arena-/les  
 camino de Villaviciosa. Crece/ no mui alto este Arbusto; pero mui/  
 ramoso, florece en Mayo y Junio./ Se hace mucho uso de su made-  
 ra/ en Cordoba para cucharas.

1615. [*Juniperus/ phoenicea* L.]

1616. Andrinales - Alcaraz 16 de Marzo/ tejo - Arbol robusto =  
 hoja mui/ preciosa flor como la del Enebro/ madera apreciable/  
 planta dañosa á animales y plantas/ *Taxus baccata*.

1617. Cheilantes/ odora W. [Otra etiqueta dice]: 19 H./ 4/ *Pteris*  
*fragans*./ An. de Ciencias Nat./ nº. 14. [Una nota dice]: Tengo el ho-  
 nor de presentar a V. unas hojitas secas del Cheilantes/ odora de  
 W. Genero formado por el Swartz con algunas especies del/ Adian-  
 to del qe. se distingue por la escamita qe. con el reborde de la hoja/  
 concurre á cubrir la fructificacion. Va tambien un exemplar fresco/  
 sobre el qual no estoi tan seguro: aunque quizá V. observando/ con  
 mejores lentes uno y otro me enmendara la plana. Del/ fresco si V.  
 lo determina se servira ponerme dos ó tres frondes/ para mi herba-  
 rio porque no me he quedado con ninguno.

1618. [*Polypodium vulgare* L.]

## BIBLIOGRAFÍA

- González Román, Gonzalo*, (Saravia, 3. Córdoba). 1953: «Biografía del Padre Muñoz Capilla». Premiado en el Concurso del Centenario del Círculo de la Amistad. (Inédito).
- González Soriano, Antonio*. 1923: Flora de Córdoba: «Bol. R. Acad. Córdoba» **2** (3): 93-95; (4): 93-99; (5): 49-59; y (6): 77-83.
- Laza Palacios, Modesto*. 1943-1944: Estudios sobre la Flora Andaluza. «An. R. Acad. Farmacia» (Madrid) **10** (2): 157-199; 367-411; y 497. (En las páginas 157-162 incluye datos de gran interés sobre Muñoz Capilla y sus amigos botánicos. En las páginas 167-188 publica varias de sus cartas).
- Ramírez de Arellano, R.* 1923: «Ensayo de un catálogo biográfico de escritores de la provincia y diócesis de Córdoba, con descripción de sus obras. Tomo 1: 416-420. Tipografía de la «Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos», Madrid.

## PRINCIPALES ERRATAS

PAGINA	LINEA	DICE	DEBE DECIR
191	8	año 1790	año de 1790
191	31	Lingustrum	Ligustrum
196	17	casa donde	casa de donde
203	29	ἐγὶ	ἐπί
207	28	ample-/ xicalibus	ample-/xicaulibus
209	1	(Europae)	(Europaea)
212	17	dems	demas
213	3	Tour	Tourn
213	3	244	224
213	Última	eu	en
214	4	Monogina	Monoginia
214	32	Ramus	Ramnus
214	33	Ramus	Ramnus
215	6	Romnus	Ramnus
216	6	su tom.	au tom.
217	9	Dioc.	Diosc.
218	1	pelambres	Pelambres
218	18	ample-/xicalibus	ample-/xicaulibus
218	30	annum	anuum
219	4	ex frutex	frutex
220	28	505	405
223	31	Narcisus	Narcissus
226	5	Fueute	Fuente
227	37	Heptandria. Monogynia	(Debe pasar detrás de la línea siguiente, antes de 516)
228	29	ϑ	ῥ
232	29	Dianthus	Dianthus
232	31	blau-	blan-
233	6	Diauthus	Dianthus
234	17	vnlgo	vulgo
234	34	luteu	luteum
241	11	variet, α	Variet, α
241	38	acre	acre y
247	4	Ton.	Tom.
253	Última	Biscutela	Biscutella
258	13	toroso-turgi/disros-	toroso-turgi/dis ros-
261	31	en annua	es annua
271	34	conbento	combento
272	12	oleraceus	oleraceus
274	29	Lanatus	Lanatus
276	22	Bbre	ῥbre
277	15	Jacobae	Jacobaea
277	21	Aipinus	Alpinus
280	30	(Ageratm)	(Ageratum)
282	1	scarioris	scariosis
282	16	commeut.	comment.
284	15	hisopofolium	hisopifolium