

**PACKUNGSBEILAGE**

MILBEMAX Filmtabletten für Katzen

MILBEMAX Filmtabletten für kleine Katzen und Katzenwelpen

**1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST**Zulassungsinhaber:

Elanco Europe Ltd  
Lilly House,  
Priestley Road,  
Basingstoke, RG24 9NL,  
Vereinigtes Königreich

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Novartis Santé Animale S.A.S.  
B.P. 224  
68330 Huningue  
Frankreich

**2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

MILBEMAX Filmtabletten für Katzen

MILBEMAX Filmtabletten für kleine Katzen und Katzenwelpen

Breitspektrum-Entwurmer

**3. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

MILBEMAX Filmtabletten für Katzen, kleine Katzen und Katzenwelpen sind in 2 verschiedenen Größen erhältlich:

Name Tablet (Umschreibung Tablette)	Milbemycine Oxime pro Tablet	Praziquantel pro Tablet	Excipients q.s
MILBEMAX Tabletten für kleine Katzen und Katzen welpen (beige bis braune Tabletten, Rindfleischgeschmack, länglich geformt, teilbar)	4 mg	10 mg	132,5 mg
MILBEMAX Tabletten für Katzen (rötlich bis rötlich braune Tabletten, Rindfleischgeschmack, länglich geformt, teilbar)	16 mg	40 mg	132,5 mg

**4. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

MILBEMAX kann bei der Katze zur Behandlung von Mischinfektionen mit nicht ausgewachsenen und ausgewachsenen Cestoden und Nematoden eingesetzt werden der folgenden Arten:

- Cestoden: *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus multilocularis*
- Nematoden: *Ancylostoma tubaeforme*, *Toxocara cati*

Prävention der Herzwurmkrankheit (*Dirofilaria immitis*) wenn eine gleichzeitige Behandlung von Cestoden indiziert ist.

## **5. GEGENANZEIGEN**

Die „**Tabletten für kleine Katzen und Katzenwelpen**“ nicht bei Katzen anwenden, die jünger als 6 Wochen sind oder weniger als 0,5 kg wiegen.

Die „**Tabletten für Katzen**“ nicht bei Katzen anwenden, die weniger als 2 kg wiegen.

## **6. NEBENWIRKUNGEN**

In sehr seltenen Fällen, insbesondere bei jungen Katzen, wurden nach Verabreichung des Tierarzneimittels systemische Erscheinungen (wie Lethargie), neurologische Erscheinungen (wie Muskelzittern und Ataxie) und/oder gastrointestinale Erscheinungen (wie Erbrechen und Durchfall) beobachtet.

Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, , teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

## **7. ZIELTIERARTEN**

Katze

## **8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

Empfohlene Mindestdosierung für MILBEMAX Tabletten: 2 mg Milbemycinoxim und 5 mg Praziquantel je kg werden einmalig oral verabreicht.

MLBEMAX einmal oral mit dem Futter oder kurz danach verabreichen. Dies bewirkt optimalen Schutz gegen die Herzwurmerkrankung.

Je nach Körpergewicht der Katze ist die praktische Dosierung Folgende:

Körpergewicht	MILBEMAX Tabletten für kleine Katzen und Katzenwelpen	MILBEMAX Tabletten für Katzen
0,5 – 1 kg	½ Tablette (länglich geformt, beige bis braun)	
>1 – 2 kg	1 Tablette (länglich geformt, beige bis braun)	
>2 – 4 kg		½ Tablette (länglich geformt, rötlich bis rötlich braun)
>4 – 8 kg		1 Tablette (länglich geformt, rötlich bis rötlich braun)
>8 – 12 kg		1½ comprimé Tablette (länglich geformt, rötlich bis rötlich braun)

Das Tierarzneimittel kann bei einem Programm zum Schutz vor der Herzwurmerkrankung eingesetzt werden, wenn eine gleichzeitige Behandlung gegen Bandwürmer indiziert ist. Eine monatliche Behandlung mit dem Tierarzneimittel beugt der Herzwurmerkrankung vor. Wenn regelmäßig eine Behandlung zur Verhütung der Herzwurmerkrankung stattfindet, ist ein monovalentes Produkt vorzuziehen.

## 9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

MILBEMAX wird einmal oral mit oder nach etwas Futter verabreicht. Ein optimaler Schutz vor der Herzwurmerkrankung kann so erreicht werden.

## 10. WARTEZEIT

Nicht zutreffend.

## 11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Unter 25°C lagern.

Blister im Umkarton belassen und vor Licht schützen.

Nicht nach dem auf dem Blister und der Schachtel hinter EXP genannten Verfalldatum verwenden.

Die Haltbarkeit für geteilte Tabletten beträgt 6 Monate.

## 12. BESONDERE WARNHINWEISE

Für Tiere.

### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:**

Gemäß guter tierärztlicher Praxis müssen Tiere gewogen werden, um die richtige Dosierung garantieren zu können.

Echinococcus stellt eine Gefahr für den Menschen dar. Im Falle einer Echinococose müssen spezifische Richtlinien für die Behandlung und Nachuntersuchungen sowie die Sicherheit von Personen eingehalten werden. Es sollten Experten oder parasitologische Institute konsultiert werden.

Es wurden keine Studien mit stark geschwächten Katzen oder Tieren mit stark eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion durchgeführt. Das Tierarzneimittel wird für diese Tiere nicht, oder nur nach Nutzen-Risiko-Analyse des verantwortlichen Tierarztes empfohlen.

### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender**

Nach der Anwendung Hände waschen.

Im Fall einer unbeabsichtigten Einnahme, speziell bei Kindern, ist sofort ein Arzt hinzuzuziehen und ihm der Beipackzettel und/oder das Etikett zu zeigen.

### **Anwendung während Trächtigkeit und Laktation**

Das Tierarzneimittel kann bei Zuchtkatzen, und hier auch bei tragenden und laktierenden Katzen, eingesetzt werden.

### **Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen**

Die gleichzeitige Anwendung des Tierarzneimittels mit Selamectin wird gut vertragen. Es wurden keine Wechselwirkungen beobachtet, wenn die empfohlene Dosierung von makrozyklischem Laktoselamectin bei der Behandlung mit der empfohlenen Dosierung des Tierarzneimittels verabreicht wurde. Obwohl sie nicht empfohlen wird, wurde in einer Laborstudie mit 10 Kätzchen die gleichzeitige Anwendung von MILBEMAX, in der empfohlenen Dosis, und einem Spot-on mit Moxidectin und Imidacloprid bei einmaliger Anwendung gut vertragen. Die Sicherheit und Wirksamkeit der gleichzeitigen Anwendung wurde nicht in Feldstudien untersucht. Aufgrund des Fehlens weiterer Studien wird empfohlen, bei gleichzeitiger Anwendung des Tierarzneimittels mit jedem anderen makrozyklischen Lakton vorsichtig zu sein. Außerdem wurden solche Studien nicht bei trächtigen Tieren durchgeführt.

Da keine weiteren Studien vorliegen, ist bei der gleichzeitigen Verabreichung des Tierarzneimittels mit anderen makrozyklischen Laktonen Vorsicht angeraten. Auch wurden solche Studien nicht mit trächtigen Tieren durchgeführt.

### **Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel)**

Im Fall einer Überdosierung wurde neben den Erscheinungen, die bei der empfohlenen Dosierung auftreten (siehe Punkt Nebenwirkungen), Sabbern beobachtet. Diese Erscheinung verschwindet normalerweise spontan innerhalb eines Tages.

### **13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel oder -reste sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Das Tierarzneimittel darf nicht in den Wasserkreislauf gelangen, da dadurch Fische und andere Wasserorganismen gefährdet werden können.

### **14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

März 2016

### **15. WEITERE ANGABEN**

Packungsgrößen:

Schachtel mit 2 Tabletten, Blisterpackung

Schachtel mit 4 Tabletten, Blisterpackung

Schachtel mit 10 Tabletten, Blisterpackung

Schachtel mit 20 Tabletten, Blisterpackung

Schachtel mit 50 Tabletten, Blisterpackung

Schachtel mit 100 Tabletten, Blisterpackung

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers in Verbindung.

BE-V253163 MILBEMAX Filmtabletten für kleine Katzen und Katzenwelpen

BE-V253154 MILBEMAX Filmtabletten für Katzen

Rezeptfrei