

Erste Hilfe Allergie

- **FASTJEKT** **Fertigpen in den Oberschenkel**
 - **Fenistil** **20-30 Tropfen** direkt einnehmen
 - **Prednisolon** **50mg**
- ✓ Je nach Art und Schwere der Allergie und des auslösenden Vorfalles sollte die **Dosis der Medikamente** wie mit dem **Arzt abgesprochen angepasst** werden
 - ✓ Begeben Sie sich **nach der Einnahme sofort in ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus** und **nehmen Sie** den gebrauchten **FASTJEKT sowie die anderen eingenommenen Medikamente mit**. Teilen Sie dort mit **welche Dosis** der Medikamente eingenommen wurde (ggf. direkt mitschreiben)
 - ✓ Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Haltbarkeit Ihrer Medikamente und kümmern Sie sich rechtzeitig um Ersatz, sollte ein Medikament verfallen.
 - ✓ Informieren Sie Angehörige, Arbeitskollegen, Lehrer oder andere Alltagsbegleiter über Ihre Erkrankung, wo Sie Ihr Notfallset aufbewahren und wie es anzuwenden ist.
 - ✓ Bringen Sie dieses Schreiben an einem gut sichtbaren Ort (Kühlschrank, Türen, etc.) an und legen Sie eine Kopie ihrem Notfallset bei