

予防接種	予防できる感染症	種類		回数	開始時期	推奨時期	標準	備考	
Hib(ヒブ)	Hib感染症 細菌性髄膜炎 喉頭蓋炎	定期	不活化	4回	2か月～	①②③ ④	2か月～12か月 1歳～5歳未満	①-②-③はそれぞれ4～8週(1か月～2か月)あける(1歳までに) ③-④は7か月以上あける(標準は7か月から13か月)(1歳～)	①②③は1歳未満に
				3回	7か月～	①② ③	7か月～12か月 ～13ヶ月未満	①-②は4～8週あける ②-③は7か月以上あけ13か月未満	①②は1歳未満に
				1回	12か月～	①	12か月～5歳未満	1回接種	※5歳過ぎると公費対象外
肺炎球菌(プレバナー)	細菌性髄膜炎 敗血症	定期	不活化	4回	2か月～	①②③ ④	2か月～12か月 1歳～5歳未満	①-②-③はそれぞれ4～8週(1か月～2か月)あける(1歳までに) ③-④は2か月以上かつ1歳～1歳5か月までに	①②③は1歳未満に
				3回	7か月～	①② ③	7か月～12か月 ～13ヶ月未満	①-②は1か月～2か月 ②-③は2か月以上かつ1歳～1歳5か月までに	①②は1歳未満に
				2回	1歳～	①②	1歳～2歳までに	2か月以上あける	※5歳～6歳未満任意接種
				1回	2歳～	①	2歳～5歳未満	1回接種	
B型肝炎	慢性肝炎 肝硬変	定期	不活化	3回	2か月～	①② ③	2か月～ 7か月～	①-②は1か月以上あける。1歳までに ①-③は20週(5ヶ月)以上あける	※1歳過ぎると公費対象外
ロタウィルス(1価)	感染性胃腸炎	任意	生	2回	2か月～	①②	2か月～3か月半まで	①-②は1か月あける	約5か月半までに完了する。
四種混合(DPT-IPV)	D:ジフテリア P:百日咳 T:破傷風 IPV:ポリオ	定期	不活化	4回	3ヶ月～	①②③ ④	3か月～12か月 12か月～18か月	①-②-③は3～8週(1か月～2か月)あける。1歳までに ③-④6か月以上(標準的には1歳から1歳半まで)	①～③を1歳未満に受けなくても③-④が6か月以上あいていれば、7歳半までに4回うければよい。
				追加	11歳以上	2期	11歳以上13歳未満	1回接種	※13歳過ぎると公費対象外
BCG	結核症	定期	生	1回	5か月～	①	5か月～8ヶ月	1歳未満までに1回	※1歳過ぎると公費対象外
MR(麻しん風しん混合)	麻しん(はしか) 風しん	定期	生	2回	1歳～	1期	1歳～2歳未満	1歳になったら早めに	※2歳を過ぎると公費対象外
						2期	就学前年(年長児)	就学前の1年間(4/1～3/31)	※就学後4/1～は公費対象外
水痘(水ぼうそう)	水痘 帯状疱疹ウイルス	定期	生	2回	1歳～	1期①	1歳～1歳3か月	①-②標準的には3か月(6か月～12か月)あける	※3歳過ぎると公費対象外
						2期②	3歳までに		
おたふくかぜ	流行性耳下腺炎	任意	生	2回	1歳～	1期①	1歳～	1歳になったら早めに	
						2期②	就学前年(年長児)	5～7歳未満(就学前の1年間)	
日本脳炎	蚊を媒介する日本脳炎	定期	不活化	4回	3歳～	1期①②	3歳～4歳未満	①-②は3～4週(1か月)あける。	※7歳半過ぎると公費対象外 ※13歳過ぎると公費対象外
						1期追加③	4歳～5歳未満	1期②から標準的には1年以上あける	
						2期④	9歳～13歳未満	小学4年生	
				特別対象者					
				1995年4月2日～2007年4月1日生まれた人………1期2期ともに20歳まで可能					
				2005年5月30日～2009年に接種機会を逸した人……2期の対象年齢(9～13歳未満)に1期の不足分					
インフルエンザ	インフルエンザA・B	任意	不活化	2回	6か月～	①②	6か月～13歳未満	①-② 2～4週(1か月)あける	接種後2週間から5か月予防効果
				毎年	13歳～	①または②	13歳以上60歳未満	①-② 接種希望者、慢性疾患のある人は2回	

生ワクチン 4週間後の同じ曜日以降(1か月以上)
不活化ワクチン 1週間後の同じ曜日以降(10日以上)

