Praxiszentrum Saarstraße

Dr. med. J. Harris / Dr. med. S. Hermanns

Kinder- und Jugendärztinnen



Notfallset bei schwerer Allergie

Liebe Eltern, Liebe Kinder,

aufgrund einer schweren Allergie mit möglicher allergischer Reaktion wurde Ihrem Kind / Euch ein Notfallset rezeptiert.

Inhalt:

- Celestamine 30ml (15mg trinkbares Cortison), Prednisolon Tabletten 100mg oder Rectodelt 100mg Zäpfchen
- Fenistil Tropfen 20ml (20mg trinkbares Antihistaminikum)
- Adrenalinspritze (150µg bzw. ab 30kg Körpergewicht 300µg zur intramuskulären Injektion in den Oberschenkel)
- Evtl. Salbutamol Spray

Anleitung:

Mäßige allergische Reaktion:

z.B. Juckreiz, Quaddeln

- -> Maßnahmen:
- Umgebung alarmieren
- Fenistil Tropfen: 40 Tropfen geben
- Celestamine N 0,5 liquidum: halbe Flasche trinken oder Tabletten (100mg) oder 1 Zäpfchen geben
- Adrenalinspritze bereitlegen
- Arzt informieren/aufsuchen

Zunehmende oder direkt schwere allergische Reaktion:

Hautausschlag, Augen-, Ohren-, Lippenschwellung, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Klossgefühl im Hals, Schluckbeschwerden, Atembeschwerden, Schwindel, Herzrasen, Bewusstlosigkeit

-> Maßnahmen:

- Umgebung und Notarzt (112) alarmieren, falls noch nicht geschehen
- Fenistil Tropfen: 40 Tropfen geben, falls noch nicht geschehen
- Celestamine N 0,5 liquidum: halbe Flasche trinken oder Tabletten (100mg) oder 1 Zäpfchen geben, falls noch nicht geschehen
- · Adrenalinspritze sofort nach Anleitung in den seitlichen Oberschenkel injizieren
- Salbutamol 2 Hub bei Atembeschwerden
- Notarzt (112) alarmiert!?!

Anwendung eines Adrenalin-Autoinjektors



- Schutzkappe entfernen
- 10 Sekunden fest gegen den Oberschenkel drücken, das Adrenalin wird automatisch injiziert
- Notruf absetzten

Bitte Haltbarkeit der Medikamente regelmässig prüfen.

Weitere betreuende Personen, Oma, Opa, Babysitter, Erzieher in Kita, Lehrer, Eltern von Freunden informieren und schulen!

Vor allem die Notwendigkeit bei allergischer Reaktion den Notarzt zu verständigen und den Adrenalinpen zu benutzen muss betont werden!

Das Notfallset muss nah am Kind sein. Immer!!! Hierfür eignen sich Bauchtaschen oder spezielle Täschchen mit Anleitung und Anaphylaxiepass!



