

Behandlungsstrategie Entwurmung Pferde älter als 4 Jahre



Zeitpunkt	Indikation	Wirkstoff	Bemerkung
Februar	Spulwurm Strongyliden	Benzimidazol (z.B. Panacur) Pyrantel (z.B. Jernadex, Banminth Hippoparex)	alternativ Kotprobenuntersuchung, falls negativ keine Entwurmung
Mai	Spulwurm Strongyliden	Makrozyklische Laktone (z.B. Ivermectin)	
August	Spulwurm Strongyliden	Benzimidazol (z.B. Panacur)	alternativ Kotprobenuntersuchung, falls negativ keine Entwurmung
November	Spulwurm Strongyliden Magendassel Bandwurm	Moxidectin Praziquantel (Equest Pramox)	

Behandlungsstrategie Entwurmung für Fohlen



Stuten direkt nach der Geburt entwurmen gegen Zwergfadenwurm (Wirkstoff: Ivermectin)

Zeitpunkt	Indikation	Wirkstoff	Bemerkung
mit einem Monat (ca. April)	Zwergfadenwurm	1 Injektor Benzimidazol (z.B. Panacur)	
mit 2 Monaten (ca. Mai)	Spulwurm Strongyliden	Pyrantel (z.B. Jernadex, Banminth, Pyrantel)	evtl. Erfolgskontrolle durch Kotprobenuntersuchung 14 Tage nach Entwurmung
mit 5 Monaten (ca. August)	Spulwurm Strongyliden	Benzimidazol (z.B. Panacur)	evtl. Erfolgskontrolle durch Kotprobenuntersuchung 14 Tage nach Entwurmung
mit 8 Monaten (ca. November)	Spulwurm Strongyliden Magendassel Bandwurm	Moxidectin Praziquantel (Equest Pramox)	nicht vor 6. Lebensmonat

bei spät geborenen Fohlen gegebenenfalls die Abstände verkürzen

Behandlungsstrategie Entwurmung bis 4 jährig



Zeitpunkt	Indikation	Wirkstoff	Bemerkung
Februar	Spulwurm Strongyliden	Benzimidazol (z.B. Panacur) Pyrantel (z.B. Jernadex, Banminth Hippoparex)	evtl. Erfolgskontrolle durch Kotprobenuntersuchung 14 Tage nach Entwurmung
Mai	Spulwurm Strongyliden	Makrozyklische Laktone (z.B. Ivermectin)	evtl. Erfolgskontrolle durch Kotprobenuntersuchung 14 Tage nach Entwurmung
August	Spulwurm Strongyliden	Benzimidazol (z.B. Panacur) Pyrantel (z.B. Jernadex, Banmith, Hippoparex)	evtl. Erfolgskontrolle durch Kotprobenuntersuchung 14 Tage nach Entwurmung
November	Spulwurm Strongyliden Magendassel Bandwurm	Moxidectin Praziquantel (Equest Pramox)	