



Geschätzte Patienten

Angesichts der neuen epidemiologischen Situation durch die Delta-Variante wird folgendes Vorgehen mit einer weiteren Dosis von COVID-19 Impfstoffen empfohlen:

1.) JANSSEN-Geimpfte unmittelbar:

Personen, die mit COVID-19-Vaccine Janssen einmalig geimpft wurden, sollten eine weitere Dosis im Mindestabstand von 28 Tagen erhalten (off-label), dabei soll vorzugsweise ein mRNA-Impfstoff verwendet werden, kann jedoch auch erneut COVID-19-Vaccine Janssen verwendet werden. Ob und wann danach eine weitere Dosis notwendig wird, wird zu gegebener Zeit in Abhängigkeit von Daten und epidemiologischer Situation entschieden werden.

2.) Risikogruppe sowie alle AstraZeneca-Geimpften ab 6 Monate nach 2.Stich

Folgenden Risikogruppen wird eine weitere Dosis in einem Zeitraum von frühestens 6 bis spätestens 9 Monaten nach Abschluss der vollständigen Erstimmunisierung empfohlen (off-label):

- Bewohnerinnen und Bewohnern von Alten-, Pflege- und Seniorenwohnheimen
- Personen ab 65 Jahren
- Personen, welche 2 Dosen Vaxzevria (AstraZeneca) erhalten haben sowie Personen (ab 12 Jahren unabhängig vom Alter) mit Vorerkrankungen und Risikoprofil

3.) spezielle Berufsgruppen

Folgenden Personen kann ab 6 Monaten und soll ab 9-12 Monaten eine weitere Dosis angeboten werden (off-label):

- Personal in Alten-, Pflege- und Seniorenwohnheimen
- Personal im Gesundheitsbereich
- Personal in der mobilen Pflege, Betreuung, Krankenpflege sowie pflegende Angehörige
Personal in pädagogischen Einrichtungen (Kinderbetreuung, Schule, Universität, etc.)

4.) **Allen anderen Personen** ab 16 Jahren soll nach 9-12 Monaten nach 2.Impfung eine weitere Impfung angeboten werden (off-label).

5.) Genesene

Genesene, die eine Impfung erhalten haben, sollen wie vollständig geimpfte Personen angesehen werden und genauso wie unter 2., 3. und 4. angeführt behandelt werden.

Wenn genesene Personen bereits 2 Impfungen erhalten haben (Genesen und danach 2 Dosen), ist derzeit bis auf weiteres keine weitere Impfung gegen COVID-19 notwendig.

6.) Impfdurchbrüche (symptomatische SARS-CoV-2 Infektion) oder Infektion nach vollständiger erster Impfsérie: derzeit keine weitere Impfung empfohlen. Bei Risikopersonen/chronisch kranken Personen kann eine Antikörpertestung frühestens 1 Monat nach Genesung durchgeführt werden.

**In unserer Ordination wird der
Impfstoff BIONTECH/Pfizer angeboten und die Verfügbarkeit ist
gewährleistet. Wir impfen dzt. 2-3x/Woche und ab November
werden wir täglich Impftermine anbieten. Die Anmeldung
erfolgt telefonisch zu den Ordinationszeiten.**

(PS Gripeschutz-Impfung empfohlener Zeitpunkt Ende Oktober - November)