

NA DE BEHANDELING

Nazorg

NORMALE TEKENEN

- Vochtafscheiding (van heldere vloeistof) is een normaal verschijnsel gedurende de eerste dagen.
- Roodheid binnen het behandelend gebied.
- Een lichte zwelling is de eerste uren tot dagen normaal, maar behoort elke dag minder te worden.
- Binnen de eerste 12 uur na het behandelen kunnen zich koorts of koude rillingen voordoen; als dit aanhoudt of ernstig wordt, behoort het te worden gezien als een teken van infectie en is onmiddellijk medische hulp nodig.

ABNORMALE TEKENEN

Tekenen van infectie

- Toenemende vochtafscheiding;
- Afscheiding van geelachtige of groene plakkerige vloeistof;
- Een onaangename geur;
- Toenemende pijnlijke roodheid die zich rond het behandelend gebied verspreidt;
- Toenemend kloppen en branden in en rond het behandelend gebied;
- Immobilititeit of problemen bij het bewegen van een ledemaat, vinger, teen of ander lichaamsdeel;
- Rode lijnen die zich over de huid verspreiden; bijvoorbeeld rode lijnen die vanaf een recente behandelend gebied op de pols of hand lopen en doorlopen over de onderarm en naar de bovenarm. Dit kan verband houden met bloedvergiftiging. Indien dit wordt geconstateerd, behoort er onmiddellijk medische hulp te worden ingeroepen;
- Hoge koorts of aanhoudende koorts en griepachtige verschijnselen zijn tekenen van ernstige infectie. Indien dit wordt geconstateerd, behoort er onmiddellijke medische hulp te worden ingeroepen.

**! MOCHT U LAST HEBBEN VAN DE ABNORMALE TEKENEN NEEM
DAN CONTACT MET MIJ OP EN UW HUISARTS**