

Izjava o suglasnosti za tablete kalijeva jodida

Izjava o suglasnosti za uzimanje tableta kalijeva jodida

Dragi roditelji! Dragi skrbnici!

Više od 30 godina austrijsko Ministarstvo zdravlja stanovništvu besplatno osigurava tablete kalijeva jodida uključujući škole i vrtiće.

Zašto i kad je važno uzimanje tableta kalijeva jodida?

U slučaju ispuštanja radioaktivnog joda zbog nesreće u nuklearnoj elektrani tablete kalijeva jodida opskrbljuju tijelo stabilnim jodom i time sprečavaju visoku izloženost štitnjače zračenju.

Zašto je važno na vrijeme uzeti tablete kalijeva jodida u slučaju nuklearne nesreće? Tablete

kalijeva jodida štite samo kad se uzmu PRIJE dolaska radioaktivnih zračnih masa. To daje tijelu vremena da „izgradi” zaštitu. Kako bismo osigurali pravovremenu distribuciju za vaše dijete, tablete su već pohranjene u obrazovnim ustanovama.

Kad se i prema čijim uputama u školi dijele tablete kalijeva jodida?

Tablete se smiju davati samo nakon izričitog zahtjeva nadležnih tijela za zaštitu od zračenja. Škola treba vašu suglasnost kako bi u slučaju neposredne nuklearne prijetnje vašem djetetu mogla dati zaštitni kalijev jodid da ga ponese kući iz škole – za uzimanje u skladu sa zahtjevom nadležnih tijela za zaštitu od zračenja.

Pozorno pročitajte priložene upute za uzimanje tableta kalijeva jodida, a potpisanu suglasnost dijete treba donijeti u školu. Hvala!

(Izjave o suglasnosti na njemačkome i drugih 12 jezika također možete pronaći online: Obrasci za ispis: www.schularzt.at)

Direkcija

IZJAVA O SUGLASNOSTI:

Ime djeteta:

Datum rođenja:

Ime skrbnika:

- DA, dajem suglasnost (tijekom trajanja posjeta ustanovi) da se mojem djetetu daju tablete kalijeva jodida na zahtjev nadležnih tijela za zaštitu od zračenja. Potvrđujem da mi nije poznata bilo kakva intolerancija ili kontraindikacija za uzimanje tableta kod mog djeteta i da ću odmah obavijestiti školu ako doznam za bilo kakve intolerancije ili kontraindikacije.
- NE, ne dajem suglasnost.

Datum:

Potpis:

Informacije o tabletama kalijeva jodida (prema uputama za uzimanje)

Tablete kalijeva jodida ne smiju se uzimati:

- u slučaju **pojačanog rada štitnjače**.
- u slučaju **dobročudnih čvorova štitnjače** koji se ne liječe. Kod takozvanih neliječenih vrućih čvorova štitnjače postoji opasnost od znatno pojačane proizvodnje hormona štitnjače što u najgorem slučaju može uzrokovati kardiovaskularne reakcije opasne za život.
- u slučaju **alergije** (preosjetljivosti) na jod. Ovo je vrlo rijetko stanje i ne treba ga zamijeniti s uobičajenom alergijom na kontrastna sredstva (koja se upotrebljavaju za poboljšanje vizualizacije različitih organa u postupcima snimanja kao što je rendgenska dijagnostika).
- u slučaju **alergije** na jedan od sastojaka tableta (kukuruzni škrob, laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza, bazični kopolimer butil metakrilata, magnezijev stearat).
- u slučaju **herpetiformnog dermatitisa** (Duhringove bolesti: bolest u kojoj se javljaju mjehurići, crvenilo kože, osip, koprivnjača i jak svrbež, najčešće na laktovima ili koljenima).
- kod **upale stijenke krvnih žila** uzrokovane alergijama (hipokomplementarni vaskulitis).

Poseban oprez pri uzimanju tableta kalijeva jodida potreban je:

- ako postoji sumnja na **zloćudni tumor štitnjače**. Tumori štitnjače liječe se radioaktivnim jodom. Uzimanje većih količina kalijeva jodida može onemogućiti liječenje tumora.
- u slučaju bolesti koja zahvaća **dušnik**. Davanje velikih količina joda može uzrokovati rast štitnjače, što dodatno pogoršava postojeće suženje dušnika.
- ako se dijete liječi **inhibitorima štitnjače (tireostatici)**. Pitajte svoju liječnicu / svojeg liječnika smije li vaše dijete uzimati tablete kalijeva jodida.

Uzimanje tableta kalijeva jodida s drugim lijekovima

- **Na djelovanje tableta kalijeva jodida utječu:** lijekovi koji utječu na metabolizam štitnjače (npr. perklorat, tiocijanat u koncentracijama iznad 5 mg/dl). Oni inhibiraju unos joda u štitnjaču.
- **Tablete kalijeva jodida utječu na djelovanje:** inhibitora štitnjače (tireostatike).

Kalijev jodid G.L. sadržava laktozu. Pitajte svoju liječnicu / svojeg liječnika smije li vaše dijete uzimati tablete kalijeva jodida ako vam je poznata intolerancija na šećer kod vašeg djeteta.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, tablete kalijeva jodida mogu izazvati nuspojave, ali se one neće javiti kod svih osoba. Zabilježene su sljedeće nuspojave:

Rijetko (mogu se pojaviti u do 1 na 1000 osoba):

- može se pojaviti dosad nepoznata alergija na jod. Pritom se mogu javiti alergijski simptomi kao što su crvenilo kože, svrbež i pečenje u očima, curenje nosa, suhi kašalj, proljev, glavobolja i slične tegobe. Moguće su reakcije opasne za život, osobito ako već imate herpetiformni dermatitis (Duhringovu bolest, kod koje se, među ostalim, javljaju mjehurići i crvenilo kože, osobito na laktovima ili koljenima (pogledajte gore: „Tablete kalijeva jodida ne smiju se uzimati“).
- upale krvnih žila (npr. periarteriitis nodosa).

Vrlo rijetko (mogu se pojaviti u do 1 na 10 000 osoba):

- pojačan ili usporen rad štitnjače uzrokovan jodom. Znakovi pojačanog rada štitnjače mogu uključivati ubrzan rad srca, znojenje, nesanicu, drhtanje, proljev i gubitak težine unatoč povećanom apetitu. Ako imate takve tegobe, obratite se liječniku.

Nije poznato (nije moguće procijeniti učestalost na temelju dostupnih podataka):

- može doći do nadražaja želučane sluznice, osobito kod uzimanja tableta kalijeva jodida natašte
- upala žlijezda slinovnica
- tegobe u gastrointestinalnom traktu
- blagi kožni osip.

Opće pravilo:

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, upitajte svojeg liječnika ili ljekarnika.