

# Empfohlene Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen

## 1 Monat

Keine Impfung

## 2 Monate

- **Wundstarrkrampf-Kombinationsimpfung** (6-fachimpfung) (Diphtherie/Starrkrampf/Keuchhusten/Hirnhaut- und Kehlkopfdeckel-entzündung/Kinderlähmung/Hepatitis B)
- **Pneumokokkenimpfung** (Hirnhautentzündung und Blutvergiftung)

## 4 Monate

- **Wundstarrkrampf-Kombinationsimpfung** (6-fachimpfung)
- **Pneumokokkenimpfung** (Hirnhautentzündung und Blutvergiftung)

## 6 Monate

Keine Impfung

## 9 Monate

- **Masern-Mumps-Rötelnimpfung**

## 12 Monate

- **Wundstarrkrampf-Kombinationsimpfung** (6-fachimpfung)
- **Pneumokokkenimpfung**

## 13 Monate

- **Masern-Mumps-Rötelnimpfung**

## 18 Monate

Keine Impfung

## 2 Jahre

- **Meningokokkenimpfung** (Hirnhautentzündung)

## 3 Jahre

Keine Impfung

## 4 ½ Jahre

Keine Impfung

## 6-7 Jahre

- **Wundstarrkrampf-Kombinationsimpfung** (Diphtherie/Starrkrampf/Keuchhusten/Kinderlähmung)

## 11-12 Jahre

- **Wundstarrkrampf-Kombinationsimpfung** (Diphtherie/Starrkrampf/Keuchhusten)
- **Meningokokkenimpfung** (Hirnhautentzündung)
- **Varizellen-Impfung** (falls noch keine „Spitze Blättern“ durchgemacht) (2 Impfungen Abstand 6 Wochen)

## 14-15 Jahren

- **Hepatitis B-Impfung** (falls im Säuglingsalter nicht erfolgt) (2 Impfungen im Abstand von 6 Monaten, ab 16 Jahre 3 Impfungen)
- **Impfung gegen humane Papillomaviren** (gegen Gebärmutterhalskrebs und Genitalwarzen) (2 Impfungen im Abstand 6 Monate, ab 15 Jahre 3 Impfungen)

Die **FSME-Impfung** (Hirnhautentzündung durch Zecken übertragen) empfehlen wir je nach Freizeitverhalten ab dem 6. Geburtstag. Impfung möglich ab dem 1. Geburtstag.

Wir empfehlen die oben aufgeführten Impfungen. Auf Wunsch können individuelle Impfschemata durchgeführt werden

Im 2. Kindergarten, sowie in der 4. Und 8. Klasse finden **obligatorische schulärztliche Untersuchungen** statt, diese werden durch den zuständigen Schularzt oder auf Wunsch beim betreuenden Kinder-/Hausarzt durchgeführt.

