

こんなとき

ヘパエイド をご使用ください。

- ① 乾乳期にしっかりケアしたい
- ② 周産期のトラブルを減らしたい
- ③ 分娩後の発情を明確にしたい
- ④ 子牛の健康を維持したい



5Kg(1Kg×5)

給与例

乾乳牛

10～20g／日

子牛

(離乳、飼料切替、発育不良など)

5～10g／日

〔原材料名〕

米ぬか油かす、ブドウ糖、炭酸カルシウム、リゾープス麴エキス粉末

〔保存上の注意〕

高温多湿を避けて保存してください。開封後はしっかり口を閉じ、できるだけ早めに使い切ってください。

乾乳期のケアが肝心！

Hepa Aid



1 リゾープス
翹エキス粉末を
高濃度で配合



3 栄養バランスに
影響しない少量給与



2 優れた嗜好性



4 保存性の良い
チャック付袋

給与成績例


第155回日本獣医学会発表

地区 石川県 畜種 乳牛(経産牛) 頭数 各群8頭


給与方法 分娩予定20日前より分娩日まで1日10g給与

結果

① 分娩前後の血漿中NEFA濃度 *: $p < 0.05$



② 分娩後の血漿中IGF-1濃度 *: $p < 0.05$



③ 分娩後の初回発情までの日数

給与群: 43.0 ± 33.1 日
対照群: 63.0 ± 35.0 日

④ 受胎率

給与群: 66.7%
対照群: 40.5%

【製造発売元】



株式会社 牛越生理学研究所
千葉県佐倉市石川601-1