

Untersuchungstermin am **Vormittag:**

Liebe Patientin, lieber Patient

Für die Darmspiegelung ist es wichtig, dass Ihr Darm vollständig sauber ist. Bitte halten Sie dazu diese Anleitung möglichst genau ein. Die empfohlenen Einnahmezeiten der Packungsbeilage sollen nicht beachtet werden.

Vorbereitung für die Darmspiegelung (Koloskopie) mit Picoprep®

Bereits 3-4 Tage vor der Untersuchung sollten Sie auf kernhaltige oder faserreiche Nahrungsmittel verzichten, da diese trotz Abführlösung im Darm zurückbleiben und die Darmspiegelung erschweren können. Insbesondere Salat, Obst, Gemüse, Vollkornbrot, Leinsamen, Müesli, Kiwi, Beeren, Trauben, Melonen, Feigen, Tomaten, Zucchini, Gurken, Pilze und Schalen von Kartoffeln dürfen Sie nicht mehr essen.

1 Tag vor der Untersuchung

Bis am Mittag dürfen Sie noch faserarme Kost essen, z.B. Weissbrot, Margarine, Käse, Honig, Joghurt ohne Früchte, Konfitüre ohne Kerne, Eier, Fleisch, Fisch, Reis, Teigwaren.

Ab 13.00 Uhr: Nichts mehr essen, aber viel klare Flüssigkeit trinken: Tee, Wasser, Sirup, klare Bouillon. Schwarzer Kaffee ohne Milch ist auch erlaubt.

Um 14.00 Uhr: Den Inhalt des ersten Beutels **Picoprep** in einem 150 ml Glas Wasser auflösen, 2-3 Minuten umrühren und dann trinken. Nach einer Wartepause von 30 Minuten anschliessend über 2-3 Stunden verteilt mindestens 5 mal (besser 6-8 mal) 250 ml klare Flüssigkeit ohne Kohlensäure trinken. Dann tritt Durchfall ein.

Um 19.00 Uhr: Trinken Sie die zweite Portion in 150 ml Wasser aufgelöstes **Picoprep**. Nach einer Wartepause von 30 Minuten anschliessend über 2-3 Stunden verteilt mindestens 4 mal (besser 6-8 mal) 250 ml klare Flüssigkeit ohne Kohlensäure trinken.

Am Untersuchungstag

Für die Untersuchung sollte der Stuhl möglichst nur noch gelblich-wässrig sein. **Trinken Sie weiter bis 2h vor der Untersuchung möglichst viel klare Flüssigkeit**, aber essen Sie keine festen Speisen mehr. Allfällige Medikamente nehmen Sie wie gewohnt ein.

Aufgrund der ausgelösten Durchfälle kommt es gelegentlich zu Reizungen des Darmausganges. Dies kann durch Auftragen einer fettenden Salbe wie Vaseline oder Excipial vermieden werden

Für die Darmspiegelung verabreichen wir in der Regel eine Spritze mit entspannender Wirkung (Sedation) und können so die Entstehung von Schmerzen während der Untersuchungen vermeiden. Das verwendete Medikament (Propofol) hat eine sehr kurze Wirkungsdauer, so dass man bei der Besprechung vor dem Nachhausegehen bereits wieder wach und klar ist. **Es ist aber während 12 Stunden nicht erlaubt ein Fahrzeug zu lenken.**

Die Untersuchung dauert 20-40 Minuten. Planen Sie aber insgesamt 1 ½ Stunden ein, damit genügend Zeit für die Ruhe nach der Untersuchung und die Besprechung der Resultate bleibt.

Weitere Informationen zur geplanten Untersuchung und über unsere Praxis finden Sie unter www.endoskopie-praxis.ch. Gerne erwarten wir Sie am vereinbarten Termin

Herzliche Grüsse

Praxis für Gastroenterologie und Endoskopie